

Myoponium

(aequali Banksii)

Pal. 5 partitus. Corolla campanulata limbo patente subequali s. partito.
Drupe nucis quadriculata Banksii (Bacca t.) differebat seminibus
bilocularibus Torreyi).

1. Colatum M. foliis oblongis integerrimis subserratisve glabris nitidis,
corollis hispitis
2. pubescens foliis oblongis ellipticis serratis pubescentibus
3. crassifolium M. foliis oblongis subserratis carnosissimis
4. tenuifolium M. foliis lanceolatis attenuatis integerrimis, corollis
lobatis.

Cotum 12. foliis oblongis integerrimis subserratisve glabris nitidis, corollis
herpatis *Coefl. prodr. pag. 44. n. 238.*

Habitat in nova zelandia 5

Rami ~~terres~~ ^{superne} villosi. Folia brevissime petiolata
alterna obtusa subovata ovata sesquipedalia
pedunculati axillares solitarii pubescentis multiflori, flores
brevissime pedicellati

2 pubescens M. foliis oblongo-ellipticis serratis pubescentibus 80/80.
prodr. p. 44. n. 239.
Habitat in nova Zeelandia

3 *Crassifolium* M. foliis oblongo ellipticis subserratis carnosiss.
Bonp. prodr. p. 44. no. 240.
Habitat in Botanicis Capula.

non vidi

Tenuifolium M. foliis lanceolatis attenuatis integerrimis corollis
lobatis Desf. prodr. n. 241.

Habitat in Nova Caledonia. 5

Stannopi

Rami ^{caeteris} inferne teretes superne angulati. Folia petiolo
sq. utraque acuta, glabra, long. bi polliciana pet. ultra,
avenia. Pedunculi axillares, ^{gemini} solitarii uniflori,
unguiculati.