

Myosotis

1. scorpioides M. feminibus levibus, foliis ^{pelosis} acutibus calloso, foliis ^{pelosis}
2. nana M. foliis lanceolatis calycibusque pilosis-tomentosis, feminibus mar-
gine serratis
3. squarrosa M. feminibus margine aluleatis ^{et} glochidibus foliis ^{lanceolatis} pilosis acutibus calloso
4. Cappala M. feminibus undique aculeis glochidibus, foliis lanceolatis pilosis
5. virginiana M. feminibus undique aculeis glochidibus, foliis lanceolato-ovatis
utrinque attenuatis, ramis divaricatis ^{et} cernis bracteatis
6. trifida M. feminibus undique aculeis glochidibus, ~~ramis bifidis divari-~~
~~catis et bracteatis caule herbaceo~~
7. altissima M. feminibus undique aculeis glochidibus, ramis et bracteatis
- Cynoglossoides caule fruticoso, scabro
8. fruticosa M. feminibus levibus, foliis linearibus, caule fruticoso ^{et} ~~scabro~~ ^{et} ~~concoloribus~~ ^{et} ~~repente calloso~~
9. tenuifolia M. feminibus levibus, foliis linearibus, caule fruticoso
piloso, floribus spicatis se-
pibus

10. *Spergularia* M. seminibus mucato spinosis, floribus lateralibus solitariis
nec nota. foliis tenuibus pelosis. axillaribus unifloris

11. *Spergularia* M. seminibus lentibus, foliis spatulatis, pelosis, pedunculis
axillaribus unifloris

besida myofoti

Cynoglossoides Myosotis

Herbat herb. la Martini

Orbita alba - spithameus et ultra, basi ramulorum; rami pilosi. Folia linear
n-lanceolata, sessilia, pollizantia, integerrima, albedo punctata, pilosa
plana. Spicae terminales, foliosae. Semina distantia, ovata, marginata
echinata, foliis floralibus breviora

foliataum Echium

Habitat herba Marchia

folia lanceolata apicem reflexa subtus punctis ferebris

habes certe

Helioscopia Mysotis

Habitat in Cap. t. spec. herb. Koyeni.

Caulis plures, spithamei, ramosi, pelosi, scabri. Folia linearia, scabra, punctata.
Semina ciliolata-glochoides.

Scorpoides in eminentibus locis foliorum apicibus callosis An. t. v.

H. Dan. t. 50.

arvensis. *C. Cichium scorpoides arvensis* Bauh. pin. 254

palustre *C. Cichium scorpoides palustre* Bauh. pin. 254

v. *C. Cichium scorpoides minus, flosculis luteis hinc* Bauh. Prodr. 119.

Bo. pin. 254.

Habitabit in Europae campis aridis *β. in aquis stagnans* C.

Caulis erigitur saepe pedalis superne parum ramosus villosus stratus
Folia bipinnata versus basin attenuata, obtusa, lanceolata
villosa submolli. Pedunculi laterales et terminales. Flores
pedicellati distantes calycis tubus reliquis parum longio-
ribus, ^{calyx} pilosus.

sequens hinc varietas

non 1 v. spec. d. frequenter a de la Mare

Cynoglossoides M. femibus depresso-conicis, aculeis glabris
et basi radiatim mucronatis, foliis oblongis hispido, floribus axillaribus - La Mart. p. 396
Habitat in Cap. b. pra.

11 Spathulata M. Lemnibus terribus, foliis spathulatis pilosis pedunculis
axillaribus unifloris Forst. prodr. pag 12. 2. 62.

Habitat in nova zelandia

Caulis ^{aeiformis} debiles procumbentes pithamoi velosus pili
folia remota ovata, basi in petiolum attenuata
fiabrevifolia punctis callosi minuti sermoneque ulani
peduncululi laterifolii solitarii pilosi uti. & calycis folio
dimidio breviores. flores minuti

7 *altissima* Myofotis seminibus aculeato glochidibus foliis linearis lanceolato linearibus
brevelongatis scabri caule fruticoso.

Habitat in ~~terra~~ ^{fructu} ~~Thauria~~ ^{Thauria} Insula Bobonis Thaurum

Caulis ~~erectus~~, ^{fructu} teres, scaber bipede

Folia inferne conferta linearis-lanceolata, utaque alte basi in
petiolum attenuata scabra alba punctata, integerrima 3 five
quadripollicaria. Caulis Ramea linearis, apice patula, polli-
ciana

Pedunculis ex axillis summis, solitariis bifidisve, erectis floribus
semipedales. Pedicelli fructiferi reflexi

Flores racemosi, remoti

Calyx laciniis oblongo obtuso.

Pedicelli fructus depressus aculeis totus obfusus prope totum marginem

Myofotis Bobonica seminibus aculeis glochidibus setulatis
foliis linearis lanceolatis longissimis subnudis La
mark. p. 396

5 virginiana M. seminibus aculeato - glomulis, foliis ovato-oblongis, ramis divaricatis

Sci. Lin. Spec. pl. pag. 189.

Cynoglossum virginianum flore et fructu minus Mon. bot. 13. p. 449. f. 11. t. 30

fes. 7

Habitat in virginia O

Rami villosi retrosum scabri. folia suppetiolata basi cincta
apice attenuate supra scabra ^{tenues areolae} subtus villosa ^{sub} mollia
int nervosa ^{subcordatis}, pollicaria ^{sub} pubescent. Racemi superne et ter-
minales simplices, pedunculi scabri, fructus nutantes majoro
quam in scorpi. et Cappula. bracteis pubulato

27. Squarrosa M. seminum angulis setoso uncinatis, foliis lanceolatis, foliis
pelosis, apice callosis. Retz off. 2. p. 9.

Habitat.

Caulis bipedalis teretiusculus pelosus ramosus. rami infimo
res breviores. folia integerrima, obtusa, scabra inferne
versus sensim attenuata utroque pelosa pilis quibus
callosis infidentibus. Flores in racemis longis ^{foliis} ~~latius~~ ^{altis}
na parvis ~~baculis lanceolata~~ ^{foliis} ~~lanis ad latius~~ ^{foliis} ~~vel perium~~
supra ^{ad unicum} ~~flor duplo brevior~~ ~~state per unculo longior~~
myosotis eunophora Pall. huius pertinet videtur.

nana *Myofotis* ^{canescolata} foliis ovatis calycibusque ^{peloto} tomentosis ^{la} seminebus ^{la} marginatis

Echium scorpioides alpinum nanum *Scopium* Boiss. *mus.* 2. p. 149. t. 129

Lithospermum alpinum tomentosum minus *Tournef.* *Scheuchz.* *alp.* 2. p. 137.

Lithospermum alpinum latifolium flore conules majore, umbilico luteo *Reich.* *cat. pl. h.*
flor. p. 59. n. 3.

Lithospermum alpinum minus, flore purpureo *Reich.* *comp. Tab.* p. 82. n. 1.

Lithospermum montanum saxatile minus, perenne flore purpureo conules *Seguier* *suppl.* p. 112.

Scorpiurus foliis ovatis, spica pauci flora, calycibus tomentosis *Hall.* h. 592.

Myofotis nana *All.* *fl. Ped.* n. 189

Myofotis *Tenglovensis* *Harcq.* *pl. alp.* p. 12. *tab.* 2. f. 6

Myofotis nana foliis hirsutis, oblongo-subovatis, serrulatis, spica terminali pauci
flora subum bellata *Harcq.* *Coll.* p. 261.

plurima vix pollicari cespitosa interdum caulis digitalibus canescen-
tibus: flori ratione planta magna.

Innot
varietas praecedenti

4 *Linifolium* M. ~~zamburallifolium~~ ^{floribus sessilibus} *lobatum* caule fruticoso villosa, foliis lanceatis

Habitat in Arabia Taos Forst. 5

Simili *myosotida* fruticoso differt vero caule ramis, pedis
adpressis floribus sessilibus nec pedicellatis

Heliotropium ^{curastarficium} *zeylanicum* Burm fl. ind. tab. 16. fig. 2.

Heliotropium fruticosum Forst. descr. pag. 38.

o Fruticosum. Seminibus laevibus, caule fruticoso laevi Lin. Mant. 201. * L. V. p. 105

Habitat ad Q. b. p. i. f.

Rami teretes glabri laeves. ramis ad summum caulem plerumque
floriferi. Folium lineariq. alternis utrinque angis minutis. rudimenta
foliacea in ^{racem} axillis. Spec. & Terminales filiformes. non pedunculata.
late. Flores minuti subsistentes. fructus globosi. an potius species
Heliotropii

Heliotropium curasavicum zeylanicum Warm. fl. ind. tab. 16. fig. 2

foliis lineariibus

~~Lithospermum fruticosum Forst.~~ vel nisi siliis ad praesens defferret

Syrino-carpus ^{Myrsotis} Myrsotis seminibus ^{municato-syrinofi}, racemis ^{foliosis}, flonibus remotis, foliis
 cinereis pilosis

Anethusa Syrinocarpos; flonibus parvis albis, sermicibus quinque
 supra Anthemas Cosm. Depr. pag. 41.

Caulis basi lignosi, diffuse, palmares, superne dichotomo-ramosi,
 dense pilosi, cineriscentis, uti tota planta

Folia sessilia, vix unguicularia, obtusiuscula, apice patula.

Pedunculi in ramulis, axillares, solitarii, remoti, breves, ⁸ solio ^{subterculi} ad
^{sub} ^{traxelo} ^{calyce} omnes pyramideatus, ubique indigne municatus, basi angulato.

Syrinofi angulati, mag. majoribus angulatis syrinofi angulatus
^{nubes} semina angulata catenibus compressa, acutiuscula, ^{nitida} carinata, carina

dentata.

pectinata M. seminibus truncatis, spinis setaceis erectis que corona
tis, foliis pelopis racemis terminalibus La Mark.

p. 396

~~Habitat in Cap. b. sp. i.~~

Myofotis pectinata Pall. et. 3. Tab. E. fig. 4

Habitat in Sibiria

4 Cappula M. seminebus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis pilosis. Lin. l. V
Flor. Dan. tab. 692

~~Cynozylum~~ minus Bauh. pin. 257.

Habitat in campo argilloso, nudis rudentis O

Caulis teretes pilosi, ramosi. Folia inferiora petiolata superiora sessilia
scabra supra punctis albis subtus pilosi. racemi laterales et
terminalis solitarii simplices vel semel bifidi. bractea laniceo
lata longitudine calycis. lamina calycis lanceolata

nepenthi M. seminibus levibus; foliis lineari-
racemosis brevibus erectis Ha Mart. pag. 395

~~Myrsotis~~ nepenthi Pall. d. 3. tab. E. fig. 3.

Habitat in Siberia 4

granulosa Myosotis.

Myosotis granulosa; seminibus granulosis, foliis linearibus hispidis
punctis albicantibus, floribus secundis &c. Panv. 2. pag. 5.

Habitat Lino in arenosis

Puncti albi adspersa, quibus hispida e petio punctis albidis insidente
bus. Caulis herbaceus, erectus, bipalmanis, tercis, superne parum ca-
mosus. Folia sessilia linearia, obtusa, integerrima. Flores ^{speciosi} in ^{speciosa}
racem Calycis hirsutissimi. Corolla alba, calycis duplo longior. Semi-
na ovata, granulosa &c. Per. l. c.

humilis Myosotis

Myosotis humilis; seminebus nigris, foliis linearibus, caulibus brevibus; floribus lateralibus secundis &c. Per. 2. pag. 5.

Habitat in Pevuro campis O.

Hesperida. Caules plurimi palmari, prostrumbentes; intermedius erectus. Folia sparsa, sessilia, linearia, integerrima. Flores laterales; secundi, sessiles; fructiferi breviter pedicellati. Corolla alba. Semina nigra. &c. Pevur. l. c.

Corymbosa Myosotis

Myosotis corymbosa; seminibus lobatis, foliis linearibus acutis, caulebus
divaricatis, floribus corymbosis 8l. Venc. pag. 5

Habitat Chili in campis 0.

Herbes hispida. Caules nonnulli procumbentes, 2-3 palmares, divari-
cati, teretes, intermediis erectis. Rami superne furcati. Folia spar-
sa, sessilibus, linearia, acuta, integerrima, angusta. Flores terminalis-
in corymbum saepe furcatus, tandem spicati. Corolla alba, calycis
duplo major. Semina laeva 8l. p. l. c.

Chenopodium Myof. pinnatis undique hamato aculeatis pedunculis
apice insensatis axillaribus solitariis, foliis lanceolatis
velobis Wild. spec. pl. reg. 750.

Myofotis Chenopodium Pallas A. 2. app. no 71. V. 4. fig. 1.
Habitat in Siberia ad Wolgam O

Asperula Myosotis

Habitat in Penn Dombey herb. Guss. C

Cauli erectis, pilosus, palmatis. Rami alterni, patentissimi, caule altiora. Folia
sespita, lanceolata, semipollicaria, obtusifolia, remota, integerrima, ut naque
punctis callosi piliferis, scabrae folia, plana, arena. Specie terminalis; bifi
da, ramis patentissimis, sesqui pollicatibus. Flores distantes. Calycis parvi, his
tilacinis obtusi

est *Myosotis granulosa* Fl. Prouer. p. 195

gracilis Myosotis

Myosotis gracilis; seminibus acuminatis glochidibus, foliis linearibus, caulibus gracilibus, floribus lateralibus laxe fructu secundo & L. Penn. 2. pag. 5.

Habitat Chili in campis et collibus. ☉

Herpiduncula. Caules nonnulli prostratissimi, filiformes, graciles, pauciflori. Folia sessilia, linearia, integerrima. Spicis laterales, laxae. Corolla alba. Stigma simplex obtusum. Semina acuminis glochidibus & L. P. L. C.