

*Mynia*

*integrifolia* Mynia foliis cuneiformibus integerrimis glabris

Habitat in Madagascar Robmesf. herb. Gussf.

Rami teretes, glabri: ramuli tuberculati, tomentosi. Folia bipolliciana, petio-  
lata, subcoriacea, supra nitida, venosa, subtus arenia, utrinque glaberrima.  
Petioli anguiculares. Spica axillares, pollicares. Fructus globosus,  
magnitudine Bonadri



Lupstancia Mynica

~~Mynica~~ <sup>Gale</sup> Lupstancia foliis amplioribus inia nisi Act. sci: Paris. 1706. pag 83.

gagel ramulis rubris majus alterum Gronley vind - Lupst.

Habitat in Lupstancia herb. Mus.

Rami parvi, villosi. Amenta sessilia, semipolliciana. an diversa à Gale? Folia  
reticulata, lanceolata, supra villosa, subtus incana, utrinque acuta,  
extremum serrata

1 gale M. foliis lanceolatis subperovatis, caule suffruticoso Lin. l. V.  
fe. Dan. tab. 327.

Phamobagnus God. pempt. 700 app.

Rhus myrtifolia belgica Bauh. pin. 414.

Habitat in Europa, America septentrionali uliginosis & <sup>nitidi ramuli pubescenti</sup>

Rami teretes, fusci purpureo-<sup>subnigrescentes</sup> castanei. Folia basi versus semper  
ramuli apice <sup>atenuata</sup> <sup>obscure nervosa</sup> <sup>sequi</sup> <sup>oblonga</sup> <sup>argute serrata</sup>  
rebescenti <sup>amena</sup> <sup>oblonga</sup> <sup>seplicia</sup> in ramis apyphylis unguiculata  
reprota <sup>imbricata</sup> <sup>squaræ</sup> <sup>ovatis</sup> <sup>acutis</sup> <sup>ferugineis</sup> <sup>puncta</sup> <sup>nonnulla</sup>  
subtus in folia et nervis

2  
lanceolata, cuneata superne serrata subtus villosa

specimen ex Am. boreali communicavit Puch.



9 *triplicata* M. foliis ternatis dentatis Un. Am. ac ad C. p. 112 n. 90 &

Habitat ad Cap. b. frei 5

Folia alterna petiolata ternata: foliola sessilia lanceolata  
acuminata profunde dentata subtus tomentosa. Erectus  
in racemo (non spica) baccati scabri ~~non vidi~~

non vidi

Habitat in Cap. b. p. h. m. d. d. t. f. u. s. p. e. u.

Rami sparsi, superne villosi, uti folia lanella utraque, ad alteram supra  
glabra



4  
quercifolia M. foliis oblongis opposite pinnatis Linn. t. V  
Launus africana minor, foliis quercus. Comm. hort. 2. p. 161.

S. Pl.

Habitat ad Cap. b. p. i.

Ramuli interdum conferti subverticillati subangulati. Folis glabri  
folia alterna approximata basi attenuata obtusa, bipollicina  
nisi glabra subtus venosa punctis numerosis ut in cerifera  
superne Caesinis utraque duabus vel tribus subpinnatis pida

Caesinis obtusa

varietas folis

cuneato oblongis

Mynia

~~Mynia~~ Mynia foliis lanceolatis serratis subtus impunctatis amentis globosis

• Buxus dioica Voss. descr. pag. 159.

Index ramifus. Rami teretes, glabri

Folia subreticulata, pollicaria, anguste lanceolata, utrinque attenuata, glabra, apicem versus ~~reticulata~~ serratis 5-6 minutis, acutis, approximat.

Et lora glomerati in capitulo sessili, axillari, parvi, glabri.

~~Rami~~ Rami tetraphylli. foliolis minutis, lanceolatis.

~~Stamina~~ Stamina vix ulla. Antheris quatuor, calyce longioribus

Corolla nulla Bacca magnitudine seminis vixens

(Habitus et fructus Mynia diversa vers uti Mynia Nagi Thunb: calyce tetraphyllo an igitur sub genere a Mynia reliquis genere distincto remouenda?

vide Gartner de fruct. Nagi



Alyssum

Vesicarium Alyssum foliis inferioribus linearibus dentatis superioribus oblongis  
subintegerrimis filiculis inflatis

Vesicaria orientalis foliis dentatis Tournef. cord. pag. 49. Flin. ed. 4. pag  
252. t. 252. ed. 1727. pag 99. t. 3. pag. 99. t. 99.

~~Caulis~~  
Vesicaria armena minor Tournef. herb.

Alyssum vesicarium foliis linearibus dentatis, filiculis infla-  
tis angulatis. L. V. pag. 591.

Caulis plures, erecti, herbacei, digitales vel parum ultra, simpli-  
cissimi, glaberrimi, ut: tota planta.

Folia sessilia, basi et saepe in medio caulis <sup>sed hinc illata</sup> aggregata, plurima, juniora  
reflexa, <sup>volle anu pinguet carpi</sup> juniora erecta <sup>patentia</sup>, linearia, <sup>per unguiculam</sup>  
saes versus apicem dente utroque unius vel geminis.

si remotis, acuta, superiora alterna, sessilia oblonga alu-  
ta averna, plerumque integerrima bilinearia

Radix terminalis e quatuor vel 7 floribus

Siliicula magnitudine nucis avellana subglobosa inflata  
membranacea & nervi quatuor longitudinalibus subangulatis

7 nagi M. foliis lanceolatis <sup>entomo</sup> integris arenis Thunb. fl. jap. pag. 764 t. ✓

pag.  
na vulgo nagi. A. T. Kura Liba Romp. am. Ex. 5. p. 773. fig. pag. 874

Habitat in Japonia ✓

Caulis fruticosus glaber erectus. Rami decussati vertice nodulo  
si patens spmi foliosi. Folia elliptica sessilia obtusius-  
cula oblique arenata, glabra coria, opposita patentia  
coriacea, digitalia. Baccis magnitudine Camp. Thunb.



3 *Saya. M.* foliis ellipticis - lanceolatis serratis, amentis masculis compo-  
sitis, drupa nucleo quadriloculari Hort. Kew. 7. p. 397.  
Habitat in Madeira et Aronis f

non vidi

o cordifolia M. foliis subcordatis serratis sessilibus T. V  
gale capensis, ilicis coccoferae folio Petw. mus 774

retymali facie planta Othoneia, ilicis aculeato folio Plukh  
alm. 373. T. 319. fig. 7.

Alaternoides ilicis folio crasso hirsuto Walth. hort. 3. V. 3.

B. Myrica foliis subcordatis integris sessilibus Burm. afr. 263. V. 90  
fig. 3.

Habitat in Othoneia

Rami villosi folia approximata dentata glabra, femina  
quiescens subtus punctis impresso numerosissimis arena



2 cespitosa M. foliis lanicolatis subserratis, caule arborescente Lin. S. V  
pag. Sw. pro off. bot. pag. 374. f.

angustifolia Myrtus brabantica similis carolinensi brevifera, fructu racemoso  
fessili monopycno Plukin. alm. 250. t. 40. fig. 9. Patef. car. 1.  
p. 69. f. 69.

latifolia B. Myrtus brabantica similis carolinensi humilior, foliis latiori-  
bus et magis serratis Patef. car. 1. p. 13. f. 13.

Habitat in Carolina, Virginia, Pennsylvania & Illinois.

Ternius cortex <sup>elaticatus</sup> verrucosus. Rami inaequali fructi. Tota suppetio  
petiolata ~~confert~~ approximata superne serraturis aliquot  
remotis majoribus quam in gale 2 vel tres utraque mucrone  
glanduloso ~~nano~~ terminata ~~membranacea~~ subtus punctis numerosi-  
bus lucidis fulvis uti et supra et paucioribus. b. f. Tripollicaria  
basi acuta. Nili aliquot minoris utraque pagina  
amenta foemineae axillaria simplicia linearia foliis breviora

superne serratis subtus <sup>utroque</sup> punctatis caule.

4. *Othoropia* M. foliis lanceolatis dentatis. inferis integerrimis Lin-Mant  
pag. 290. t. 5. v. p. 284.

*Myrtus brabertii* a. arcedens africana confusa Planch alm. 250.

4. 40. f. 0.

*Myrica confusa* Burman. prodr. 27.

Habitat ad Cap. b. p. 15

semine rami vellosi. Venae. Folcia utraque attenuata basi in petiolum  
juniora utraque reli nonnulli profertim basi et in petiolo adultio  
ra tota fere glabra supra nitida bipollicaria superne utraque  
dentibus 2. 5. apice et basi integerrimis dentibus remoti  
obtusiusculis inferna integerrima. Amenta axillaria  
folio dimidio breviori: baccis globosis rugose vix magnitudine  
dine semeni Corundri

ex *Othoropia*  
remota



10 Myrica? sub hoc nomine a Thunbergio missa e nova Zelandia  
Rami angulati folia petiolata alterna oblonga integerrima  
subloricata subtus pallidiora obtuse nervosa  
simplicitate flores sequunt.

integerrima — foliis lanceolata oblonga integerrima.

ramiflora B. foliis alternis lato lanceolatis acuminatis serratis rugosis, flori-  
bus aggregatis axillaribus lateralibusque monoicis distinctis, masculis  
triandris. Sw. prodr. pag. 74.

Boehmeria ramiflora Gaertn.

Catunus ramiflorus floribus lateralibus sessilibus. Lin. Mant. 127. S.V.  
pag. 802.

Habitat in India orientali

Catunus ramiflorus Lin.  
Boehm. ramifl. Ga.



Segregata M. foliis lanceolatis integerrimis lacini masculini ramosi ~~et~~ <sup>nullo uniloculari</sup>

*Mynia segregata* Jacq. Coll. 2. p. 273.

Habitat in Aethiopia calidioribus

Folia opposita, brevissime petiolata, lanceolata, acutiuscula, integerrima, nitida margine parum revoluta, subtus pallide viridia 2-3 pollicaria. Rami teretibus lacini e gemmis oppositi, solitarii, semunciales, ramosi, glabri, squama ovata, coriacea, acuta, ciliata opposita ex quam alii pedicelli solitarii, uniflori. ~~foeminae~~ filamenta 3-6. Germen o. Stylus subulatus. ~~foeminae~~ inter cum in eadem planta sed in distincte, ramis <sup>caulis</sup> simplicissimis subsexfloris brevioribus, squamis s. alternis deciduis. Stylus 1. filiformis, crassus. Stamina capitata, obscure lobata. Bacca saturate coerulea, loculari seminariis sex, acuminatum foliatur, synanthem