

Mynthea

♂ Calyx trifidus - Cor. 0. Filamentum columnare

♀ Calyx & Corolla ut in male. Capsula <sup>in</sup>superi dnyraica bivalvis.  
Nux macida obvoluta

1. aromatica foliis ellipticis acuminatis utraque glabris calycibus  
fructibusque glabris
2. salicina. M. foliis lanceolatis utraque glabris, calycibus tomentis
3. sativa <sup>lis</sup> M. foliis oblongo lanceolatis, subtus pubescentibus  
calycibus fructibusque villosis
4. sebifera M. foliis cordatis oblongis subtus fructibusque tomen-  
tosis floribus paniculatis <sup>junioribus</sup>
5. parviflora M. foliis ovatis oblongis subtus <sup>junioribus</sup> tomentosis  
floribus paniculatis fructibus lanuginosis

fatua Myrsine a foliis oblongo lanceolatis, subtus subpubescentibus, calycibus  
fructibusque villosis Riv. Prodr. pag. 96.

Habitat in Cayenna von Rohr

Rami teretes, cortice fusco purpurascens, longi, glabri, superne flavescenti pubescentes. Folia sequentia, altera <sup>na</sup> breviter petiolata, 6-7 pollicaria, patentissima basi obtusa apice acuminata acuta, <sup>integerrima</sup> supra glabra, nerva arenaria, transversim oblique <sup>remota</sup> nervosa secundum nervos pubescentia. subtus glauco rufescentia vix tamen pubescentia nisi juniora. nervi remoti oculo armato subpilosissimi, exstantes. Petioli teretes, seminiferi ulares, superiores pubescentes. Panicula axillaris <sup>in o</sup> <sup>superioribus</sup>, 4-5 pollicaria; alterni, folia brevioris, pedunculi et pedicelli lanugine pulvereulenti uti calycis.

*Salva myrsinica*

Habitata Guiana Richard herb Guis. 4

Rami semipedales; virentes, fusi, superne subcompressi, villosi. Folia petiolata, alterna, spithamea, cordata, oblonga, integerrima, supra glabra, remote lineato nervosa, tenuissime nervata, subtus flavo pulverulenta. Panicula superne palmata, ferrugineo-pulverulenta. Pedunculi oppositi vel alterni. Fructus gemini orientosus.

globulano, myristica

Habitat herb. La Manshi

Flores plures, tomentosi, in apice ramulorum brevissimum. Petala lutea  
glauca

habes

uniformis Myristica

Habitat herb. La-Mankia  
Rami glabri. Folia ovato-lanceolata, 2-3. pollicaria, attenuata, remote obsolete esc  
nata. Pedunculi laterales, semunquiales, plures, 1-3 flori. Inermes oblen  
gus, peso parum major.

2 tomentosa

*Salweenia* M. foliis lanceolatis utrinque glabris, calycibus tomentosis

Habitat in India orientali 5

Rami <sup>glabri</sup> teretes ramuli ultimi superne flexuosi ferrugineo veluti.  
Folia petiolata, alterna lanceolata abbreviata, integerrima  
nervosa basi tripollicaria subtus glauca venella ferrugineo  
pubescentia. <sup>tuberculum</sup> Pediculi axillares brevissimi dentato subquamopis  
glabrum in quo pedunculi 3. 4. brevis ferrugineo tomentosus uti caly-  
ces. Calycis trifidi lacini ovati

an eadem dum fatua su

officinale M. foliis ellipticis subtus pubescentibus, calycibus ovatis  
fructibus lobatis Sw. prodr. pag. 96.

aromatica. M. foliis ellipticis fectus pubescentibus, Calycibus ovatis  
spec<sup>trifidus</sup> <sup>glaber</sup> fructibus Sw. prodr. pag. 96. Obs. pag. 217. &  
nux mophata fructu rotundo Bauh. pin. Plukh. ala. 265. &  
209. fig. 1.  
nux myrtica Rumph. Amb. 2. p. 14. & 4

La muscadee Sonnerat. Voyag. 4. 116. 117. & 118.

Myrtica officinalis Lin. Suppl. pag. 265.

Arbor magna; ramis erectis, cortice glabro, cinereo, interiori rubente  
folia petiolata, alterna, elliptica, integerrima, nitida fectus pal  
lidiora, nervosa. Pedunculi axillares 2. vel 4 flori solitarii. Obo  
vatus tantum maturefit Calyx 1phyllus glaber, trifidus. Lacinis  
ovatis

utrinque  
nux ex Hedyotis foliis fectis glabris acuminatis, squama subrotunda  
ad basin alterum calycis. Pedicelli umbellati



7 *Satureia* M. foliis oblongo-lanceolatis, subtus pubescentibus, calycibus  
fructibusque glabris / v. prodr. p. 96.  
Habitat in Tabago 5

umbriatus R.

4 *Sebifera* M. foliis cordatis oblongis subtus fructibusque tomentosis Sw.  
prodr. pag. 96.

*Sivola sebifera* Aubl. fl. Guian. 904. t. 345.

Habitat in Guiana;

Arbor in summitate ramosa. Ramuli foliosi, tomentosi, ferruginei. Folia al-  
terna cordato-oblonga acuta supraevidua, glabra, inferne tomento-  
sa nuperscentia integerrima, brevi petiolata. Flores congesti  
paniculati.

an *myrtica* surinamensis Prottb

~~s. parvifolia~~ <sup>lora</sup> M. foliis ovato lanceolatis junioribus subtus ferrugineo tomento  
si, floribus paniculatis

Habitat in India orientali

Arbor ramis terribus fusco superne ferrugineo tomento  
si. Folia alterna, petiolata, stipe glabra utroque  
subtus glauca nervosa costata, supra secundum nervos  
lineata, semper alia. Petoli <sup>capituli</sup> tergulati rami supra  
axillares, ramosi ferrugineo villosi, rami alterni parvi  
breves in his subsimplices in his capitula. magnitudine piperis  
negra tuberculata sepius parvi an fructus an flores imma-  
turi.

Specimen aliud foliis ~~ovato~~ lanceolato ellipticis  
ramis ~~capite~~ <sup>capite</sup> haud tomentoso foliis <sup>subtus</sup> angustioribus tenella  
tantum. tomentosa. Pedunculi laterales ramosi  
floribus minutis an hoc adultior  
fructus oblongo punctis elevatis exasperatus, magnitudine  
oliva  
num hujus generis incertus si fructus simili videtur  
exsicc. Honigii hunc retuli

Dactyloides - M. bacca ovata-oblonga, anillo cingata Gesta de fr. et sem.  
cent. 3. tab. 41. fig. 2.

Panam polia Reed. mat. 4. p. 9. tab. 5.

Nux indica oblonga, catraspicis seminis nuci-morphata Bauh.  
nut. 1. p. 399.

Nymphaea fructu caudoso Lin. Zeyl. n. 580

Habitat in India orientali &

~~microcarpa D. foliis oblongis breviter petiolatis. Trinervis venosis glaberrimis, fructu globofo parvo sessili. Lin. Suppl. p. 442. t. v. pag 922.~~  
Habitat in Java

eadem cum benyamina