

Mythus

Mythus expandatur sed et Bruxam.

umbrosa. Mystacis foliis ⁶ ellipticis ⁷ oblongis ⁸ glabris paniculis ⁹ terminalibus tri-
chotomis, calycibus ⁴ venatis ⁵.

Habitat in Guineo ⁹ part ⁵

Tota glabra. Rami Veneris, superne compressi. Dolia petiolata, op-
posita, Veneris pime venosa, impunctata, parum acuminata. Penicula
quater trichotomae. Petala caducia.

njidur

Mystus foliis ⁵oblongis ⁶subpetiolatis, ⁷glabri, ¹⁰pedunculis ¹axillaris ²subgeminis ³et
flos, ⁶floribus ⁷dioicis

Habitat in Guineas 4 sed 5.

Totius glaber. Rami corticis cineres, inferne verates, piper ne compressi.

Solia vit petiolata, pollicaria, obtusa, subtronacca, ^{rigida} Bupia arenaria ciner

rai, loria, subtilis obscure venosa, ovulo armato elevato punctata -

Pedunculi axillares, germini vel Verni, Stringue, Demunguineulan

Phytolacca foliis oblongo-lanceolatis pubescentibus ferrugineo-vomentosis; floribus
axillaribus sessilibus & cōseratis

Habitat in India occidentali Icert

Rami inferne verdes; glabri; superne obsolete Vetrizoni; florugineo-vomentosi.
Sola breviter petiolata, persequitelliana, acuminata, supra a nervis confer-
vis venis & in 8' rotata, minime vero lineata, ut nuncque a cante & lorum phlo-
reo, ferrugineo-vomentoso

confusum m. linearis Swartz

tomentoſa. Mystus Symb. Rot. 2. pag. 56. ^{Mystus}

~~Mystus canescens: floribus solitariis sparsis: foliis ovatis Veneris~~
~~tomentoſa: petiolis cauli connatis luteis. Flor. Cochinch. I. p. 311~~

cerafina *Mysticetus*
Mysticetus legatus

infusig pubens *caeruleo* *Myrtus*
Calyx phyllis foliis pubetudo infra filamenta velloso
Petala 5 que tenuia pubetudo
Stamena filamenta numero capillaria coolla parum longiora
Style 1. linearis pubescens superne attenuatus glaber Stigma
acutum

accedit ad Morqueleam Aubl

Puer No Rio

nitida Myrtus foliis suboppositis ovatis attenuatis nitidis, floribus sternis axillari
bus suboppositis.

Myrtus keiada pedunculis subtriangulis; foliis suboppositis lanceolatis atte-
nuatis den. I. V. pag. 461.?

Habitat in America meridionali Dr v. Rohr

Rami teretes, glabi, inferne cotyle cinereo, superne fuscio.

Talia opposita, brevissime petiolata, pollicaria vel panem ultra, ovata
vel oblongo lanceolata, attenuata apice obtusa, basi arcuata, integerrima
glabra supra nitida, infra nervosa-friata, subtrus avenia, pubescens
via, oculo armato punctata.

Flor parvi, axillares, suboppositi Sterni

acris Myrsus pedunculus axillaris terminalibusque trichotomis foliis longioribus
foliis ellipticis convexis coriacis venosi punctatis.

3 Myrtus canophyllata Tacqu obs. 2. 1.

2 Canophyllum aromatilis inde orientalis occidentalis foliis et fructu fabro
tundis diphyrene, seminibus ferre obtriangulis planis Plutin clm 100 tab.

155. fig. 3

Canophyllum Plenii Braub-pin

Myrtus acris pedunculis axillaribus terminalibusque corymbo fr.
trichotomis foliis longioribus; foliis ellipticis convexis coriacis
venosi punctatis, caule arboresc. su. prod. pag. 79.

In monte fernat legit dñ Ryan

Rami glabi, fasciis ^{ripiis} rufis ne verteret, superne alternatim compressi.
Xolii petiolata, opposita br. s. Tripllicaria, elliptica, obtusifolia, apice
sope parum emarginata, basi acutiora, integerrima, supra venosa,
nitida, subtus obscurae venosa, utrinque oculo armato punctis numerosis
fusis adpresso.

Petiolus unguiculans.

Pedunculi axillares et terminalis, oppositi, sc 5 pollicares; glabri,
compressi: petiolaris infuscatus serni; oncaea br trichotomi, pedicelli
ultimi triflori, flore intervedio foliosi

proverba Mystus pedunculatus confertis astillans unifloris, foliis ovatis acuminatis planis:
ramis virgatis, caule arboreo. Su. prodv: pag. 77.

Ex insula S. Cneci misit Dr West

Rami Vertes, glabri, cortice cinereo, superne ad folia compresu*spicul*is expan-
num dilatati.

Folia petiolata, oppositae, pollicariae et parum altera, ellipticis ovata,
acuminata, acumine obtuso, supra obsolete nervosa, subtus pallidiora
et venosa, utique glabra, orculo armato punetata.

Petiolae vix feminae queculares.

Pedunculi astillares, oppositi, 5-6 in singula astilla, e gemma minute
lqueumofus, angueculares, uniflori, glabri. Flores parvi

Laurinus Myrtus foliis ellipticis serratis floribus racemosis
alternis

Lauris ferratus Burm. Theb. p. 139. f. 62. *

Myrtus Laurinus pecunuleis rameosif tracheolatis, foliis ovato - lanceolatis ferrulatis
glabris Retz. Jap. 4. p. 26

Habitat in rameosif Zeylono 5.

totius gl.

Rami teretes rotundie fascio patentia. Folia Lauri vulgaris late viridia, elliptica
tracheolata alterna. Pedunculi stellares Terminalia que foliis tamen 2 vel
3 res gemma squamosa sapa sequuntur ovali imbricatis decindens. Flores
rameosif alterni solitani superne confertiori sequas breve pedicellati
ma ovata sed longula. Calyx is laevis & que rotundatus. Petala 5 ovata.
stigma stylus confertior petalorum stigma capitatum

Habitus a Myrto diversa. Ita

Splendens Myrtus

Eugenia periplocifolia: foliis integerrimiis acuminatis
latis; pedunculis paniculatis, axillaribus exterminalibus
Fag. Collect. 1. p. 108 Tab. 4.

Dichotomus Myrtis folii oblongi subcuneatis; pedunculi axillaribus dichoto-
mis folio longioribus.

Habitat in Domingo Herb-Destert.

Rami Tereter: ramuli compressi. Rama breviter petiolata, pallidaria, obtusa, siccata
emarginata, basi acuta, utrinque glabra, punctata, oblique venosa. Pedunculi
solitarii, bidichotomi, cum flore sessili in dichotomia: pedicelli, utiger
mena villoso-crenata. Calyx lobis quadratis, undatus.

Susbusta Myrsin.

Coryphylloides aromaticus - sylyvius Heron. herb.

Habitat in Ceylone Heron. herb. in Bibliotheca lugdun.

Tota glabra. Rami teretes. Sola brevis sine petiolata, hypoleuca vel ultra, opposta, lato-ovalis,
ecolata, obtusifuscula, subtilissima venosa, plana. Racemi axillares; simplices; oppo-
siti; 9 flori. Elores pedicellati. Calyx verbenatus, angustulans, obsoletè dentatus. Peti-
la caduca.

an Eugenia?

conacea Myrtus?

Habitet in Madagascari herb la Mantzii

Rami terete, glabi, cordice cinereo. Dolea breviter petiolata, bipinnata
cana, elliptico lanceolata, integriforma, ^{super nitida propinquitate} acuminata, coriacea, gla-
berissima, avenca, encorva. Pedunculi astillatae. ~~et~~ Terrae natales terrae
lateralis anni flori, intermedius parum longior, unguiculatus, triflorus.
Poly 4 fidei. Petala oblonga, integriforma. Calyx lobis rotundatis. Brac-
tea brevis sub pedicellis, pubulata.

Cedri folia Myrtus

Habitat herb - La Martini

Rami Tetragonoi, e membrana angustissima decurrente subalati, ut i tota plana, glabri. Solea petiolata, Tripollidaria, elliptico-lanceolata, panum attenuata, avenae, subtegula simpliciter venosa, basi acuta, integrernina, fimbria pallidiora et in que im punctata. Flores non vidi.

braidea Myrtur

Habitat in Papenna herb. Des fort.

Rami teretes, superne hirsuti. Solea subpetiolata, fereque pollicaria, ovato-oblonga, rufa et attenuata, supra nitida, obscure venosa, impariata, subtruncata, paucitata, costa hirsuta. Racemi axillares, pollicares, hirsuti. Bractea ovata, concava, flore longior, attenuata, hirsuta. Flores solitarii, subsessiles.

crenulata Myrtus.

Globat in Domingo herb - Desfont. 5

Rami glabri : ramuli villosuli . Folia subpetiolata, ex rugosula, oblonga, obtusa, crenulata, glabra, utrinque punctis elevatis adpresso, avenia, serrata, supra nitida . Pedunculi attlasses; solitarii vel gemini, uniflori

microphyllus Myrs.

Habitat in Domingo Reb. Desfont.

Ramifimus : Rami Veretos, glabi: ramuli ultimi pilosi. Dolia subpetiolata,
femorangueculana, oblonga, acuta, integerrima, arvensis, enervia, ut nique excavata
punctata, glaberrima, juncea utriusque subter illis ad pressi. Padunculata
axillares, solitarii, uniflori, longitudine folii. Calyx foliola rotundata, ciliata,
ut petala elevata-punctata.

sericeus Myrsinæ foliæ lato-lanceolati pubescentiæ, racemei pedunculati peduncu-
los dichotomis

Habitat in Brasilia Domby herb. Aus.

Rami teretis, glabri, superne compresi, cinerei. Folia petiolata, opposita, 2-3 pollicana,
panum attenuata, acuta, basi, obtusa, venosa, supra nitida, subtus tomento inper-
ceptibili sericeo nitens; extorrisum obscurè venata. Petiolæ incanus. Pedunculi
ex axillis superioribus, folio parum breviorer, ^{canescentes}, partiales circiter quinque, remoti
oppositi, compresi, his dichotomi, ^{D. juncti}, folio pene cum flore sessili in dichotomia,
peduncelli uniflori. Calyx canescens.

Myrtus

Habitat in Domingo herb-Guf.

Sacer M. bistrifolii, folia vero angustiora. Rami frequentes; pauci; virgati; cortice cinereo, glabri; ut i relique parter; inferne ^{lanceolata} Verd et, superne compresi. Sola
breviter petiolata, opposita, follicina, obtusifolia, basi acuta, utnique punctata,
supra nitida; subtus pallide rufescens, venosa, in Vegerima. Flos semi axis
lance et infrapetiolacei, aggregate, 2-3 utnique, unguiculares; simplices, 7-9
flori. Olores brevissime pedicellati; oppositi, minuti. Squamula minuta
ad bapni singuli flori

Mgthui

Habitat in Fava Commerfor herb. fws.

Rami vellopi; canescentes. folia petiolata, opposita, oblonga, longe attenuata,
utique acuta, avenea, nervosa, glaberrima, supra impunctata, subtruncata;
punctata. Petoli semiunguis clares. Raizem compositi, axillares, solitarii, folio
duplo breviori. Pedicelli in rami, ut germina, triflori, approximati; flor inter
medius flospli. Flores partit.

Si non fallor habeo

Mystus

Habitat in Madagascari Rommer for herb. Gushee

Potus glaber. Solea versus apicis ramorum, usque pollicaria, oblonga, supra nitidula, utrue elevata-punctata, subcordata, acumine brevi terminata. Praeemini infra foliacei, brevissimi, quinqueflori. Calyx punctatus.

vaccinoides Myrtus

Habitat ad fructum magellanicum Commercio herb. fusc.
Calyx superius, quinque sed us, perfectus. Corolla pentapetala: petala alba vel incarnata,
stamina longitudine corollae. Stigma innasolutum. Brama tubulata, rosea, calyx coronata
polysperma. Pauli suffruticis opis fuscus

abutifolia Myrsus foliis oblongo-subcuneatis, pedunculis axillari bus subfoliatis uno
flori.

Habitat in madagascar Pommer. herb. 4 usq. 3

Rami glabri; apice ferrugineo tomentosi; uti pedunculi & calyces. Sola
breviter petiolata, subcordata, basi acuta, venosa, utrinque elevata-punctata.
Pedunculi axillares; foliari; terminalis 4. semi pollicares.

trinervia M. pedunculus axillaris 3 floris, folios ovatis
acuminatis tri-nervis subter-tomentosis lutea
L. Trans: 3 p. 200

Habitat

non vid.

~~gummi fera~~ Ph. solvi oppoſiti lanceolatis glabri; capsulis angulatis

~~Habitat ex nova caerulea~~

Eugalyptus

non vnde

tenuefolia Myrtus pedunculosa at illanbus foliis tanis unifloris
foliis lanceolatis mucronatis Smith L. Trans. 3 p. 2000

Habitat

non vidi

chenopodiaceae
pedunculis multifloris, foliis ovato-convolatis sinatis
pelopsi Lour. fl. Cochinch. pag. 313.

Habitat prope Cantoren Sinanum T.

Foliorum 3-5 quipedali eretis flos folia serratum brevis ac utrione
alterna pubescentia. pedunculi subter masca - flores albi
Pet. batrachus & fidus Por: spiculae laevius ovati coniari in
tubum breviflorum basi uncta. stamena tubo torollo cipido
germer subrotundum. Baeca puberula coriacea & loculorum
polypetala.

an hucus generis?

non vidi.

Lourrea
Tinctoria Myrtus foliis ovatis acuminatis & rinxis glabris, racemis
fructiferis minicibus longis lour. fl. Cochinch. pag. 312. Tinctoria
Habitat in Cochinchina &
arbor 12 pedalis. Sola integer rima, utrinque glabra, petiolata
glori albi. Cal. 4 fedo. Corolla 4 petal. Boica connatus
fusca, loculans polisperma

non vidi

communis M. floribus solitario, involucro dysphylo
romana. *Mystus latifolia romana* Baeh. p. 468.
Mystus foliis ovatis pedunculis longioribus Mill. Diet. 1. 184. fig. 1.
Varentina. *Mystus minor vulgaris* Baeh. p. 469.
Italiae & *Mystus communis italicus* Baeh. p. 468
boetica & *Mystus latifolia boetica* Cluf. hist. 1. p. 65. Baeh. p. 469
Cupaniæ & *Mystus sylvestris*, foliis acutisquamis Cluf. hist. 1. p. 66. fig. 1. Baeh.
p. 469.
belgica 3 *Mystus latifolia belgica* Baeh. p. 469
mucronata 3 *Mystus foliis minimi & mucronatis* Cluf. hist. 1. p. 67. Baeh.
p. 469
Habitat in Europa australi, Afra, Africa 3
Rami tereti apice pubescentes. Folia glabra erata vel oblonga
acuta utraque punctata. flore pedunculi solitarii articillares
pedunculus folio brevior

2-3 Ceratostoma Meythus pedunculi laterales terminalesque unifloris, foliis oblongis
nitidis subtriangularibus.

Ceratostoma myrtifolia latiore fructu nigro Ceratostoma diphyllum

[Lit. P.
Plan hist. 2. pag. 107.]

Habitat in Ampelis Canbis Pfleg. 4.
pag. 57.

Totus glaber. Rami teretes, cornuta, lacinia. Ramuli juniores squamis linearibus
latis, semivirgineis, apice pubicatis ramosi remoti, per ceduz.

Solia petiolata, opposita, foliacea, petiolata, supra pubescens
~~petiolata~~ notata, pubescentia arenea, pallida, confertim punctata, palligerae

Pedunculi oppositi, intimum quatuor ex eadem gemmo, castillans, terminalis,
sope infra foliacei, uniflori, filiformes, ~~que~~ ^{que} ~~pallidior~~, ^{pallidior} tenui-

Lacinia Palpis oblongo obtusa.

Petala oblonga, obtusa, semiunguiculata, alba.

Meythus ligustrina pedunculis solitariis ramosis que terminali
bus unifloris, foliis lanceolatis obtusi convervi lacinias

Sw. prodrom. pag. 70

Rami et folia tenella glutinosa Richard

puberu M. foliis pedunculis at illarioru pubescentibus; foliis oblongis otta
si- puncionibus utique villoso
Habitat in India orientali. & Rottler
affinis videtur Euz: une flora an eadem ad pedunculi breviores
nec villoso ita dum ullam in Euz. observo
Rami oppositi cortice canore glabri pumori vello ferrugineo
fomentosi. Tolia petiolata opposita pollicana vel sequipoll
coria integerrima obtusa ^{est rotula} aenaria ut nique punctata, adulta
ra glabra pumorum utrique ^{tenella} villosa tenella fomentosa
pedunculi at illarioru foliari folio breviori unicolori medio tubo
teati Calyx 4 fidus villoso laevis subtilis. folio petala
obovata 4 or.

Luma *M. floribus solitariis, foliis suborbiculatis* Molen host. nat. Chil. gray

148

Habitat Chil.

non vidi

Ugni M. Clorbus solitaria; rami oppositi, folia ovalebra pubescentia. Molin.

Act. nat. Chil. pag. 136

Habita Y Chile

non vid.

Vallinodes M. pedunculus atellanus solitarius, folia oblonga alternae
Habitat in Triple Borneo;

Facies Vallinii magellani Rami glabri Verbes. Solia petiolata
angustulana integriforme utique glabra pubens, obliqua
Pedunculi folia breviores

alpina M. pedunculo foliarii terminalibus unifloris brevissimis, foliis
ovatis, ramulis quadratis fastigatis, caule arboreo Lw. prodr. pug.
177.

Habitat in Jamaica

Rami sparsi glabri usque superne vellof. angulati
culati. Solia frequentia opposita petiolata, parva sed numero
quam in crenato, obtusa cuneiforme utique glabra fimbriis pappu
punctis impressis avena exerica margine panum reflecta

25 tomentosa Mystus padunculus uniflows, folio tripinnervis pubbus ^{Mystus} lomentosi Hort. Kew.
2 pag. 159.

Habitat in China La March 5

Rami Verete, lomentosi.

Solia petiolata, opposita, per ^{petio} qui peltarie, elliptica, obtusa, supra obscur
ne reflecta, tripinnervia, pubbus magis conspicui, supra glabra, pubbus
incana, lomentosa.

Pedunculi axillari et terminali, solitariae, oppositi, unguiculares,
^{Pedolibratis firmis} lomentosi oblongo,

Bractea duo, parva, ad basin calycis.

~~sparsa~~ Calyx hirsutinus, lomentosus; laciniis quatuor rotundatis.

Petala oblonga, extus lomentosa, incana, exo intus purpureo ~~unguis~~
culana

Mystus canescens: floribus solitariis sparsi, folii ovati linear
i lomentosi: petiolis cauli connatis. Lourcero fl. cochini 1-
pag. 311.

procera M pedunculis conferti atellanibus unifloris, foliis ovatis acumi-
natis planis glabris, ramis virgatis, caule arboreo sive prodr. pag. 77.

Habitat in Hispaniola.

Rami cortice unicolori glabri ut homini sunt f compacti fusi
rigidi. Sola brevissima petiolata polliciana utrumque glabra
punctata oblonga acuminata acumine obliquipinulo gla-
bermissa oblique venosa, subbas pallidiora pedunculi atlla
res et terminalis 5. 6 in fragula articula aggregati unguiculata
uniflori glabri e gemma communa

aggregati

oblongo ovatis

petiolis integri

Lori M. pedunculis umbellatis, foliis ovatis aluminatis Thunb.
fl. Jap. p. S.V.P. 461.

Habita in Japania
Totus glaber. Rami et rame alterni. Edia e gemmis alterne folitina,
trinervia et terna, venosa subtus pallido, pollicana et ultra. Flores
in rame terminali umbellati. Pedunculi piliformes pollicares
Calyx dentatus. Baccia bis. bilobata semina solitaria

- ferato

non vidi

Cuneata M glombris at illanbus subfusibus; foliis ovatis acuminatis
rigidi cuneati subter meianis. Sur. prodri. p. 70.

Habitat in Hispaniola;

Rami teretes inferne glabri superne vellopi. Solia breviter petiolata
sequipollia cana integerrima supra nitida transversim fracta
subtegallida nervis transversi frequentibus elevatis, basi et
basi acutangulis

cordata Mystis florum axillaribus lateralibusque subfusilibus, foliis fleshibus cor
datis orati nitidis Lw. p. 70

Et Insula S. Eusebius misit de Pleg

Rami spp cineri, glabi; uti esta planta, superiore compre si.

Solia fusilia, opposita, pollicana subciliacea, margina ^{ta} planum crasto
ro obtusissima glaberrima seno subtili obtuse subtus punctata, pallidiora,
foli huius parte tabescens cordata
loci axillare; et in ramis aphyllis, plures, fusiles, vel quadranguli

— oblongi

nida M. foliis ovatis attenuatis venosis nitidis; pedunculis attillans
aggregatis brevissimis

Habitat in India occidentali.

Rami cinerei glabri. Polii petiolata, opposta, pollicana integra
una in acumine attenuata, obtusiuscula, venis numerosis
elevatis parvatis. pedunculi rufi, terisque fuso purpureo sanguineo
uti petiolis

~~varietatem, ne pallida, a d. v. Ad. non i minus eam~~

affinis M. floribundo

floribunda M. Solut pedunculus axillaris aggregatis brevissimis foliis via
to lanceolatis attenuatis planis

Habitat in Canbari⁵ Rami teretis oppositi generi grisei. Folia petiolata opposita
sequipollucana integerrima valde attenuata acuta utra
que glabra subtruncata punctata. Pedunculi breves 4 cm. procul
attilla brevissimi Calyx & Glaber oculo armato punctatus
calyculus laevifidus subfusculo calyx

Eng. est retiro Act. f. h. nat. Paris.

affinis glabratu an lucido lus.

Lateralis M. foliis glabris lateralebus aggregatis suspicibus; folius oblongi
glabri.

Habitat in India occidentali ad Torastr. &
an. Eugenia

Rami crenati glabri nudii. Folia sequipolluanae, integrae
nra, ultime punctata fructus magistridine pepiti

Dichotoma B. caule fructuosa erecta fulig, foliis dentatis glabris pedan
culis terminalibus superne dichotomis faciebat coll. 3 pag 250

nun verdi

inflora M. pedunculi bifloris, foliis lanceolatis. Len Am. ariad. S. gray. 398x
Caryophyllus spicatus; foliis lanceolatis oppositis, floribus geminatis alatis.
Brown Jan. 24th. Tab. 25. fig. 3.
Habita in Jamaica

non ordi

Crenulata M. pedunculis solitariis axillaribus subtus floris, foliis subrotundis
dis Crenulatis glabris sive prodr. pag. 70.

Habitat in Hispaniola

Rami Vereti glabri ramosi legerentes sparsi. Sola brevissime peti-
cata oblonga, facie myrsinis ocrea utr. unguiculata basi
arista subcionacea subtus pallidiora, et trophum oblique creni-
lata, subtus punctata

cauda in pedunculis subtriangularis, foliis suboppositis lanceolatis atque
nervatis. Lin Spec. pl. pag 6744

Habitat Surinamis.
Folia ovata admodum attenuata in apicem lanceolatum. Flores
pentapetali. Lin

multi-haud nota

trifloro M. foliis alterni, pedunculis trifloris. Fæcque florib. amar. tab. 193
fig. 59

non vide

M. f. folia lanceolata ellipticas pubescentia paniculata
umbellata & axillaris tenuis terminalibus tenuifolias subtifloras

Habitat in America

Rami dichotomi teretes latico amaro glabri apice tomento
tenui ferrugineo. Sola petiolata opposita, supra gle-
bra coria obsoleta nervosa venosa integerrima acuminata
pubescentia ~~velutina~~ ^{Dentiforme} tomento tenuissimo cutanea, et in
que impunctata. Pedunculi ~~in~~ ^{fringedularer} tenui-
calyx marginae integerrimo

on singult
et illa

foligna M. Polus Ceneari tanicola tis integerrimis, specie Varminalibus

~~Amphibius~~

Rumph. amb. 2. 8. 17 fig. 2

non vid: a. Gmelino hui relato, ad species hujus generis

bustifolia M. racemuli brevissimis congestis axillibus; foliis cuneatis oblongo
griseo obtuso concretis scabulis Lw. prodr. pag. 70.

Habitat in Graia occidentali

Rami glabri cotyle unireo lato ultimo articulo compresi. Doleni
breviter petiolata polliciana et ultra, utrinque glabra, elevato punctato
integerrima margine granum reflexa, venosa venis in aliis obsoletis,
<sup>supra folio nro 70
lucida</sup> subtus pallido, basi acuta obtusa oblonga vel cuneata & oblonga
interventum in eodem ramulo. Racemi axillares brevissimi

axillans la manthi ut specie differt

dependatur a Rich

Dum opus est Mystus racemis axillaribus brevissimis, foliis petiolatis ^{ovato} lato
lanceolatis acuminatis, attulit.
^{Habebat} ex America meridionali dedit Dr. Torpith.

Rami cordice tunicato, rimo.

Folia breviter petiolata, opposita, bipinnata, venis simplici-

² ³
Mystus. but transversis numerosis, glaberrima membranacea, intra
nervis pedunculi atellibus multo marginem ut nique nervis longitudinalis, subulis pallidio-
ni foliis brevioribus: pinnata venella frice villoso-fascia-

foliis distichis Racemuli axillares, solitane vel gemini; oppositi; vix simili-
tudinis orato.

Calicolata ramis angustulata, quadri-flori. Pedicelli uniflori, oppositi.

Pedunculis in Praetexta minuta ad basin fragili pedicelli, duo minutiora

ad basin calycis

Palyx oblonga, subvillosum: laciniis oblongis, congettudine

Petala quatuor

fere germinis

et Mysto glabratu ^{varie} differt foliis planis membranaceis racemis

pauci-floris

et Mysto disticha eadem, pedunculis pauci-floris, foliis non deflexis

~~androstomoides~~ *Mystis racemis terminalibus* ^{atillanbi} ~~compositi~~ pedicellis trifloris, foliis
ovato-oblongis sessilibus
Mystis androstomoides pedunculis trifido multifloris foliis subovatis
sessilibus Lin. S. C. pag. 462.

Totus glaber Rani superne obfusus Tetragoni

Toliea opposita, ~~racemosa~~ maxima hucus generis palmata et
ultra, venosa, utique ^{nervis attenuata} oblonga

intervum for Racemi gemini terminalis. Pedunculi Tetragoni, radiales infra
est atillorum oppositis oppositi, patentissimi remoti inferiores trifidi pedicellis
tri floris. Olos pedicellati. Bractea subulata brevisima ad
basin singuli, nullo ad basim calycis
Palyn obovatus magnitudo seminis Piperni quadridentatus

astillari M. pedunculis multifloris brevifloris astillariis conferti,
foliis ovatis acuminatis nitidis Lw. prod. p. 70

Habitat in Tamaulipas

Ramis teretibus glabri cortice unicolori articuli conspicui
Folia remota petiolata patentissima, usque pollicem et
gemina, acumine obtuso utroque glabra, supra lora oblate
subtus punctis minute elevatis, supra tantum vix hirsuta, petiolis vero angustiori
pedunculi astillarii petiolo brevior, floripanii conferti germeo ovoideo
armato punctis elevatis

glabrata M. racemuli brevissimi astillans multifloris, foliis ellipticis
acuminatis congestis conaceis glaberrimis S. v. prodr. pag. 70.

Habitat in Hispaniola

Rami terete glabri atque estini pubescenti foliis petiolata
glabra ovata acuminata integerrima utique glabra
margine rotundata supra Coriaria diversa pubescens
per ceras elevato punctatis aeneo acuminis obtuso

- ovatus

pallens Mystis racemis terminalibus pubescitibus pedicellis unifloris, foliis lato
cuneolatis supra tenuatis supra punctatis

Communicata a Dr. Torreth. Est amena &

Rami teretes, cinerei superne compresusculi. Lubionaceae,
Solia reticulata, opposita, bipinnata, oblonga, glaberrima, Consimilis
- aerea, supra punctis impressis adpresso, fulvo ^{in medio} et ve nero latenter
marginata in elegantia.

Petiolae brevissimi, purpurascentes unguiculatae, velloso-cinerei,
Pedunculi non minores, gemini, vix petiolae arcuati Vomentosi uti pedicelli.

Pedicelli pedunculo longe parum longioris, oppositi; decussati bat
ne, ^{non} paucis, bractea ovata, minuta, ad basim singuli, duo alio
in floribus, bractea ovata, minuta, ad basim singuli,

ad basim calycis, semillimi

Calyx conicus, velloso-cinereus; lacinias quatuor, oblongae

Petala calycis duplo longiora, primis sparsime ciliata.

Stamina longitudine petalorum.

polyanthus M. racemos astillanibus terminalibusque brevibus, foliis oblongis acumi-
natū exofo acuminate acutis
Habitat in India occid: in West
affinis nepto polylepenti.

Rami glabri cordie cuneo. Sola frequentia petiolata opposita
oblonga acuminata utrinque acuta supra et subtus punctata
obscure venosa subtiliter pallidior, ^{surgit} prolixana. Pedunculi atque
laxi, solitarii, folio breviora pedicelli pauci inferiore pedunculo
natura

maxima M. pedunculata multiflora foliis alternis subovalebus. Molia h^t
nat. Cil 103149
Habitat Chil.

non vidi

Argiope M pedunculis multifloris axillaribus, foliis ovatis ellipti
cui acutis integrimis fuisse pubescerentibus Sw. prod. 70.

Habitat in Domine a 5.

Rami verteri glabri. Sola petiolata, parum acuminate
utnique nervis obfusis venis sime obsolete venosis integrin-
ma supra glabra impariata subtus venosissime venosa
vellosa pallida punctata

Pappari arborescentes amplexicaule fructu ovato Plan herb
Iuran-

monticola M. pedunculis multifloris breviflavis astillans oleum, foliis
ovatis obtusatis planis glaberrimis Sw. prod. p. 78.

Habitat in Jamaica

Rami terete glabi folia breviter petiolata, polliciana
nigra cuspia, oblonga, integerrima, ut nique glabra, basi auctior
obsoleta venosa subtriangulari punctata. Racemi astillans
unguisularei

foliis oblongis

Zeylanica Myrtus f. racemis lat. at illaribus terminalibusque, pedunculis quadrifloris
foliis ovatis attenuatis supra punctatis ^{sub}

Myrtus zeylanica pedunculis multifloris, foliis ovatis subpetiolatis
Lin. J. V. pay.

Rami teretes, cinerei: ramosi ramuli compressi purpurascentes, subalter-
ni
Solia brevissime petiolata, opposita, interdum subalterna, sesquipollacia-
na, subcoriacea, valde attenuata, obtusa, avenia, glaberrima,
supra punctis impressi adpresso, secundum laevis longitudinali-
per medium estata. bipinnatis, glabri,

Pedunculi oppositi, tetragonoi, punctis elevatis vagis ^{pedicelli oppost.}
Tetragoni, remoti, rectangulares. Flores plenumque greateror et
longiori spiculae apice fragili pedicelli, breve pedicellati.

Eugenio Specie
La Manth hab. Calyx turbinatus, tuberculis elevatis griseis adpresso nigropus. Caenius 40
rotundatis

Durf

myrtus zeylanica doratissima, bacis nervis monocoicis Herm
Lugd. 434. Tol. 435.

myrtus foliis ovatis acuminatis obtusis veluca Lin. fl. Zeyl. 1827
Habitat in Zeylona. 5

8-11 virgultosa Mystus racemos latera lebris terminalibusque, foliis lato ^{orata} ^{attenuata} canciolato acutiori
natis

Mystus virgultosus pedunculis axillaribus terminalibusque paniculatis, pedicelis remotis decussatis unifloris; foliis lato-lanceolatis alternae rami virgatis, caule arboreo Iw. prodr.

Ex Gaf. fl. Ameriae mihi ad Aplex

Totus glaber, Ramis ^{virgatae, glabre,} tortice cineroso, tenellae vellosae

Folia petiolata, opposita, sesquipollitana vel ultra, basi acutiuscula, ^{per} glabra, nitida, sabbia pallida, venosa, rumina supra subpunctata, ^{pubescens}

Pedunculi axillares et terminalis plerumodo et fingulo atollo,
foliis de medio brevores. Pedicelli oppositi; remoti; foliis semiungui
Culans, feliformis, uniflori. Bractea ovata, parvula, ad basis fringuli
pedicelli ab base sub fringulo calyci.

Flowers parvi

Calyx lacinia rotundata, basi cinerascientes.

Petala calycis duplicata longiora, pinctata.

Languidus Myrsus foliis ovatis acuminateis enervis fagopyro compuncto loris primis
racemis axillaribus compositi, pedicelli geminati calyculisque vellops.
Habitat in India orientali ab Ca Mahr^t.
Rami Verdes superne pubescentes. Etolia petiolata, opposita, utramq;
glabro impariata utnique aenta, avenia, enervia; segui
bi pollicaria exgerima. Pedunculi axillares oppositi
determinates solidans pubescentes uti partiales et pedicelli
partiales et pedicelli remoti filiformes. pedicelli unguiculati
utnique gemini oppositi triflori. duo parum breviora sive uniflor
flos brevissime pedicellati calyces carentes.

affinis virginiana

Dioica M pedunculis Ynchotomo-paniculatis, foliis oblongis floribus
dioicis Lin. Spec: pl: pag. 675 &

Habitat in America

Folia opposita, lanceolata orata, crassa. Pedunculi axillares et ter-
minales, brachiatopaniculati, compitadine foliorum Petala paucia
Lin

non ordi

splendens M. pedunculata an illanbus foliis annis trichotomis, foliis ellipticis acuminatis planis venosi siccans nitidis, rami vagatis su
prod. p. 29.

Habitat in Hispaniola

Mystacanthus splendens L. folia

vel hirsuta. lvs ^{concolor} ~~lvs~~ ^{concolor} *splendens* pedunculata an illan bus ferme
tum oromo le libisque, foliis acuminato lanceolatis Gaig. coll. 2 pag.

March herb 108. Tab 4.

Rami teretes glabri cortice unicolora superne compressi leviter
vellosi, alterni vel opposita. Petio folia petiolata opposita
Mystacanthus laurus ovata integerrima ut nique venae copiose summi, suo elevato pe-
nus nigra ante basi plumosa, plana, super nitida pallide vnde
Plum herb 4, glaberrima, plana, super nitida pallide vnde
in acumine obtuso fer ^{truncata} foliari acuminata bipinnata ana-
Pediculi atellari trichotomi, vellosi. Congitatio folii, Bran-
ches lanceolatae caducis. calycis vellosi pubescens fructus mag-
tudine fere piperi nigri

13 aliena hinc simillima in omnibus nisi pedunculata calyx clasque
glabri modo mutet in sonido an modo varietas

ovata

Vestitus foliis longioribus lanceolato ellipticis somnis apice pedunculata
vellosa conspicuibus

aens M. pedunculis astillibus Vermena libus que cymbos trichotomis
foliis longioribus, foliis ellipticis convexis conicae venosis punctatis
caule aurore subprod. pag. 79
Caryophyllus Pluth. 100. tab. 155

myrtus Caryophyllo facie. off. 2. 1.

Habitat in America meridionali f.

Rami Yeretci glabi. Solia petiolata bipinnata / tripinnata
utrinque glabra e margine deflecto convexa, venosa
prosternit supra, integerrima obtusipina panum emarginata
utrinque punctata supra nitida. Cymbi astillarii et
terminales trichotomi rami compresi apice punctis ele-
vatis frequentibus apice compressi. A nudo elevato paucis
fatis

oblongis obtusipinis.

Fac. Myrt.-Pan. et Pluth. 155. 3. hui pertinet

Fragranti ^{Mystus} Ligustrum pedunculis axillaribus trichotomis pl. simplicibus que
foliis ovatis convexis rufulis subcionatis punctatis glabris, caule abso-
reto Senn. prod. pag. 79

Rami subtrichotomis glabri, ut reliqua, apicem purpureo-pente-

Solia super et solata ad apicem ramulorum, sequi prolligaria, obtusa
fuscula, venis complectibus numerosis utrinque ^{Ceratæa} marginem

hanc attingentibus punctis numeris elevatis minutis

Pedunculi exapice, bini, trifid. Longitudine foliorum, compresi-
pedicelli triflori floribus ssp. plebis

1344 coniacus Mystis pedunculis methotomis terminalibus; foliis subrotundis ellipticis
concretae coniacis avenis punctatis atropurpureo nitidis. Lw. prodr. pag.

79. Mystis coturnifolius Plum. ex. t. 200 fig' 2.

Communicata a Dr. Torreith.
Habitat in Caniba et
Lobus glaber

Folia petiolata, polliciana, subrotunda, emarginata, a margine reflexa
concreta, supra hirtissima, aenia, transversim oblique nervosa,
officie nrofus linea to, subitis minus nitido: junco utrapa
venola, subitis punctis elevatis minutis adpersa quo in adulto
officinorum apertis, adultiis supra punctis obvni imparsa

Pedunculi purpurascentes, folio duplo Concretae, subracemosi, gemini
Pedunculi remoti oppositi, pleniusque quatuor, remotsimi, triflori

Flores pedicellati: pedicellis subincurvulatis

Calyx purpurascens; gla caeruleus subrotundis

Petala oblonga, parva.

Ovulus globosus, magnitudine Piperae.

umenta M. foliis alternis den. l. V. p. 462 *

Panopshyllus aromaticus americanus, lauri acuminatis foliis
fructu orbiculari Platin. alii. DD. V. 155. fig. 4.

Mystura aborea aromaticaria, foliis laurinis Sloan hist. 2. p. 76.
V. 191. fig. 1.

Habitat in India.

Rami subtetragonoi glabri punctati. Sola petiolata in
mea opposita elliptico lanceolata integer ^{laminam} plana
obsoleta nervosa venosa, margine parum reflexa, glabra
punctata, 4 spolliciora obtuso parum ac emarginatae
Panicula axillares et terminales. Trichotoma ^{soltis longior} pedunculi
& compresi punctata pedicelli ultimi uti calyces leviter
cinerascens.

an mea unius
cum folia
opposita

foliis le-^{planis} ellipticis obtusi punctatis
conspicuis trichotomis axillaris terminalebusque folio longiori
calyculi subcane pectinatus

macrophyllus H. corymbii axillaris terminalibusque trichostomis
foliis lanceolato ellipticis nervosis lucidis
Habitat in India orientali.

Ramis venter glabri oppositi cinerei. Tolle petiolata
opposita palmata duos pollices lata, ut inque glabra
superiora transversam nervosa venosa striata, perim acumi-
nata marginem subreflexa. Pedunculi axillares foliis terminalibus 2-3.
foliis longioribus fusco purpureo siccantes ut
petioles. Flores trii in apice ramuli corymbo superiles parvi
glabri

Launne M. vocem lateralibus terminalibusque subimpositis, foliis
ellipticis serratis alterno
Launne senatus Burmann Ceyl. p. Tab.
Mystus launner.

Actz.

Habitat in nemorosis Zeylano König 5
An hujus generis fructu et florae sentia diversa videtur
Rami tereter, glabri, folia petiolata triplacida utnique
acuta glabra, venosa Venuspira remote sinuata. Racemi spicae
gemini basi utnique ramo - flores parvi flavi

cumini M. pedunculis multifloris, foliis lanceolato-cratis Lin. fl. Zeyl. 1825.

T. J.

Jambosa ceramica Rumph. amb. I. p. 130 t. 41.

Habitat in Ceylona,

Rami teretes glabri cotice cinerei. Folia opposta, petiolata
et oblonga, acuminate, integerrima utnique glabra; acutâ
biplumaria vel parum ultra se subtilesse confectione nervosa, ~~follis~~
pallidiora, subcrenata scapo atroso punctata. Petoli purpurascens.
Raizem to laterales et terminales solitarii interdum genui
longitudine foliorum rami glabri patentissimi Caly: & strobila
ti integerrimi

Eugenio jambolana Rumph amb t po foliis ovalibus venosi tenus non
Merk Encyclopedie meritis, racemis est paniculatis lateribus, calyx truncatus co-
cumini L. foliis oblongis acuminatis, racemis lateribus terminatis
que compositi.

est petalodesa Deoque mystas vel Eugenio

Jambolana Rumph amb. I. p. 131 Tab 42 record. Dr. La.
Merk. ex rectus