

Nai-bea

Habitat in Jamaica. herb. Gusf.

Rami subtetragonis, superne villosi. ^{lobata, probracteata,} Folia petiolata, semipollicaria, ovata, ^{lobata} attenuata, veno-
sa, nitida, supra secundum nervos lineata, subtus pallidiora, acuta, integerrima.
Pedunculi axillares, foliis breviores, filiformes, triplori, pedicelli laterales saepe
triplici medio bibracteati. Corolla glabra. Pappus pappi nigro minor. Calycis latic-
nis subulato.

alba Nacubea

Habitat herb. Guss.

Caules superne villosuli. Folio petiolata, opposita, pollicaria, fusum semper micro-
so, ovata, attenuata, venosa, nitida, integerrima. Pedunculi superne, axillares,
longitudine foliorum vel parum longiores, triflori: pedicelli laterales, interdum
triflori

Nacbea

Olea Com. meson.

Habitat in insula quavis Com. meson herb. Quis.

Caulis volubilis, glaber. Folia petiolatis, sesquipedalibus, ovata, glabra, venosa, acuta. Pedunculi axillares, solitarii, trifidi, interdum bifidi, cum pedicellis in divisa. Flores secundi, subsessile. Corolla tomentosa
sic videtur diversa a Pedana foliosa.