

132.

Nardus

Nardus. Pal: ~~---~~ 1. valvis ^{1. floret} Cor: 1. valvis. Stigma simplex.

stricta 1 Nardus spica setacea recta secunda L. Syst. veg. Schreb. gram 63. t. 7.

Polluk. nat. n. 53. Lessi fl. herb. n. 30. t. 1. p. 7. Casan. w. 3. t. 204.

Spadum nostras parvum Lob. w. 90.

Gramen spadum ^{junifolium} ~~junifolium~~ ^{Bauh. theat. by} ~~Bauh. theat. 76~~ ^{hollan} Schemit 2.

gram 90

N. Gramen spadum basilicense, capillares folio major Bauh. prod. 29.

Habitatio Europae asperis, sterilibus, duno ^{pedales, filiformes,}

Radix fibrosa. Culmi ^{tribulosi} caespitosi, palmati ^{rami pedales, rigidi,} retrosum ^{longa}

& ciliis ali, inferne unidarsi. Folia radicalia copiosa, setacea

superne consiliolata: ligula et membranacea, alba. Spica bi-Tri polli

canis." Rachis lateris altero convexa ex altera excavata, margine & ciliis

et conuli albomni, ^{tuberosi} pubescentes, & ubriolati

~~pentandra Loefflingii foliis oppositis subulatis connatis utraque
undentatis, f. Combr. & Nygnis Car. Desf. 4i. 2. p. 39. tab. 140
fig. 2.~~

~~Habitat in arcuosi maris mediterranei O~~

~~Caules bipollicares ramosi, teretes prostrati villosi. folia
bina dentibus lateralibus utraque setaceis. flores fasciis
coti sessiles axillares. foliola calycis 5que ovato-3exten-
sa utraque bidentata. Corolla 5 petala alba Stamina 5que
Gynophila ovata truncata 3valvis 1 loculari, poly/perma
Cavan.~~

ad alpina forte amandanda

~~non~~

#

indica 2. ^{indica;} Nardus spica ^{betaica} subincisa ^{secunda} subincurvata

Lin. suppl. 105.

^{betaica.} indica 2. Habitat ad Tranquebariam.

Nardus spica
betaica
incurva
glabra

Culmi digitales vel minores, betaici. Sili vix unguicularia, spica
longitudine culmi. Flores ^{sili} subulati, glabri, flavescentes, uti totum gramen
flavescentes.

Cyperum Enoplonum culmis teretibus foliis, panicula supra decompo-
sa prolifera, spiculis subternis Lin. Spec. p. 77 & L.V. p. 102

Cyperus miliaecus est provincia mariana, panicula villosa aurea
Plukh. mont. 62. T. 419. fig. 3.

Cyperus miliaecus marlandicus, spiculis semina feris magis confertis
rubentibus lanuginosis Rai. Suppl. 620.

Scirpus paniculatus, foliis florilibus paniculam superantibus
Journ. Voy. 12.

Habitat in America Septentrionali

Statura omnino Cyperi, sed spiculae Scirpi, nisi semina mature
scientia producerent lanam gelvans. testaceam, vix spiculis
longiorum. hinc pedunculi et pedicelli filiformes ultimi terni
spiculae pappi in centro spiculae magnitudine fere cyperi

ciliaris 3. Nardus spica incurva ciliata Lin. spec. 28. †

Habitat in Ardea

Folia graminea, plana Culmi perthamocus. Folia graminea pla-
na. Flosculi duodecim et quindecim: valvula exterior ovato-ob-
longa, mutica, margine ciliata pilis scabris numeris. Calyx prope
nullus, et dentem latus flosculorum seta brevior ipso, gluma.

Habitus Culmi caespitosi. Spica secunda. Flosculi alterni. Rachis
altero latere convexa, altero exteriori; denticulo pro brachio
flosculo.

angustifolium E. culmi verticibus foliis canaliculato triquetris, spicis
pedunculatis Dehnp. in A. J. Lin. 2. pag. 209

vall. bot. parif. tab. 16. fig. 1. flora Lind.

Habitat in Europa.

Culmi erecti teretes simplicissimi striati glabri vaginati
folia carinata supra canaliculata ^{margine lobis} attenuata culmo alio
ru glabra striata. Vaginae inferiores margini membranaceo
hyalino. Spica terminali pedunculata subnutante oblon-
go umbriata magnitudine teraji 4-5 pedunculi inaequali
folia 2-3. subulato triquetra sub umbella. Squamae
ovato umbriate membranaceae