

Naulea

*Macrophylla Nauclia*

Habitat in Java an herb. Fus.

Primi glabri. Folia petiolato, opposita, palmata et ultra, venosa, glabra  
subtus subcostata, supra glauca, integerrima, obtusa, basi parum obo-  
vata. Pedunculus terminali, solitarius, sesqui pollicari, petiolo parum  
longior. Caputulum nucis Juglandis parum major

*Catipolia Maulea*

Habitat herb La Manhi.

Rami superne tetragoni. Tolia petiolata, 3 pollicana, elliptica, utraque obtusa,  
integerrima, glaberrima, <sup>super</sup> ~~retia~~ avenia, subtus venis fere venosa. Capula  
la superne, axillaria, pedunculata.

Conoidea Nauclea

Habitat in insula Francia herb - Desfont.

Radix glabra, cortice cinereo, punctati, superne tetragon. Folio versus apices  
ramorum, petiolata, tri-pollicaria, elliptica, supra levia, nitida, avenia, utrin-  
que glabra, nervi transversi immergi, subtus tenuisima venosa, obtusa, Petio-  
lus purpureo saevus, unguiculari. Pedunculus axillari, solitarius, petiolo  
dimidio longior. Capitulum globosum, magnitudine Cerefi  
Inverso ab orient. Superficie foliorum pedunculorum

africana Nauclea, foliis oblongo-ovatis acuminatis, flammibus-  
tuba corolla longioribus reflexis, dentibus calycinis brevissimis  
pubertatis Wed. spec. pl. pag. 929.

Uniana mesmis

Wed. in Widen's Delectus 2. p. 170. t. 3.

Habitat in Guinea Thonning, spec.

Arbor ramosissima: ramuli obtuse tetragonii, oppositi, linea transversa  
e casu stipulorum circumserti. Folia ovalia, subtripollicaria, suba-  
cuminata, venosa, glabra, supra nitida. Stipulae oblongo-lanceolatae  
caducae. Capitulum breve pedunculatum. Flores ochroleuci. Bractes inter  
# 40-10 de basi flores, # germine duplo longiores, apice crassiusculi. Capsula oblonga,  
singuli germi  
nibus.  
obtusae, basi acuta, bipartibilibus, bilocularis: loculi semi-bivalvibus  
apice dehiscuntibus, monospermis. Semina oblonga. Thonning

pubulifera Nantea

Habitat herb-ha montani

Folia pollicaria, lenticolata. Capitula parva

aculeata caulea foliis ovatis acutis ~~Wed~~ caule aculeato  
Wed. spec. pl. per. 929.

*Curatiana guianensis* Aubl. fl. Gu. 1. p. 177.  
Tab 60.

*unicana aculeata* Wed. in Uff. sel. 2 p. 200

Habitat in Guiana?

non vidi

*condifolia* *Nauclea*, foliis cordatis pedunculis axillaribus ymi-  
nis.

*Nauclea condifolia* Roxb. pl. Coromand. p. Tab. 43.

Habitat in Coromand.

inter corymbos ueta

Folia petiolata opposita magna. Pedunculi petiolis bre-  
uiss. supra medium bibracteatus Cal. laciniis linearibus  
extrospis paucis lobis obtusi



purpurea Nauclea

Roxburg plant. Coomand. tab. 54

manif 52

orientalis *Nauclera* L. S.V. p. 212

*Natu* - *Thaëta* *Arkes*. Mal. 3. p. 29. t. 33.

*Platanocephalos* *edri* foliis *bijugis*, capite *major* *Vaill.* in *Act. Paris* 1772. p. 259

*Cephalanthus* foliis *oppositis* *Lin. fl. regl.* 43.

Habitat in *Andra* <sup>spica subullosa</sup>

Rami *teretes* *glabri*. Ramuli *oppositi*. Folia *petiolata* *opposita* *simplici*  
*citer* *venosa*, *daltera* *utroque* *glabra*, *junior* *subtus* *seae* *rostra*  
*et* *nervi* *villosa* *integerrima* *hypolliciana* *attenuata* *acumine*  
*obtusiusculo* *basi* *acuta*. *Stipula* *utroque* *gemina* *subulata*  
*reflexa*. *Pedunculi* *solitarii* *foliis* *brevis*

foliis *lanceolatis* *attenuatis* *glabris*

acuminata M. foliis oblongis acuminatis, pedunculis axillaribus  
Habitu in India orientali Romyt

Rami inferne varietas superne tetragoni, apice villosi. Folia petro-  
lata opposita patentes pinnis sesipollicari basi subae subovata  
reticulata, venosa utroque glabra integerrima. Squulis deci-  
mus. Pedunculi axillares oppositi, foliari abbreviati, subte-  
trayoni. Capitula magnitudine ~~auti~~ <sup>stipulae</sup> juglandis. Corolla  
fauce villosa. Stylus erectus clavatus.

macrophylla N. foliis <sup>sub</sup> cordato ovatis obtusissimis glabris, peduncu-  
lis terminalibus

Habitat in India orientali Thonig &

Rami apice subtetragoni glabri. Folia <sup>opposita</sup> petiolata palma-  
ria et ultra nervi transversi oblique nervosa <sup>remota</sup> subter-  
venosa subvenosa, obscure repanda (ad cap) utrinque  
glabra. Pedunculi terminales pollicares tetragoni  
bracteae duae lancolatae oppositae in medio pedunculi  
Capitulum in magnitudine pomi minoris stylus  
longissimus clavatus

pubescens M. foliis elliptico ovatis subtus <sup>pubescentibus</sup> villosis pedunculis terminalibus

Habitat in India orientali Honig. 7

Rami validi caespiti penna lignea superba subdetrugoni sub ramulis parum dilatati Ramuli oppositi rigidi.

Solca versus <sup>capitula</sup> ramulorum petiolata opposita oblonga, <sup>vel ovata oblonga</sup> <sup>caeta pillicera</sup> <sup>2-3</sup> integerrima obsoleta nervosa vix venosa, obtusissima basi subacuta junctura oculo armata subvillosa adaltera supra subtus villosa peduncululi pollicari solitarii bracteati Capitula cum bracteis magnitudine.

Fructus baccatus epulentus Honig forte receptaculum

ovalifolia N. foliis ovali oblongis obtusi glabris pedunculis Termini  
nabur

Habitat in India orientali Honoy J

Rami teretes oppositi, cortice uniceo glabri superne subtetra-  
ni folia petiolata opposita nervosa axillis nervorum  
subtus villosi ~~subtreci~~ obscur venosa integerrime  
Glabra bi f. tripollicana: pedunculi in apice ramu-  
lorum solitari unguiculari subtetragoni. Capitulum  
magnitudine nucis Coryli. Capsula uniceiformis & semina  
duo loricata obtusa basi vix attenuata latere interiore sulco