

Nepenthes

1. Distillationis N.

referatur ad Dose: Syngeni

Crinita Nepenthes Utriculis inferne ventricosi superne adhaerenti ven-
tre ferisibus 2bus aculeorum longitudinalibus.

Habitat in Madagafcar herb. Guss.

Utriculi tripollicares. Folia latera quam in distillatoria
aliam vidi speciem forte diversam Utriculis amplissimi pithamei
basi ventricosi, foliis subtus panem villosi. e Madagafcar.

tubinata Nepenthes: foliis ellipticis, utriculis tubinatis lobatis

Habitat in Madagascar Commerf. herb. Mus.

Caulis crassius digiti intermedii. Folia basi in petiolum vaginantem depresso,
elliptica, glabra, glaberrima, obscure venosa, nitida, apice cuneato
lob. cuneis ferealis. Utriculus glaber, lavis, palmatis, pollicis et duos lata,
inferne versus sensim attenuata. Pedunculus terminalis, pedalis, pube-
scent: pedicelli alterni. Flores pedicellati caxemofi, aures tomentosi

Nepenthes

Siphocampylus malacensis Guss. gen.?

Habitat Malacca Herb. Guss.

Ampulla spithamea, inferne oblonga, medio contracta, sursum dilatata
lanceolata, subnervosa. Tolia magna

Destillatoria Nep. Lin. t. V. p. 220 Hort. Cliff. 431. *

Utricaria vegetabilis zeylanicum Pluk. Alm. 399. t. 237. fig. 3.

Cantharifera Rumph. amb. 5. p. 121. t. 59. fig. 2.

Bandura zeylanica, in extremo foliorum folliculatum reniformem
expansum habens Burm. zeyl. p. 42. Tab. 17.

Planta mirabilis destillatoria Gurm. E. N. C. an. t. Dec. 2. p. 363.
fig. 363.

Habitat in Zeylona.

Caulis suffruticosus erectus glaberrimus uti tota planta.

Folia alterna lato lanceolata bipollicaria et ultra subavenia
integerrima in petiolum basi amplexicaulem attenuata apice

curvo filiformi reflexa rigida terminata cylindro longitudi-
ne folii ascendens basi angustior medio parum dilatatus laxis

inveasato striato, valvula subtunda ^{interius recurva} clausa. Pedunculis
subpubescentibus flores racemati compo. pedicelli bif. triflori. Calyx

persistens extus pubescent

retroso venoso

numerosi fasci
impressi