

(com notius cymis) Nepeta
corymbis pedunculatis racemosis

1. Padana. N. floribus racemosis, pedunculis multifloris, foliis cordatis dentato serratis
petiolatis
2. angustifolia N. corymbis pedunculatis racemosis, foliis lanceolatis rugosis tomentosis
set obtuse serratis
3. nepetella N. corymbis pedunculatis racemosis, foliis cordatis oblongis lanceolatis
profunde serratis tomentosis
4. pannonica N. floribus paniculatis, foliis cordatis petiolatis obsolete crenatis
5. comita N. cymis pedunculatis multifloris hirtis, foliis oblongis cordatis vellosis
set subsessilibus, corolla lobis lateralibus reflexis
6. violacea corymbis pedunculatis, foliis petiolatis cordatis oblongis dentatis
7. micana N. cymis pedunculatis multifloris, foliis petiolatis oblongis subsessilibus
crenatis tomentosis
8. ucranica N. floribus paniculatis, foliis lanceolatis serratis sessilibus
9. nuda N. florum racemis verticillatis nudis, foliis cordatis oblongis sessilibus
serratis.

10. *italica* N. floribus sessilibus verticillato-spicatis: bracteis lanceolatis longi-
tudine calycis, foliis cordatis petiolatis obtusis
11. *hispida* N. floribus sessilibus verticillato-spicatis, verticillis tomento-obtusis
12. *scordatis* N. ^{fr.} fructibus terminalibus sessilibus: bracteis subcordatis sessilibus vellosis, foliis
cordatis obtusis
13. *tuberosa* N. fructibus terminalibus; bracteis oblongis acuminatis, nervis lineatis
coloratis, foliis cordato-oblongis pubescentibus, corolla lobis lateralibus
reflexis
14. *lanata* N. fructibus terminalibus, bracteis ovatis nervis rugosis subspariosis, foliis
oblongis cordatis vellosis, corolla lobis lateralibus patentibus
15. *amboinica* N. floribus subsessilibus, foliis cordatis obtusis crenatis, bracteis
ovatis
16. *malabanca* N. fructibus verticillatis: bracteis filiformibus, foliis lanceolatis infer-
ne integerrimis
17. *tomentosa* N. (*Cucurbitaceae*) floribus paniculis axillaribus, foliis ovatis serratis
tomentosis
18. *indica* N. corollam lobis superioribus integerrimis brevissimis, floribus verticilla-
tis
19. *virginica* N. capitulis terminalibus, staminibus longe longioribus, foliis lan-
ceolatis

20. multifida N. floribus spicati, foliis pennatis, ^{oblongis} pennis indivisi
21. botryoides N. floribus verticillato spicati, corolla lobis lateralibus subrotatis,
foliis bipennatifidis laciniis lineantibus subaequalibus
22. Cavendulacea N. spica compacta, foliis ovatis indivis. serratis lineatis
- (13-4) 23. repens colens N. foliis cordato-lanceolatis, profunde serratis, cymis inferioribus
axillaribus remotissimis, superioribus racemosis

mutabilis Nepeta? glaberrima ramis vixatis remote spiciflora
foliis cordatis duplicato serratis, calycibus defloratis elonga
tis Act. sci. h. n. Par. 1. pag. 110
Habitat in America meridionali

anfrata Nepeta foliis cordato lanceolatis acutis obtuse den-
tatis, spicis secundis calycibus anfratis faucibus villis lan-
so Act. bot. h. n. Par. 1. pag. 110.
Habitat in Amer. merid.

glutinosa Rachys glabra, ramifissima, ramulis spinescentibus, pedunculis
axillaribus solitariis unifloris bi-tractatis
Rachys glutinosa ramis ramifissimis, foliis lanceolatis glabris
len. 1. V

Stipituli pedalis ramifissimus, uti tota planta, glaber, ramis
tetragoni: ramuli in ^{ramis proligatis} sumam deprentes,
folia inferiora petiolata, lanceolata-oblonga, unguis alaria
integerrima, basi attenuata, semper venosa: ramulorum
lineana sespita, longitudine interstitionum, linearia.
Pedunculi in ramulis superioribus, solitarii, uniflori,
foliis brevioribus, superne foliis duabus lineis longitu-
dine calycis.
Calycis purpurei.
Corolla extrorsuta

pungens B. inermis, foliis ovatis pungentibus, bracteis ciliatis Lin. Suppl.

pag. 290 - S. V. p. 577.

Habitat ad Cap. 6. p. 5

Omnes ex pedalis rigidus ramis cortice cinereo rami supreme
pubescentes pilosi. Folia ovata unguiculata opposita sessile
ovata ciliata nervosa rigida integerrima vel denticulata
subtus costa nervi et margine pilosissima. Flores axilla-
res gemini ex altera ala tantum foliis longioribus sessile
bracteis lanceolato rigida in sumam attenuata margine
utroque dentibus minutis duobus rigidis folia calycina
externa ovata nervosa venoso reticulata, denticulata
in sumam attenuata dentibus utroque 3 bus sumis
ciliatis

foliola majora calycis
dentato serrulosa dentate subciliata

Scapata

Cotana cretica humilis pedicorde Tournes.

Habitat in Creta herb. Desf.

Caulis herbaceus, ascendens, villosus, inanis. Folia petiolata, semipollicaria, cordata, obtusa, obtuse serrata, villosa canescentia. Flores sessiles, rac. Bractea ovato-lanceolata. Calyx villosissimus: laciniis subulatis. Corolla ead. villosa, calyce duplo longior: lobum superius bifidum: laciniis linearibus obtusis. Stylus bifidus. Anthera didyma
an De Harkno?

reticulata Nepeta

Habitat

Herb. Desfont.

Caulis herbaceus, ascendens, pedalis, simplex, villosus. Folia opposita, cordato
lanceolata, obtuse ^{emittit} et grosse serrata, acuta villosa, superiora exsertum inter
gemina. Verticilli ⁵ve vel 6. distantes. Bracteae ovatae, acutae, pallidae,
venosae

Nepeta

Habitat in Oriente Libi Desfont.

Saxos. Catania. Caulis herbaceus, erectus, villosus. Folia remotissima: inferiora petiolata, superiora sessilia, cordata, obtusa, grosse obtuseque serrata, villosa, ut pollicaria. Verticilli pedunculati, oppositi, subdistochi. Calyces striati, villosi, superne colorati, coerulei: folia florum superiora lanicolata. Pedunculi in seniore folio longiores.

Nepeta

Catana minima orientalis, minima, Lamii folio, flore longissima Tournef.

Cor. pag 13.

Habitat in Armenia herb. Tournef.

habeo

Panyophyllus

Nepeta

Catana orientalis, *Lavandula flore* Tournef. Cor. pag. 13.

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Caules pedales, simpliciter, ramosi, iniani, uti reliqua plantae. Folia cordato-ovata. Verticilli racemosi: pedunculi pariter septemflori. Calycis tomentosus, caeruleus.

habes

Teucrioides Nepeta.

Le Manth.

Catana orientali Teucriifolia Lavandula odore, verticilli florum Craspiis Tournef.

Cor. pur.

Habitat in Oriente herb. Aust.

Facies N. Italico. Incaena, erecta. Folia petiolata, semipollicana, crassa, cor data, serrata. Verticilli spicati, terminales: inferiores parum remotiores, superiores conferti, sespites, multiflori. Folia floralia ovata, in partem deflexa, verticilli breviora

Nepeta

Catana orientalis, minor, foliis *Heliotropii* Tournef. Cor. pag. 13

Habitat in oriente herb. Tournef.

Folia inferiora ovata, crenata, basi versus integerrima

racemosa Nepeta

Catana orientalis Lavandula flore Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caules plures; inferne ramosi vel simpliciter, incani. Folia cordato ovata. Verticilli
circa quatuor, pedunculati, singuli 4. 5 flori

Nepeta racemosa La Mark

Nabes

Nepeta

Catania Lusitanica betonica foliis

Habitat in Lusitania

Caulis villosus, subaerescens. Folia inferiora petiolata, oblonga, obtusissima, obtuse serrata, vix
pelticaria, villosa, superiora sessilia. Verticilli remoti, multiflori, violacei. Bractea lineari-
lanceolata, inferiores ^{non coloratae} parum ciliatae, longitudine verticilli, cuspidati. Calycis la-
cis subulato, subpergenter, villosi, uti bractea violacea

varietas Nepeta tuberosa secundum C. Mart.

Nepeta

Catana orientalis flore intense coeruleo Tournef. Cor
Habitat in oriente herb. mus.
Folia remota cordata

Habeo

Nepeta

~~Nepeta~~ Catania orientalis minima Camisifolio flore longissimo Tournef. Cor.

pag.

Habitat in oriente herb. Mus.

Pedunculi elongati. Verticilli 2-3 flori inferiores pedunculati axillares, superiores
conferti hirsuti. Calyx coloratus, v. lobis. Sola unguiculari

habes

hirsuta Nepeta

Herbarium fructuum Lavandula flore et odore Boiss. plant. var. 410 tab. 25. fig. 2

Nepeta africana alopecuroides

Habitat in Italia herb. Mus.

Caulis bipedalis, erectus, herbaceus, crassitie pennis cygneis, angulis obtusis, pubescentibus
superne ramosus. Folia ovata, superiora subsessilia, obtusa, obtuse serrata. Nervi
frequenter ramosi. Bractea inferior cordata, obtusa, viridis, superiores oblongae, usque
coloratae

Nepeta hirsuta L. Mark

herbes

melissofolia hepata

Palana cretica melissofolis asphodeli radice Tournesort. Por. 13

Habitat in Creta

Caulis herbaceus, erectus, crassitie pennis anferus, ramosus. Folia petiolata, cordata, obtusa, profunde obtuseque serrata, supra glabra, subtus villosula. verticilli superne, remoti, pedunculati. Bractea villosa. Calycis apice violacei

hepata melissofolia L. Mart. habeo

heliotropii folia Nepeta

Radana orientalis minor heliotropii folio Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. mus.

Caulis herbaceus, canescens, ramosus. Folia petiolata, oblonga, in vaginam. Pedunculata axillari, bis dichotomi, folio longiorer

nepeta heliotropii folia L. max. habes

racemosa Nepeta

Patana orientalis Lavandula flore Purp. ref. Cor.

Ababitat in oriente herb. Fusf.

Pauli herbarii, pedalis, erectus incanus, ramifer: rami fere altitudinis caulis. Dolea
petiolata, cordata, obtusa, crenata, incana, ^{lib} nervosa. Pedunculi 5-7 flori
longi brevissimi, longitudine bractearum. Calycis corollae ciliis, tomentosi, striati.

Madagascariensis Nees

Habitat in Madagascari Commesf. herb. 4usf.

Caulis herbaceus, striatus, oculo armato villis raris adspersus. Stipulae petiolatae, pollicariae, per
petiolum parum decurrentia, ovata, obtuse serrata, glabra, subtus oculo armato punctata,
simpliciter venosa. Petiolus longitudine folii subullosus. Racemus terminalis, 3-4 polli-
carius, verticilli plures, superne approximati, multiflori. Flores parvi. Calycis villosuli.

Heliotropifolia Nepeta

Catana orientalis minor *heliotropii folio* Tournef. Cor. pag

Habitat in Oriente herb. Guss.

Caulis ramosus, subaerisceder. Folia petiolata, sesquipedalica, remota, oblonga, obtusa, intermedia, obplate nervosa, utraque villosa, suprema mucronata. Pediculi axillares et terminalis folio longiores, apice tri vel ter trifidi. Folia floralia longitudine calycis, lineari lanceolata, mucronata. Calycis sessilis, longitudine foliorum floralium, striati, in conis: laciniis sepulata.

Nepeta

Catana cretica melissofolia *Opphodeli radice* - Tournef. Cor.

Habitat in Creta herb. Fusf.

Caulis crassus pennis anserino, leviter villosus. Folia polluciana, cordata, grosse serrata, obtusa, supra glaberrima, subtus villosula, subavenia, juniora subtus nervosa. Verticilli pedunculati, distanter. Paleola floralia linear-lanceolata, pedicello longiora. Calycis villosi, striati, unguiculares: laciniis lanceolatis, cuspidatis.

Tenuifolia Nepeta

Habitat herb. Rusf.

Caulis ramosus, inanis. Folia petiolata, semipollicaria, cordata, remote serrata, obtusa, simpliciter venosa, canescentia. Verticilli superne, breviter pedunculati. Folia floralia superiora lanceolata, integerrima, uti calycis villosi, longitudine verticillorum.

Lidofoleia N. paniculis caespitosis, pedunculis verticillatis filiformibus. foliis
cordatis & Hederis Sect. Angl. pag. 9

non vidi

Loma

Catana N. floribus spicatis: verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis ~~obtusis~~
~~crenatis~~ cordatis dentato-serratis L. V. Tl. Dan. Tab. 900

Catana herba Dod. pempt. 99.

Mentha catana vulgaris et major Bauh. pin. 228.

β-Mentha catana minor Bauh. pin. 228.

Habitat in Europa &

Caules ramosi cespitosis obtuse tetragoni. Folia petiolata
attenuata nervoso venosa lobis subcuneatis grosse serrata

Racemus terminalis. Pedunculi oppositi multiflori. bracteae
petales. Calyx incani

racemosis

1-2. angustifolia Nepeta ^{Nepeta ramo ramosa} ~~comylis pedicellatis fissatis~~, foliis lanceolatis rugosis tomentosis obtuse serratis

Catania tenuifolia Clus. hist. 2. pag. 33.

Nepeta aragonensis incana foliis lanceolato-linearibus serratis subpetiolatis, floribus dense paniculatis, racemis obtusis. La Marche Encycl. cum quo communis legi passim in Aragonia. 4

Caulis erectus, pedalis, ramosus, ubi tota planta tomentosa incana. Rami simplicis semi.

Folia petiolata, lanceolata ^{obtusiuscula}, ^{rugosa}, obtuse serrata, semipollicaria. compacta

Peduncululi ~~vegeti apice appressi, conferti in spicis et oblongam~~ ^{terminali} Clus.

Bractes ~~raro lineares~~

Floris ~~comylis~~ ^{pedicellatis} ^{appressi}, conferti ^{oblonga}, compacta, conferti

Calyx ^{dentibus} dentibus lanceolatis acutis

Minime est varietas N. Catania, nec faciem in horto culta mutat. Folia basi acuta, ^{omnia} ~~superiora~~ apice obtusa, calycis acuti ~~non~~ ^{venis} cuspidata. Catania vero ~~differt~~ ^{differt} folia basi subcordata ^{part.} ~~superiora~~ ^{venis} dentibus cuspidata. Nepeta angustifolia, minor Hispanica Boiss. & Heldr. Icon. 735. et Boiss. Mus. pars 2. 75. Tab. 61. ad nostram forte pertinet, flores vero pauciores et remotiores in specie penitentur, quam in angustifolia nostra.

Nepetella N. cymis pedunculatis, foliis cordatis oblongo-lanceolatis profunde
serratis tomentosis Hort. New. 2. p. 206

Nepeta nepetella foliis cordatis lanceolatis dentatis tomentosis
floribus racemosis: racemulis quinque floris Lin. Spec. pl. pag.

7974

Habitat in Europa australi

Planta catana triple minor. Caulis ramosus canescens. Folium an
gusta perva, acuta obtuse serrata sub minor subrugosa
Flores laxeracemosi. Pedunculi oppositi sub quinqueflori
nisi 30 flor. ut in violacea calyces rubri. Dentibus violaceis
Corolla recentis rubra

graveolens N. foliis cordato-lanceolatis profunde serratis; ^{cymis inferis umbis} pedunculis axillaribus oppositis ^{remotis} superioribus racemosis.

Catana minor alpina Bauh. bot. pin. 228.

Nepeta floribus spicatis, verticillis inferioribus remotis, foliis petiolatis lanceolatis serratis Gen. fl. Gallorr. 274. n. 2.

Nepeta graveolens foliis cordato oblongis serratis bracteis lanceolatis verticillis 8-12 floris in arvis subserendis Vill. fl. Delph. 2. p. 366

Habita in Europa australi

Facies Nepeta nepetella. Caulis pedalis cinerascens ramosus.

Folia nervosa pollicaria ~~to~~ petiolata cum vix cinerea
floris. floris 3-4 in singulis pedunculo breviter pedicellatis bracteis
cinereis uti calycis tomentosi. Tubus calycis longior quam in coctens

pannonica N floribus paniculatis, foliis cordatis petiolatis obsolete crenatis
Lin. f. v. pag. Jacq. fl. austr. Tab. 129.
Mentha pannonica montanum 1. Clus. hist.

Mentha montana verticillata Bauh. pin. 227.

Nepeta pannonica major et elatior Monf. bot. 3. p. 415. f. 11. t. 6. fig. 6

nepeta nuda Jacq. fl. austr. V. 24. fig. Murr.

Habitat in Pannonia &

Specimen herb. Lin. sub hoc nomine est Italica absque floribus
prodest. & murr.

conleat cymis pedunculatis multifloris hirsutis, foliis oblongis cordatis villosis
subsessilibus, corolla lobis lateralibus reflexis Hort. Kew. 2. p. 205.

Habitat

7

non vid.

violacea II verticillis pedunculatis corymbosis; foliis petiolatis cordato-oblongis
dentatis. Lin. l. v.

nepeta montana purpurea major, sparsa specia Boerh. mus. 2. p. 46. t. 36. Barr
fr. 601.

Catana hispanica, betonica folio angustiore, flore coeruleo Tournef. Fr. 4. 202

Habitat in Hispania &

Caulis erectus bipedalis et ultra, angulis violaceis.

valde diversa a differentia
Specimen sub hoc nomine in herb. univ. et Italia abspice floribus. Figura 14. anel
mean non quae 10

~~canescens~~ *canescens* R. Cymis pedunculatis multifloris, foliis petiolatis oblongis subcor
datis crenatis tomentosis Hort. New. 2. p. 205.
Habitat 4

non. 205.

ucrania n. floribus paniculatis, foliis lanceolatis serratis sessilibus nudis
Linn. S. V.

Catana betonica foliis angustioribus, flore com. lesp. etc. Gerb.

San. Chr.
Habitat in Ucraina

Planta mea an Lin:

Caulis vir. pubescens altus singulis comibus folia bipollicina
petiolo brevissimo obtusa serrata glabra pedunculati ^{comibus} rami
pedicelli verticillati 4. 6. bracteae setaceae longitudine
calycis pubescentis dentes calycini violacei an hoc
potius violacea Lin. credo

non vidi

nuda N. florum caulis verticillatis nudis, foliis cordatooblongis sessilibus serratis
Len. S. V. Mant. 410

Mentha catana hispanica, olim sidentis albugina, flore albo
Baub. hist. 3. p. 226.

Nepeta foliis sessilibus nudis, calycibus fructus ovatis & quadratis
Hort. Ups. 644

Nepeta pannonica Gaeyh. fl. 4. 129.

Habitat in Hispania 4

Caules erecti ramis bipedales glabri. Folia sessilia vel petio-
lata haecydis polustri utroque parte. Cimeae minime
Racemi bracteati

Nep. pan. Gaeyh. fl. Austr. 2. 129

Aglicia N. floribus sessilibus verticillato-spicatis: bracteis lanceolatis longitudine
calycis, foliis petiolatis lin. spec. p. 798^{798x} Gaeq. hort. 2. 7. 112.
mentha catania minor alpina Bauh. prod. 110. pin. 220.

Habitat in Italia 7

Caules ^{medalis} exae ramosi, caespitiosi. Cofia obtusa, cordata obtusa
obtusè serrata, utrinque villosa, venosa pollicaria. Spica
terminalis, elongata & verticillis multi floris remotis sessilibus
bracteis lineari lanceolatis ^{atenuatis} obractatis. Corolla alba

hispida N. floribus sesplibus verticillato-spicatis, verticillis tomento obvoluti

Lin. l. V.

Horminum spicatum, Lavendulo flore et odore Bot. sic. 40. v. 25. fig.

2.
Habitat in Sicilia.

non vidi.

Pordotia N. spica terminalibus sessilibus: bracteis subcordatis villosis, foliis cordatis villosis, foliis cordatis obtusis. Hen Am. acad 4. p. 317. &

Pordium alterum lanuginosius verticillatum Bauh. pin. 240.

Pordotia Alp. exot. 2. p. 4. 203. Clus. hist. 2. p. 312.

Habitata in Creta &

Planta pedalis. Caulis pilosus. Folia petiolata, obtusa, crepula rugosa, tomentosa, crispipula. Spicae terminales, sessiles. Bracteis ovatis mucronatis, nervosis villosis, longitudine calycis quinque floris. Calycis pilosi. Corolla alba. Hen.
nicam, foliis ovatis

~~non vidi~~

Tuberosa N. spicis terminalibus, bracteis oblongis acuminatis, nervoso crenatis
coloratis, foliis cordatis pubescentibus, corollo lobis lateralibus reflectis
Hort. kew. 2. p. 206.

Mentha tuberosa radice Bauh. pin. 227.

Nepeta tuberosa spicis terminalibus sessilibus, bracteis ovatis colo-
ratis, foliis summis sessilibus Lin. Spec. pl. pag. 798 &

β. Nepeta tuberosa spicata hispanica Boiss. mus. 2. p. 44. t. 36.
Barral. H. 1131.

Habitat in Hispania, Lusitania &

Caulis simplicis ~~albi~~ ~~semipedalis~~. Folia inferiora petiolata
superiora sessilia, oblonga cordato-oblonga obtusa, obtuse serrata
nervosa pubescentia, sub verticillis duobus inferioribus cordatis
Spica terminalis longitudine cauli a verticillis plurimis
approximatis ^{inferioribus} ~~lateralibus~~, remotioribus bracteis ovatis, tenuis
venosa, pubescenti margine apice violaceo longitudine
calycum. Flores violacei. β. pro umbra est

cordato-oblongis

Canata N. fructus Verminalibus; bracteis ovatis nervoso rugosis subsessilibus;
foliis oblongis cordatis villosis, corolla lobis lateralibus patentibus

Hort kew. 2. p. 286

repeta Canata Jacq. obs. 3. p. 21. T. 75.

Habitat

Similis ut videtur N. ⁷⁴tuberosa. Radix tuberosa. Caulis vellis albi
cæulis obtusi pedales basi saepe procumbentes in ^{folia}ferora petiolata
superiora sessilibus. Spica sessilis

~~an in ea tuberosa potius Canata~~

amboinica N. floribus subverticillatis foliis cordatis obtusis crenatis; bracteis
ovatis Lin-Suppl p. 273 & S.V. p. 529.

~~Vrata Kartho Rheed Mal. 10. p. 179. t. 98.~~

Nepeta indica robustiore folio Monp. hist. 3. p. 415. f. 117. 6.
fig. 7.

Habitata in Amboina &

Rami erecti tetragoni, pubescentes, inferne atro purpurascetes.
Folia petiolata, cordata, obtusa, obtuse crenata, supra lineata,
mollissime subtomentosa, vincta subtus venosa. Petioli apice
dilatati breves. Flores subverticillati. Bracteis duo minuta,
ovata, acuta, integerrimo. Corolla labium superius album bene
inferius rotaceum lin

malabaria N. spica verticillata. bracteis filiformibus, foliis lanceolatis
inferne integerrimis Len. Mant. 566. P. V. p. 570
Nepeta malabarica, folio latiore, flore ex coruleo albo Moench. 3.

p. 415.

Canm Tumba Kled. Mal.

Habitat in Andia

^{caulis} Calycis erectus tetragonus tomentosis incanis uti tota
planta. Folia petiolata bipollicaria, obtusa extropus-
 serrata, subtus crevosa mollisima. Spica terminalis
e verticillis diffantibus multifloris. Flores brevissime pedun-
culati

~~Tomentosa~~
Miana N. florum paniculis axillaribus, foliis ovatis serratis tomentosis Thunb
fl. jap. p. 244 f. v. p. 529

Habitat in Japonia

Caulis herbaceus inferne teretisculus decumbens nudus: superne obtu-
se tetragonus, erectus tomentosus, indivisius pithamou vel paulo
ultra: folia petiolata, acuta, utraque tomentosa subtus al-
bidiora, ^{inferiora} semipollicata. Panicula in axillis supremis trifida
fastigiata Thunb

non vidi

indica N. corollatum. Labio superiore integerrimo brevissimo. Lin. Spec. pl.

pag. 799+

Habitat in India

Labium corollae superius omnium brevissimum integerrimum,
filamina longitudine labii inferioris, flores verticillati

Rheed. bot. mal. 10. 7. 00

michi ignota

hinc huc refert Vata-Vuska Rheed. Sym. Burm. Dubium

virginica N. capitulis terminalibus, staminibus flore longioribus, foliis lanceo-
latis lin. 1. V. pag

Clinopodium americanum folio, floribus albis Platan aln 110 t. 03
fig. 2.

Clinopodium flore albo, ramis, angustioribus foliis, virginianum
nonf. hist. 3. p. 374. f. 11. Tab. P. fig. ult.

Habitat in Virginia 4

amendona 18. species imbricati acuminati, foliis ovatis acutis pra
ti

Plukenet. 1. 62. fig. 2

non vid.

multifida M. floribus spicatis, foliis pinnatifidis integerrimis Lin. Spec.
pl. pag. 799*

Lavendula montana, folio valerianella vane scito Camlea
am m. r. th. 69.

Metonica sibirica Walth. hort. 122. 8. 20.

Habitat in Daunia

Caulis plures erecti, herbis simplicissimi tetragoni. ^{Suprema peltata} Folia petiolo
paucipinnata pinnis quinque oblongis nervosis villosi inferioribus
oblongis ultimi incisae alternis terminalis reliquis ma-
ior fere pollicari. Spica terminalis ^{3 pollicari} calidonea & verticillis
confertis albedo villosi. Bractea ovato acuminato longi-
tudine calycis

foliis pinnatis

batryoides N. flombus pinnatis; corolla lobis lateralibus subpatulis; foliis pen-
natifidis: laciniis linearibus subopacibus Hort. kew. 2. p. 207.
Nepeta multifida flombus pinnatis, foliis bipinnatis linearibus lin.
Suppl. pag. 273, N. ed. 14. p. 530.

Habitata in Siberia C

Caulis erectus pedalis bracteatus pubescens. Folia bipinnati-
fida laciniis linearibus obtusi integerrimis glabris. Spec-
terminatis, dest. axona alba sessiles. Flores breves pedicellati, ⁴⁻⁶ ~~6-4~~
ad singulum verticillum calycis villosi

lananen/1m.

Lavandulacea N. spica compacta foliis ovatis in i. p. serratis lineatis her. Suppl
pag. 272. + S. V. pag. 30

Habitat in Siberia

Caulis erectus bracteatus, teres, purpurascens; albida pilosus
fruticosa pedalis. - Folia opposita, petiolata obtusius-
cula profunda obtuse serrata, Veron. officinalis. in
femina integerrima. Spica terminalis obtusiuscula, ovato
oblonga. Bractea ardua, ovata, acuta, longitudo calycis
Flores sespites. Cal. fuscis conulescens. Corolla violacea ma-
xima in hoc genere Lin

non vidi
an idem cum Museta multif. Spic. pl.

X. obtusata } Beakf
compacta } Plum. ed. 162. fig. 2.