

# Merium

1. *Soleandrus* N. foliis linearibus lanceolatis ternis, densissime subtus nervosis, foliolis  
calycinis lanceolatis, nectariis
2. *odorum* N. foliis linearibus lanceolatis ternis tenuissime subtus nervosis, foliis  
calycinis linearibus, nectariis multo partibus.
3. *salicinum* N. foliis linearibus lanceolatis ternis enerviis, calycinibus corollae  
que villosi
4. *coronarum* N. foliis oppositis ellipticis, pedunculis ea dichotomia ramo  
rum geminis, subdichotomis.
5. *regianum* N. foliis lanceolatis oppositis, ramis rectis
6. *divaricatum* N. foliis lanceolato-oblongis, ramis divaricatis, corolla  
nunc tubo brevissimo laciniis linearibus
7. *antidysentericum* N. foliis lanceolato-oblongis acuminatis, corollae  
pedunculis dichotomis <sup>per myriacem, qua folia an-</sup>  
tubo filiformi longo.
8. *obesum* N. foliis lanceolato-oblongis frangis, subtus villosis

Zeylanicum Nerium

folliculi cylindrici utrinque acuti glabri tripollicares penna columbina parum  
crassior

pitum  
Scandens

Nerium foliis ovatis acuminatis nervosis, corymbis terminalibus com-  
positis, calycibus tomentosis

Habitat in India orientali

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, bipollicaria, acuminata, acuta, sili-  
qua oblique <sup>remote</sup> nervosa, subtus tenuissimis nervosa, venis fusco purpureis  
Flores in <sup>corymbis</sup> racemis compositis patentibus. Calycis foliola linearis-lanceo-  
lata, intus glabra, semipollicaria. Corolla tubus angulatus, calycis  
multo brevior: laciniis limbi obovatis

herb. hort

Divaniatum n. foliis lanceolato-ovatis, ramis divaniciatis Lin. fl. reyl. 105 +  
Apocynum zeylanicum indicum frutescens, neri flore candido fimo  
Herm. parad. 40

Habitat in India B

Arbustula rami crassi nigrosi. Folia opposita, lanceolato-ovata,  
utrinque acuminata, glabra integerrima petiolata. Pedun-  
culi e ramificationibus caulis. her

mea gaudet ramis <sup>divaniciatis</sup> Dichotomis rami floriferi axil-  
laribus, oppositis di vel tetraphyllis. Folia petiolata  
lanceolato oblonga nervis remotis subtus venis tenuis-  
simis pallidiorum acuminata basi vix auriculata.

folia acuminata, oblonga  
habes certe sic: herb. Her  
manni.

peduncululi ex axillis ramorum terni dichotomi  
divaniciati folio longioris. foliolo calycina rotun-  
data. Corolla <sup>non</sup> tubus ex calyce parum longior utri-  
lombus <sup>utrinque</sup> ~~caulis~~ velle pubescens. <sup>ad centem</sup> laciniis corollae line-  
ares oblongae obtusae tubo triplo vel quadriplo  
latiores

laciniis lineari-bus

tubo corollae brevissimus

ant. dyfent encum N foliis ovatis acuminatis petiolatis Lin fl. zeyl. 102. 1. V  
nenum indicum filiquis angustis emittis longissimis Burm zeyl. 167. t. 77.  
Podaga - pala Rheu mal. 1. p. 85. t. 47. ?

Habitat in Andia

Rami teretes glabri superne dichotomi. Folia petiolata opposita, canaliculato oblonga acuminata bipollicaria glaberrima nervi pauci remoti subtus vix venosa. Peduncululi est dichotomia ramorum et terminales. Flos vel ster

dichotomi foliis breviores. Squama parva ad ramificationes

Rami teretes glabri punctati supeme subcompressi, pubescentes. Calycis parva ovata acuta. Tubus corollae fere pollicaris basi amplior supra calycem vix aequalis.

Folia ovata glabra simpliciter venosa Longo.

nenum Burm. zeyl. Tab 70. fig 1. 2. hujus tantum varietates videtur. folia enim interdum in eodem ramo breviora et parum latiora

Podaga

figura Rheu. folia tam lata et habita tam diversa ut sit nostram et Burm. abscindo

oleander N foliis linear lanceolatis. Ternis, nervis, corollis coronatis Lin. S. V

Rhododendrum Dod. pempt. 251

Nerium floribus rubescentibus Bauh. pin. 464

Habitat ad Gades Barbaria. Et oriente ?

Rami superne angulati glabri. Folia terna utriusque acuta, sub  
petiolata tri-impollicina et ultra, sub coriacea, supra enervata  
subtus obscure transversim nervosa. <sup>terminalis</sup> Corymbus terminalis  
summa lanceolata ad ramificationes. Calycis foliola  
lanceolata, attenuata apice patentia ~~subnatis~~

---

apice patentibus, nectariis

foliis calycinis lanceolatis

India specie videtur differre

Donum Neri foliis linearibus lanceolatis ternis, foliis calycinis erectis, nectaris  
multiplicatis: laciniis sepaliformibus Hort. Kew. 1. p. 297.

Tjovanna - areli Rheed. Mal. g. p. 1. 4. 1.

Belutta - areli Rheed. Mal. g. p. 3. t. 2.

Habitat in India orientali 5

Rami superne dichotomi. Solia saepe quaterna angustiora  
quam <sup>in Oleandro</sup> pubescente striata. Pedunculus terminalis angulatus: pedun-  
culi partialibus 3-4 <sup>sub</sup>intermediis dichotomis magis determinata  
te densi quam Oleandri, bractea et Calycis multo angustiora  
quam in Oleandro cui maxime affinis  
calycis foliola pubescentia ut in Oleandro.

Scandens Renum caule scandente, pedunculis terminalibus multifloris, laciniis  
costis longis formis Lus fl. Cochinchina pag. 116

Habitat in Cochinchina

Fructus magni ramis scandentibus. Folia ovato-oblonga, ceterum  
subacuminata glabra, opposita. Flores magni Calyx tubuloso  
synous brevis. Corol. tubus <sup>albus</sup> superne urceolatus, laciniis subulatis linea  
rubris repandis. Nectarium ad ostium. Laciniis multis acuminatis  
in coronam dispositis. Anthera apice cauda filiformi longis  
sima terminata. Folliculi crassi



1-2 Solanum Nerium foliis linearibus lanceolatis ternis enerviis. Corollis

~~paucis~~ <sup>pubescentibus.</sup>  
Nerium foliis ternatis, longe lanceolatis, planis nitidis, pyramida

Habitat <sup>libani</sup> ~~Arabia~~ <sup>Tosk.</sup> descr. pag 205

(Affinis Nerio Oleander, differt foliis obtusis, subtus pubescentibus  
nec transversis nervis transversis copiosis, calycibus ternatis  
tubo cinereo tubo brevi <sup>inferne</sup> ~~superne~~ ampliato cincto villosis  
Corollis triplo majoribus)

Coronarium Nerv. foliis ellipticis, pedunculis ex dichotomia ramorum geminis biflo-  
ris Hort. Kew. t. p. 297.

Nandi ~~Cravatam~~ Rheed. Nat. major et minor Rheed. mal. 2. p. 105. t. 54. 55.

Asmimum zeylanicum foliis oblongo, flore albo pleno odorato fms Barn  
zeyl. 129. t. 59.

Stos manihanus Rumph. amb. 4. p. 0. t. 39

Nerium coronarium Jacq. coll. 1. p. 138.

Habitat in India orientali & superne dichotomi

Rami uti tota planta, glabri. Cilia breviter petiolata bif. tripol  
licaria acuminata nervosa. Pedunculi plerumque gemini  
interdum biflori saepe bis dichotomi. latius calycis  
lanceolata acuta.

acuminatis geminis  
subdichotomis

Zeylanicum N folus lanceolatis oppositi, ramis rectis Lin. Am. Acad 4.

p. 309\*

Apocynum arborescens, panicifloro minus Burm. seyl. 23. t. 12. fig. 2.

Habitat in ~~India~~ nemorosis Zeylona

Rami fructi teretes, purpurascens. folia opposita  
subpetiolata, coria erecta, acuminate. Lin.

non vidi  
habitat in nemorosis Zeylona

Nonium zeylanicum folliculi cylindrici glabri striati utrinque acuti

Agropyrum

1-2 obesum Merium foliis lanceolato-oblongis sparsis, subtus villosis.  
Merium obesum; foliis sparsis; oblongis, ramis coriformibus Corth.

Deser. pag. 205-

Caudex mollis, bulbam referens supra terram, volumine capitis  
humani Corth. Rami crassitie digiti minimi, subpartia cau-  
dici, superne attenuati, glomerati seprosi, cicatrifati.  
Folia ad apicem ramorum, approximata, subpetiolata, oblonga,  
fovea tripollicaria, basi angustiora, mucronata avenia.  
subtus villosa-tomentosa: juniora utriusque mollia. seta  
nonnulla rigida in astellis foliorum.

Corymbi terminali, multi flori. Stores breves pedicellati: pedicell.  
villosi.

Calyx quinquepartitus, vix bilinearis, pubescens: laciniis lan-  
ceolatis

Corolla tubus inferne angustior longitudine inferne spatii bilineari  
angustatus, dein amplius, pollicaris, pubescens. ambis  
laciniis rotundatis

+ quinque villosis  
longitudinalibus

quaeque  
 Filamenta brevissima superne in Tubi parte angustior, Anthera sagittata,  
 superne cum stigmae coherentes; flavo, latere interno macula  
 fusca, apice seta pilosa longitudine corollae terminata  
 Pistillum. Germine duo globosa. <sup>in fundo tubi</sup> Stylus unicus longitudine  
 antherarum. Stigma capitatum, apice bidentatum: lateribus  
 quinque dentatum.

Quamvis folia parva, in contactu raro obvia, hucus tamen familia esse  
 monstrat antherarum figura et cohesio cum stigmae, omnino  
 ut in Nerio. Corolla <sup>et floris munda</sup> ~~exhibet~~ <sup>accedit</sup> ~~idem~~ <sup>dentos</sup>  
 nullos in faucibus, <sup>non coarctatum</sup> ~~potius~~ <sup>similem</sup> ~~et glandula~~  
<sup>sed desunt</sup> ~~de~~ <sup>modo</sup> glandula ad basin germinis <sup>adescent</sup> ~~quo~~ <sup>quod</sup> tamen  
~~desunt~~, ~~idem~~ cum vero Anthera caudata <sup>ut in fig. no</sup> ~~potius~~ cum Eosphalco  
 sub genere Nerii retineo usque dum fructus innotescat. Habi-  
 tu ad flori Convolutus Rumph. 4. p. 85. t. 30 satis accedit diversa au-  
 tem omnino est

verum tandem Louisa