

Nicotiana

1. Tabacum N. foliis elliptico lanceolato-ovatis sessilibus decurrentibus, floribus acutis paniculato racemosis acutis
2. fruticosa N. foliis lanceolato ellipticis subpetiolatis, floribus suborymbosis acutis, caule suffruticoso.
3. longiflora N. foliis ellipticis subpetiolatis, floribus racemosis corollis longissimis obtusis.
4. angustifolia N. foliis lanceolatis subdecurrentibus, racemis secundis, corollis quinquefidis obtusis
5. glabra N. foliis cordatis petiolatis, floribus ^{racematis} racemosis secundis subnatis
6. pusilla N. foliis oblongo-ovalibus, floribus racemosis acutis
7. paniculata N. foliis petiolatis cordatis petiolatis, floribus paniculatis ~~obtusis~~ obtusis clavatis

8. rustica N. foliis ovatis petiolatis, floribus racemosis paniculatis obtusis
9. undulata N. foliis lanceolatis amplexicaulis, floribus obtusis
10. ussura N. foliis cordatis crenatis micis recurvatis, caule hispido pro
nymphe.

angustifolia Nicotiana

Nicotiana angustifolia foliis lanceolatis, superioribus linearibus, acutis,
pannicula diffusa, corollis angustifloris, limbo plicato Fl. Peruv. 2. p. 16
Tab. 130. fig. a.

Habitat Chili in versum O.

Vis cosibima. Caulis erectus, superne ramosus, teres, paniculatus. Folia
intermedia; inferiora pedicelata, lanceolata, acutissima; superiora subses-
silia, linearia, acuta. Flores terminales, paniculato-racemosi, diffusi.
Pedicelli axillares terminalesque, breves. Calycis lacinae lanceolatae
lineares, inaequales. Limbus corollae plicatus albus. Tubus videlicet calycis
triplo longior. fl. Per. l. c.

simpliciter. Folia superiora linearis lanceolata
racemi axillares et terminales folium sub pedicellis

3 Longiflora N. foliis ellipticis petiolatis, floribus racemosis, corollis longissi-
mi obtusi

Habitat ad monte video

Caulis uti tota planta pubescens. Folia ovata basi
in petiolum planum brevem attenuata, obtusiuscula integerrima
nervosa crassiuscula sequipolliciana. Pediculi
terminaliter flori pedicellati alterni remoti. Pedicelli
sequipolliciaes. folia duo ovata ad basin sinuati
pedicelli state forte sicut in reliquis cum floribus alter-
nantes. Calyx quinquefidus laciniis linearibus obtu-
sis. Corolla mirabili dichotomo tubo tri vel qua-
drupolliciana angustius superne parum ampliatum.
Lacinae laeviss.

Nicotiana axillaris La Mart

Petunium longiflorum Gusf.

sub La Mart

tomentosa Nicotiana

Nicotiana tomentosa; foliis lanceolatis decurrentibus. Subtus tomentosa, panicula
maxima diffusa, corollis subnatis acutis. Fl. Per. 2. pag. 16. Tab. 129. ff. a

Habitat in Peruvia niderata et arvis.

Radix viscosa. Caulis suffruticosus, terogyalus. Caulis erectus, superne ra-
mosus, subtenuis. Rami patentes, leviter angulati. Folia sparsa valde decurren-
tia, lanceolata, acuta, integerrima, subtus tomentosa, in aera, supra pu-
bescentia, venis purpureis. Panicula terminalis, maxima, patens, hirsuta
viscosa. Calyx subqualis. Corolla subnatis, glabra, purpureo-ubra. Tu-
ber angustissimus, calyce paulo longior. Dactylus amplius. Limbus campa-
nularis; laciniis acutis. Stamina caetera, incurvata, uti etiam stylus. Capsu-
la ovata, calyce semidecisa. Fl. Per. l. c.

5
Glutinososa N. foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus racemosis secundis
subnigrescentibus Lin. Spec. pag. 259
Nicotiana militaris Lin. in Act. Holm. 1753. p. 41. T. 2.

Habitat in Peru O

Paulis villosis glutinosus, uti tota planta. ^{fere} Folia petiolata acumi-
nata, tri-pollicana. Flores ~~racem~~ ^{racem} ~~racem~~ ^{racem} elongatus erectus
pedalis. Flores distanter folia floralia lanceolata pedun-
culi inferiora, pollicana, ^{unius} ^{separato} ^{masculi} superiore sensim minor. Lacinia
calycis ~~valde~~ ^{valde} acuminata. Corolla pubescentes dilute rubra

Calycis duplo longiora
superne versus
sem amplexata

Cult

rustica N foliis petiolatis ovatis integerrimis, floribus obtusi Lin. S. V

Pisiphylla Reval. spec. 40

Nicotiana minor Bauh. pin. 170

Habitat in America O

Caulis erectus bipedalis pubescens superne glutinosus. Solea
inferiora saepe pedalia superne sensim minoria obtusa nervosa
glabra. Racemi axillares et terminales, inter terminales
saepe ^{sub} paniculati. Calycis villosi laciniis ovatis. Corolla
viridi flavescens calyce dimidio longior pubescens tubus
hypocrateriformis laciniis rotundatis

culta

tabacum n. foliis lanceolato-ovatis sessilibus decurrentibus, floribus acutis
Linn. S. V

Blennothoes Rencal Jacq. 37. t. 30.

Nicotiana major latifolia Bauh. pin 169

Habitat in America, nota Europae ab 1560 ☉

Caulis tripedalis pubescens folia bipedalia acuminate
sive pubes subtus pubescentia latiora quam in fruticosa.

Panicula terminalis calycis et corollae extus pubescenti

calycis lacini lanceolato parum latiores quam in fruticosa

tubus superne ampliatu. limbi lacini ovata. tota

corolla coetanea ut in fruticosa. Capsula obtusa

elliptico lanceolatis

paniculato racemosi

undulata Nicotiana

Nicotiana undulata, foliis lanceolatis petiolatis undulatis, racemis terminalibus,
calycibus bilabiatu, corollis brevibus acutis. Fl. Peruv. 2 pag. 16 tab. 130. f. 6.

Habitat in Peruvia loco frigido ☉

Pubescens, viscosa. Caulis tripedalis, erectus, angulatus, superne ramosus.

Folia petiolata, lanceolata, acutiuscula, integerrima, undulata, venosa.

Pedunculi axillares, breves, solitarii, uniflori, in racemum simplicem, folio
superius erectum, terminalium. Calyx tubulosus campanulatus, bilabiatu,

quinquedentatus: denticulo supremo longissimo, obtuso. Corolla lutea.

Tubus longitudine calycis. Limbus brevis, acutus. Capsula ovata,
calyce brevior. Fl. Peruv. L. c.

Racemi axillares et terminalis; foliorum ad basin pedicellorum

urens Nicotiana foliis cordatis crenatis, racemis recurvatis, caule hispido pruriginoso Lin

10

Spec. pl. p. 259* L. V. p. 221

Nicotiana atrofascens fringiflora, flore exalbido. Plum. Spec. 7. p. 211.

Habitat in America meridionali. herb. Vaill.

Errecti peratis racemis secundis revolutis, Corollae campanulatae, Foliaque cordata
ut in glutinosa, sed crenata et tota arbor aculeata.

Folia petiolata, pedalia cordato ovata, dentato serrata dentibus den-
tatis, utraque villosa incana. Petioli et costa iseti venteribus adpressi
Racemus hirsutus recurvatus. Calycis foliola lanceolata. Corolla polli-

caris
Rami setis albidis nictantibus. Folia oblonga, pubes incana. Racemi
pedunculati: semper alev. Capsula pendula herb. Gussf

fruticosa. N. foliis lanceolatis subpetiolatis amplexicaulis, floribus acutis
caule frutescente Lin. l. ✓
Nicotiana foliis linear-lanceolatis acuminatis semiamplexicaulis,
caule fruticoso Mill. Dict.

Habitat in Cap. b. Spei, China & Y.

Caulis pubescens. Folia ovata-lanceolata integerrima
nervulata pilis rarissimis oculo armato videntis, attenuata
Porymbus terminalis. pedunculi pollicares uti calyces et
corolla estus villosa. Calyx pollicaris lacini lanceola-
ti attenuati uti Corolla. Corolla bipollicaris pallide
purpurea

6. *pusilla* Nicotiana foliis oblongo-ovalibus radicalibus; floribus racemosis acutis Lin. S. V. p. 221
Nicotiana foliis ovato-lanceolatis obtusis rugosis; calycibus brevissimis Mill. 4c.
183. fig. 2.
Habitat in Vera Cruce

non vidi

7
paniculata N. foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus paniculatis obtu-
sis clavatis. Lin. Spec. pl. pag. 259. 7
Nicotiana minor foliis cordiformi, tubo floris prolongo Dec. per. 1. p. 717.

N. 10

Habitat in Peru O

Caulis bipedalis superne pubescens teris. Folii glabra. Panicu-
la terminalis elongata. Calicis calypis est canaliculata
acuta. bractea se bractea corolla sesquipollicari glabra
tubulo se tubo vixi flarescenti tubo dilatato limbo vix
ullo.

Nicotiana paniculata foliis cordatis obtusis, panicula maxima,
corolla clavatis, limbo obtuso revoluta. Fl. Per. 2. pag. 16 Tab. 129.
fig. 6.