

Nolana

1. prostrata N.

Rh-gen filamenta basi hirsuta. Anthera subtriangula. Semina receptaculo caroso  
coacta, epidermide succulenta, vestita, oblongo subtriangula, latere interno  
quadripartita &c. Per.

Char. generico adde.

Calyx quinqueangulans vel ovatus <sup>5que fidus</sup> inflatus. Corolla campanulata. Tubus  
brevi, quinqueangulans. Limbus subquinquelobis plicatus. Filamenta basi  
hirsuta. Stigma capitatum obsolete pentagonum. Semina 5que receptaculo  
carnoso coeclis, epidermice succulenta vestita, oblongo subtrigona.  
Semina 1-2-3 soepe abortiunt. germina 6 in nonnullis 1-2 abortientia.

prostrata Nolana Lin. dec. 1. tab. 2. S. V. p. 19.

*Atrypa foliis geminatis, calycibus polydactylis, caule humifuso* Quam hort. 82

Waltheri Ehrh. Bot. angl. 1764. n. 53. p. 130. t. 10

Fungosa Det. helv. 5. p. 267. t. 1.

Habitat.

Caulis pedalis, herbaceus, prostratus. Sape <sup>tripedalis</sup> ramosi rami infero  
res longitudine caulis. Folii alterna gemina, <sup>noctivana</sup> rhombos ovata  
integerrima <sup>sup. glaberrima</sup> subcarnosa <sup>glabra</sup> laevia plana, venosa subpapulosa  
alterno folio major, alterno minore. Pedunculi laterales  
solitarii, pollicariis uniflori, superne in craspati.  
Calycis pentagoni, laciniis sagittatis.

coronata Nolana.

Nolana coronata, caule prostrato, foliis <sup>sub</sup> deltoidibus <sup>ovatis</sup> ovatoque, calycis laciniis subcordatis, faucibus corollae villosissima. Pl. Peruv. 2. pag. 7. tab. 112. fig. 6.  
Habitat in Peruvia arenosis et saxosis collibus. O

Succosa. Caulis prostratus, ramosisimus, teres, villosiusculus. Folia longe petiolata, <sup>aerena</sup> oblique cordato-ovata, utrinque nitida, villosiuscula, intergemina. Petioli villosiusculi folio longiores. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, foliis saepe longiores. Calycis lacinae subcordatae; fructiferae bipartitae. Corolla calyce triplo major, inferne alba, superne coerulea, emarida purpurascens. Dant villi corollati. Semina oblongo reniformia, obsolete trigona, latere exteriori carnosa, interiori exsiccata. Pl. Peruv. l. c. Calycis pentagoni

villi inter stamina. Folia ovata acutiuscula

inflata Nolana

Nolana inflata; caule prostrato, foliis radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis, calycibus inflatis T. L. Penw. 2. pag. 7. Tab. 112. fig. a  
Habitat in Pennsylv. collibus arenosis ©

Succosa. Caulis prostratus, inferne ramosus, angulatus, purpurascens, nodalis. Folia pubescentia, repanda: radicalia longe petiolata, bipalmata, ovata, integerrima, rarius dentata; caulina inferiora aeterna breviter petiolata, basi inaequalia, subobliqua: superiora gemina, brevius petiolata, ovato-cordata, integerrima. Panicula terminalis, foliosa. Pedunculi laterales solitarii, uniflori. Folia longiora, purpurea. Calyx <sup>caeruleo ovato</sup> ovatus, 5-lobus, striatus. Corolla albo-vioacea, calyce triplo longior. Semina 400.

Folia ovata, <sup>superius opposita</sup> per petiolum parum decurrentia obtusa, pedunculata axillares  
se duo ex altera axilla et 1. in opposito uniflori longitudo ne foliorum

inflata. Nola na folia radicalibus nicholatis ovato-lanceolatis, calycibus  
inflatis

*Spathulata Nolana*

*Nolana spathulata*; caule erecto, foliis cordato-triangularibus obliquis, calycibus in fructu bipartitis: laciniis spathulatis & C. Pers. 2. p. 7. tab 113. fig. a.

Habitat in Peruvia collibus, arenosis ☉

Pubescens. Caulis erectus, ramosus, teres: rami superne angulosi. Sola altera nate gemina, petiolata, repanda, cordato-obliqua, basi inaequali integerrima, carnosa. Petioli hirsuti, canaliculati. Pedunculi interfoliacei solitarii, uniflori, folio brevior. Calyces hirsuti; fructiferi bipartiti. Corolla albo-purpurea: intus tubo hirsuta. Stylus basi pentagono-terminatus. Calyces pentagoni.

revoluta Nolana

Nolana revoluta, caule procumbente, foliis confertis oblongo lineari-  
marginibus revolutis, calycibus ventricosis Fl. Penn. 2. pag. 10 Tab  
113. fig. 6.

Habitat in Penna arenosis ☉

Succosa. Caules semipedales, plures, procumbentes, ramosi, angu-  
latis, albis, vixis. Folia gemina, altero majore, oblongo-lineari  
integerrima, crassiuscula, pubes albida, marginibus revolutis,  
sessilibus. Pedunculi axillares, terminalesque, solitarii, uniflori,  
foliis breviores. Calycis ovati, ventricosi. Lacina lanceolata. Corol-  
la corollae violacea, calyce triplo longior fl. Per. l. c.