

Nymphaea

1. lutea N. foliis cordatis integris: lobis approximatis, calyce pentaphyllo
petalis longiore
2. alba N. foliis cordatis integerrimis: lobis imbricatis rotundis, calyce
tetraphyllo
3. odorata N. foliis cordatis integris emarginatis: lobis divaricatis acuminatis
obtusis, calyce tetraphyllo
4. advena N. foliis cordatis integerrimis: lobis divaricatis, calyce hexaphyllo
petalis longiore
5. lotus N. foliis ^{peltatis} subrotundis ^{dentatis} peltatis bifidis, laciniis imbricatis
6. macrophylla N. foliis ^{peltatis} subrotundis cordatis ^{dentatis} peltatis ^{dentatis}: lobis
divaricatis
7. nelumbo N. foliis peltatis undique integris
8. capensis N.

Lagotis folia Nymphaea.

Habitat in Armenia boreali herb. Rich.

Folia sagittata, 3-4 pollicaria, obtusissima, arenaria, enervia, glabra, pollicem lata. auricula ovata, obtusa, divaricata. Calycis foliolo subrotundo. Corolla lutea, parva. Stigma lineis elevatis.

Nymphoa

Habitat. in Carolina herb. Desfont.

Folia cordata, integerrima, sinu clauso aperto, subtus tomentoso-incana. Stigma
crenatum

Chenop. Nymph. foliis oblongis acuminatis; flombus subternis masculis inferioribus caule fruticoso dens. fl. Cochinch. pag 343.

Habitat prope Cantonem

Cauli 4 pedalis, erectus. Folia tomentosa alterna petiolata. flore apicali.
Anthera 6 loculari (anthera potius 3.) Germana apice pedunculata locis 3 stigma
tis. Baccia 3 loculari

reticulata *Nymphaea* foliis ^{ovali} peltatis subcordatis ^{lobis} bene divariatis subintegerrimis
subtus venis elevatis reticulatis.

Habitat in Guinea Thonning &

Radicula filiformis, longissima, conacea. Folia natantia, palmata
lobi portici subovati, inferne dentata uno alterove remotis sive obtusa
vs, glabra, subtus e viridi rubra, e vasis elevatis dichotomis, anastomosis
partibus reticulata, areola inter venas hexagona. Petiolus teres, fistulosus
vis. Scapus teres, fistulosus, fructiferae flexuose contractae, fructu
immerso. Claviculae pollicares. Calyx tetraphyllus: foliola lon-
gitudine corollae, pollicaria, lanceolata. Corolla Petala 8-10
16, quadruplici serie, oblonga, dilute rubra. Stamenta ^{dilatata} plana, rubra
dilute rubra, adhaerentia minus. Germen subrotundum. Stigma
radice 8, margine totidem crenatum. Bacca magnitudine Cerasi
globosa, 8-12 locularis Thonning.

elliptica Torreyana foliis ellipticis utraque acutis, ^{pedunculis dichotomis;} corollis brevibus.

Habitat in Brasilia herb fusca 5

Rami trigoni, crassitie pennis Cygnis, glabri, uti tota planta. Solia petiolata, 4-5 pol
liciana, oblonga, panem acuminata, utraque glaberrima, venosa, supra nitida, basia
ta, integerrima. Pedunculi terminales, terni, angulato compressi, dichotomi. Agly
sis dentes exati, acuti. Corolla semi polliciana, glabra. capsula cylindrica, pol
liciana, oblonga, crassitie exati intermedii.

Squamifolia Kymph. foliis subrotundis imbricatis, flombus solitariis lous
fl. cochinch. pag 544.

Habitat in sylvis montosis Cochinch.

Arbor magna. folia alternatim pennata. foliola minima. flores
minuti. peduncululi bases retro curvati

♂ Cal 4 fidus. Cor. o. Stamina coarsura. Anthera magna 4-6 loculari
glanulo 4 orbiculato ad basin staminum. ♀ Cal 6 phyllis inferis Cor. o
Nectarium 6 fidus. Stylus 1. graspus. Stigmata 3. bifida. Capsula compressa
rotunda obtusa trigona triloculari 3 sperma

agnis species videntur

pubesca Nymph. foliis ^{obli}ovatis acutis utrinque pubescentibus, floribus geminis fructu bacca
to axillari Tour. fl. Coch. pag 544

Habitat in Cochinchina. 5

Arbor mediocrius. Folia alternè pennata. Flores apertali masculis Calyce
ephyllus. Anthera sessili 6 loculari. Stylus crassus brevis Stgm. 3. Bacca
5-loba

1 Lutea N. foliis cordatis integris: lobis approximatis, calyce pentaphyllo
petalis longioribus Hort. Kew. 2. p. 227.

Nymphaea lutea Lam. epit. 635-

Nymphaea lutea major Bauh. pin. 193.

+ Habitat ad Europa littora, sub dulci aqua &

+ Nymphaea lutea foliis cordatis integerrimis, calyce petalis majoribus
pentaphyllo Lin.

Calycis laciniis rotundatis petala longitudine filamentorum
subimpraequantibus
filamenta plana brevia

B. Valmiane in rivulis Carolinae d. d. Richard

Dolia pro qui pollicariis, oblonga basi rami divergentia

Sagittifolia N. foliis cordatis sagittatis undulatis Walth fl. Carol

pag. 135.

Habitat in Carolina

non vidi

reniformis N. foliis reniformibus Walt. fl. car. pug. 135
Habitat in Carol.

non vid.

pentapetala N. folus peltatis undique integris, corollis pentapetalis
Walt. fl. Carol. pag. 138.
Hab. in Carol.

non vidi

crenata *Mallorica* crenata *Fischeri*

^{non}
Nescheli Nymph. folus ovalibus subpetiolatis integerrimis Burm
ed.

Habitata India orient.

non vidi.

¶ Nelumbo N. foliis peltatis undique integris Lin L.V. pag. 491.

Wern-Tamara Rheed. mal. 11. p. 61. t. 31.

Tamara Rheed. mal. 11. p. 59. t. 30

Nymphaea fabifera, India paludibus gaudens, foliis umbilicatis
amplis, pediculi spinosi, flore roseo purpureo Plut. in al.
267. t. 322. fig. 1.

Nymphaea indica, faba aegyptia dicta, flore incarnato Heron
parad. 205. t. 205.

Taratt. Rumph. amb. 6. p. 160. t. 73.

¶ Nymphaea affinis glabra, ferax virginiana, umbilicata foliis,
~~ad Nymphaea affinis glabra, ferax virginiana, umbilicata foliis,~~
~~ad Nymphaea affinis glabra, ferax virginiana, umbilicata foliis,~~
Habitat in Andis ?

Solia ex aete peltata subrotunda nervosa nervi
versus apicem dichotome ramosi integerrima

¶ forte species diversa.

8. Copenfis N.

Habitat in Cap. b. p. ei

Flores canlei

Folia defuncti specimine

macrophylla N. foliis peltatis cordatis dentatis lob bifidis laciniis divaricatis

6
Cumbel Rheed. Mal. II. p. 51. t. 26

Habitat in India orientali
a N. loto aegyptiaca differre videtur magnitudine
foliorum et florum, foliis crasporibus lobi non approximati
in Calyx pentaphyllo

Nymphaea lotus foliis cordatis dentatis in fl. regl 1947

1 meridionalis Ternstromia foliis ~~obovatis~~ ^{obovatis} emarginatis integerrimis, pedunculis
axillaribus.

Ternstromia meridionalis Lin. Suppl. pag. 264

(Panum ob ^{insequente} ~~procedente~~ differt foliis brevioribus, basi acutis, apice
rotundatis emarginatis, pedunculis foliis fere longioribus

2
alba N. foliis cordatis integerrimis: lobis imbricatis rotundis, calycis tetra-
phylo Hort. kew 2. p. 227

Nymphaeae alba Cam. epit. 634

Nymphaea alba major Bauh. pin. 193.

Nymphaea alba foliis cordatis integerrimis, calycis quadrifido
Linn. S. V.

Habitat in Europa et America aquis dulcibus &
Petali tetraes forati. Sola conacea nervi ob searibus
immensi bifido versus marginem evanescentes. Calyx
tetraphyllus foliis quadrifido laciniis paniculatis
obtusis Petala unguis 12. Alba calycis parum longiora

2 odorata N foliis cordato integris emarginatis. lobis 2 wnicatis acumine
obtusis, calycis tetraphyllo Hort. kew. 2. p. 227. y

Nymphaea alba flore pleno odorato Cleyt in Gron. v. d. 2.
p. 81.

Nymphaea alba minor Gmel. p. 4. p. 104. 7. 71.

Habitat in America septentrionali et Siberia orientali. y

Specimen hujus (ut credo)se Madagascari communicavit Dr
de la Motte cuius igitur spectat.

Pitambel Rhed. Mal. p. 11. p. 53. 8. 27

et foliorum lobi acuti in figura in mea folia desunt

castronk. forte d. w. p.

non vidi

4 advena N. foliis cordatis integerrimis: lobis divaricatis, calycis hexaphyl-
lo petalis longiore Hort. kew. 2. p. 2264.
Symphoa floribus flavis Gron. vry. ed. 1. p. 164.
Habitat in America septentrionali 4
Petioli semiteretes. Folia cordato-oblonga versus apicem ma-
gis angustata quam in N. lutea. Pedunculus: foliola
calycis exteriora 3 patentia extus viridia intus ferdide
purpureo aspicientia. interiora duplo majora subserata
extus flava intus ferdide purpureo aspicientia. Petala
13. subinæformia, apice rotundata H. kew

6 Lotus N. foliis cordatis dentatis in fl. reyt. 1944

Lotus aegyptia Alp. Egypt. 103. exot. 214. 7. 213. 216. 210. 220. 222. 226.

Amberl. Ind. Mal. 11. p. 51. 7. 26

Nymphaea indica, flore candida, foliis in ambitu serratis Boan.
herb. 1. p. 252.

Habitat in calidis ~~India~~, Africa, America 4

~~egyptiaca~~ Choli & ex ter striati folia obscure nervosa. Folia subrotunda
da vix pithema a tenera quam in reliquis vena
obscuri immersis petala lanceolata.

India differre videtur lotis divaricatis foliorum,
folia ~~per~~ minor. Flores majores

bifidis laciniis imbricatis
foliis subrotundis ^{sub} peltatis, dentatis