

Ochna

Gruppo 2-5 in receptaculo carnosissimo - Anthera subsessile periana
approximata

1. *lucida* O. racemis lateralibus, foliis serratis glabris
2. *parvifolia* O. pedunculis unifloris foliis serrulatis glabris
3. *integerrima* O. foliis oblongo integerrimis, subtus subpubescentibus,
pedunculis axillaribus unifloris

brasilensis Jacquiniana et *longifolia* Wedd. Thoreau obtusifolia herb. Lan-
manthii Purshii descripti et ex aliis herbis

Ochna

Calyx 5 phyllis foliulis ovatis - canaliculatis obtusis corollae
brevioribus

Petala 5que obovata

Stamina filamenta vix ulla. Anthera 9-10. petalis brevioribus
canaliculata

germen superum a tuberculis 5que receptaculo oblongo infidentes

Stylus subulatus

Puerto Rico

nitida Ochna foliis ^{elliptico-} lanceolatis serratis nitidi, racemis lateralibus subsimplibus
calycibus corolla aequalibus

Ochna nitida: ca. lycinis corolla aequalibus, duplo receptaculo superimpositis,
foliis ellipticis serratis Sw. prod. pag. 67.

Habitat in Montserrat Dr. Ryan 5

Rami teretes, superne angulati, cortice cinereo, glabri: ramuli alterni
remoti, floriferi cicatricato-tuberculati, apophylli. unguem vel pollicem lata,
folia petiolata in apice ramulorum, petiolata, bipolliciana, ~~et~~ lanceo-
lata vel elliptico-lanceolata, serrulata, tenuissime venosa, glaberrima
supra nitida, basi acuta.

Petoli

Racemi ex apice ramulorum. Pedunculi bipollicares, simplices, rarius
ramo ad basin, purpurei: pedicelli unguiculares, filiformes, uni-

flori

Calyx longitudine corollae. folioli lanceolati
filamenta 10 brevis fimo. Anthera erecta, subulata, corolla breviori.
Stylus filiformis, filamentis parum longior. Stigma acutum.

2. parvigolia Ochna pedunculis ^{late} unifloris foliis oblongis serratis
Eucynomus inermis foliis alternis ovatis serratis. Boiss. desp. pag. 204.
Refert Ochnam squarrosam demta magnitudine foliorum et in florascenda.
Indica ramis teretibus, glabris: cortice cinereo-punctato.
foliis serrulatis. Tantummodo in ramulis, petiolata, oblonga, serrulata,
basi integerrima, venosa, nitida, unguiculata.
Pedunculi ad latera ramulorum, solitarii, uniflori, superne sensim in-
crassati, purpurei, foliis longiores.
Calyx et fructus ut in Ochna.
(Tubis ad Eucynomum retulit Boiss. ut ex schedula planta affixa
vidi.

mucronata *Gomphia* *Dikna*

Habitata Madagascar Commerc. her. Guss.

Rami glabri, uti tota planta, teretes, fusci, cinereo frequentes punctati. So-
lea ad apices ramorum, oblonga, basi acuta, apice mucronata, setaceo-serri-
ta, setis flavescentibus, apice fusci, tenuissime venosa, nitida, costa subtus
purpurea, bis. tripollicaria. Racemi ex apice ramulorum laterali-
um semipollicares, 5-6 flori: pedicelli purpurascens, unguiculares. Ca-
lycis foliicola oblonga, obtusa, colorata. Petala flava venosa, obovata. Sili-
menta copiosa. Erueta globosa, magnitudine pisi: receptaculo majore
confidente
Stipulo pubulato, caduco

Cardiosperma Ochrea

Habitat herb. Ca. manthii 4

Rami teretes, glabri, cortice cinereo. Folia bipollicaria, lanceolato-elliptica, venis pinnatis venosa, glabra, nitidiuscula, serrulata, obtusa, basi versus integerrima. Panícula terminalis. Pedunculi angulati: pedicelli uniflori. Nascitur in receptaculo superimposito, magnitudine Piperis

Othna

Habitat ad Sierra Leonam. Herb. Fus. 5

Rami teretes, fusci perpurascentes, glabri. Folia brevissime petiolata, 2-4
pollicaria, lanceolata-elliptica, basi sessis in tegerrima, ext. rostrum remo-
te serrata, attenuata, membranacea, venis sine venosa, nitida. Racemi sim-
pliciter, bipollicares, ex ramulis ^{opice} ~~lanceolatis~~ ^{dem} : pedicelli solitarii, cernit. 11.
unguicularer. Stamina copiosa. Fructus subglobosi, magnitudine pipi, nitida
receptaculo globoso, minore infidentes.

ſex lobata Ochna

Habitat he. Ab. Guaf.

Rami teretes, glabri, uti reliquæ partes, cortice ferè nigro ² griseo, punctati,
ſcabriusculi. Folia ſubpetiolata 3-6 polliciana, oblonga, ^{ſupra} venis ſine venoſa
ſubtus areolis, utrinque nitida, baſi ſubovata, apice acuta, remote dentata,
dentibus ſpinofi pungentibus, facie ſere ilicis, coracea. Racemi terminales,
compoſiti: pedicelli triſlori. Baccæ receptaculo ſuper impoſitæ.

Haud bene convenit cum figura Plum.

1 Squarrosa *Pichna* racemis lateralibus ^{foliis serratis glabris} Lin. fl. reyl. 2094
Gapsapita cinnamomi foliis, floribus pinnatis Burm.
reyl. 123. t. 56.
B. Arbor africana, subrotundo folio margine denticulato
aperti acutis apice, floribus pentapetalis atropurpureis
Pluk. n. alm. 41. t. 263. fig. 1. 2.
Habitat in India B. in Africa
rami teretes, dicotylati, ex pedunculis basi trifloratis
squarrosi. Folia ad apicem ramorum conferta alter
na obovata vel oblonga, ^{obtusis} mucronata, membranacea
nervi copiosi ^{subtus} striata, serrata serraturis seta parum elongata
tripollicaria. Racemi infra folia. Pedicelli pur
purei pedunculo longiori meso articulati glabri.
Foliola calycis oblonga striata

aliam foliis lanceolato ellipticis utroque acuti

pubescenti
integerrima
3 *Oryzopsis* *oblongifolia* var. *gracilis*, subtus pubescenti pedan-
cili axillari uniflori

Habitat

Tuscan

Rami scaberrimi, glabri, superius punctati. Solia petiolata alterna
bis. stipulati ^{ovata} elliptica venosa nervosa subtus canescente
demum carter villosa. pedunculis cernui

flori non vidi sub nomine *Oryzopsis* a Tuscan habui forte non
hujus generis

elliptica T foliis ellipticis acutis integris, pedunculis lateralibus
~~Hort. bot. Sw. prodr. p. 21.~~
Habitat in India occidentali, Guadeloupe, St Vincentii &