

Ocimum

1. thyriflorum O. floribus paniculato fasciculatis, caule ramosissimo
2. polystachyon O. corollis quadrifidis racemi aphylli apice nudantibus
3. inflectum O. panicula terminali racemosa, caule ramisque flexuosis
4. negosum O. racemis terminalibus, foliis ovatis acutis serratis subtus rugosis
5. virgatum O. racemis verticillatis virgatis, foliis oblongis serratis
6. acutum O. racemis filiformibus, foliis ovatis acuminatis serratis; bracteis
7. molle O. ^{herbis} bracteis subrotundis lanceiformibus, foliis ovatis cordatis acutis serratis
8. gratissimum O. racemis ^{negosis} verticibus, foliis ovato-lanceolatis ^{venis tomentosis} acutis obtusis serratis, caule fruticoso.
9. inodorum O. foliis ovatis serratis glabris; caule herbaceo
10. fruticosum O. foliis ovatis glabris ^{stipicis} magna acutis ^{perpetuis} articulis nudis caule
11. monachorum O. ^{60-janense} staminibus edentulis: alternis basi barbatis, foliis ^{suffruticoso} ovatis obtusis villosis

12. verticillatum O. ^{racemis elongato nudis} floribus verticillato quaternis pedunculatis, foliis ovatis
 obtusis ^{platis} ~~ambly~~
13. crispum O. racemis terminalibus, foliis ovatis serratis crispis, calycibus hypopis
14. album O. verticillis ramorum approximatis: nubilibus tetragonis, corollis ere
 natis, foliis ovatis obtusis.
15. barbatum O. foliis lanceolatis subserratis, caule piloso, genitalibus barbatis
16. ciliatum O. calycibus bracteisque ciliatis, foliis lanceolato-oblongis utrin
 que acutis subintegerrimis, caule subpiloso
17. ~~album~~ ^{fulvum} O. foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis
18. mini mura O. foliis ovatis ~~int~~ subintegerrimis utraque acutis
19. americanum O. ^{fruticulosum} racemis teretibus, foliis sub lanceolatis acuminatis subserratis,
 caule herbaeo, genitalibus herbaceis barbatis
20. punctatum O. racemis simplicibus erectis, foliis ovatis subtus punctatis
21. sanctum O. foliis oblongiusculis obtusis serratis undulatis, caule hirsuto, bra
 ctis cordatis
22. gibbosum ^{ovatis} foliis superionibus sessilibus, caule hirsuto herbaeo
23. filamentosum O. foliis ovatis oblongis serratis filamentis longissimis.
 caule subhirsuto
24. papillifolium O. foliis linear-oblongis integerrimis, genitalibus longissi
 mis.

25. Tubiflorum O. foliis ovatis serratis glabris, corollis filiformibus
 tubo calyce triplo longiore
26. glabratum O. racemis filiformibus, foliis oblongis glabris crenatis
27. hirtum O. foliis oblongis serratis, caule fruticoso hirsuto
28. tenuiflorum O. foliis ovato-oblongis serratis, bracteis cordatis reflexis
 concavis, spicis filiformibus verticillis sexfloris
29. menthoides O. foliis lineari-lanceolatis serratis, verticillis multifloris
30. prostratum O. caulebus prostratis, foliis ellipticis lineatis
- # 31. capitellatum O. foliis ovatis, floribus aggregatis, pedunculis axillaribus
- Vaals O.
- + hololeucum 0
 zeylanicum 0

Ocimum

Thysiflorum O floribus paniculato fasciculatis, caule ramosissimo Lin. Mart 1747
Murr. in Com. Gott. 1777. p. 47. t. 5. Jacq. hort. Vind. v. 3. t. 72.

Habitat in India.

Caulis erectus lignosus sesquipedalis, totius ramis subtorsis bracteis
tuo f. paniculatus, ramulis verticibus utrinque canaliculatis.
Folia petiolata, elliptico lanceolata utrinque vincta, nuda, ter-
tis serrata basi integerrima, acuminata. Panicula ramorum
terminales; bracteata dense f. conferta, foliis vix longioribus; e ra-
mulis verticillatis purpurascens. Bractea lanceolata, pur-
purascens ~~extus pallida~~ a reliquis differt statura ramoso
fructibus, foliis magis virentibus duntaxat. Olor
rubeo. Floribus in thysam fasciculatis Lin

polytaechyon O. crollis quadrifidis, racemis aphyllis apice nutantibus Lin. Mant. 567

J. V. pag. 545. Mur. in Comm. Gott. 1772. p. 71. Tab. 3.

Habitat in India

Caulis erectus bipedalis et ultra brachiatus angulis acutis scabris
Rami conopsea erecti. Folia petiolata, ovata attenuata, obtuse
grossè serrata. Petioli longitudine foliorum. Racemi axillares
bivariati longi aphylli erecti apice nutantes propositi noctis
verticilli 6 flori. Lin

inflexum !. panicula terminali racemosa, caule ramisque flexuosis Thunb. fl.
Jap. 229 S.V. p. 546

Habitat in Japonia

Caulis herbaceus uti rami flexuoso erecti, apice inflexi, tenuis pime
somentosi. Folio ovata, acuta, serrata, tenuis pime scabra, ungui
culana. Panicula coarctata Thunb.

non vidi

non eadem cum Plest. inflexo

Myofum O racemis terminalibus, foliis ovatis acutis serratis subtus rugosis Thunb.
fl. jap. 244 t. V. p. 546.

Habitat in Japonia

Caulis tetragonus pubescens, tenuissime tomentosus bipedalis et ul-
tra. Folia acuminata subtus pallida, racemi ter-
minales contracti Thunb.

~~Myofum peractum Lin. Suppl. forte hinc pertinet~~

non vid.

in eadem cum Pleit. Dubis

virgatum O. racemis verticillatis virgatis, foliis oblongis serratis Thunb. fl. jap. 2507
S. V. pag. 546.

Habitat in Yagoria

Caulis tetragonus profunde sulcatus, tenuissime tomentosus -
flexuosus - erectus ramifus. Rami cauli similes, inferius
res remotiores superiores virgati. Folia tenuissime to-
mentosa, pollicaria. ~~flores~~ verticilli 6 flori Thunb.

non vidi

acutum. Racemis filiformibus, foliis ovatis acuminatis serratis, bracteis hirsutis Thunb.
fl. jap. 248 + l. V. pag. 546.

Habitat in Japonia

Caulis tetragonus erectus, glaber, lavis. Folia petiolata
inferne integra glabra, subtus pallida, tripollicaria
pollicibus ovata lata. Racemi digitales, bracteis ovata
acuta, hispida. Thunb.

non vidi

molle O. foliis ovatis cordatis acutis serratis rugosis: pubes. laevis, bracteis subtenden-
dis cuneiformibus Hort. kew. 2. p. 322. *

Habitat in India orientali O.

Tota planta pubescens saevolevis: Caulis crassus obtus. tetragonus.

Folia laete ovata, acuta serrata: serraturis obtusis inaequalibus: rugosa
mollia profunde cordata: lobi approximati inflexi. Petioli folio
breviores. Corolla violaceo-albida. filamenta plura.

non vidi.

gracilissimum v. caule suffruticoso, foliis lanceolato-ovatis, racemis verticibus Lin. Spec.
pl. pag. 832. Mart. 414. L. V. pag. 545.

Ocimum zeylanicum perenne odoratissimum latifolium Burm. fl. zeyl.
174. t. 80. fig. 1.

Habitat in aqua

Caulis basi perennans fructus tripedalis simplex tetragonus. hirtus
v. primum superne. Folia petiolata per petiolum parum
decurrentia, costa supra tomentosa carens obtuse serrata
subtus pallidiora. Spica ante anthesin tetragona. Bractea
cordatis acuminatis prominentibus.

ovato lanceolatis acutis obtuse serratis

inodorum O. foliis ovatis serratis glabris, caule herbaceo

Habitat in India orientali

Racis O. gratissimi ad folia omnino glabra minor, pollicaria,

Caulis et calycis glabris. bractea ovata minuta lacina calycis
inferiori fetaticeo corolla ~~lacina~~^{lacina} ~~superiore~~^{superiore} calyce triplo longior
recta

frutescens. O foliis ovatis glabris serratis utrinque acutis articulis nudis; caule
suffruticoso.

Habitat in America

Caulis ramosus pueri ramis atropurpureis glabris sulcatis quatuor
costatis. Folia petiolata sesqui pollicaria ~~at~~ acuminate
utrinque nervosa. petioli filiformes lutei in foliis breviores.
Racemus terminalis articulis sex flori.
Radix o. gratissima cocta vero non tomentosa.

monachorum O. flaminibus edentulis: alternis basi barbato foliis ovatis obtusis
vellofis

Ocimum caryophyllatum monachorum Bauh. hist. 13. p. 260

Aceros Dioscoridi *Clum* phyt. 90. t. 71

Ocimum monachorum flaminibus edentulis: alternis basi barbato hinc
Grant ps. 4

Habitat. O

Caulis erectus teretifidus; pilosus ramosus. ^{atrinque} Folia petiolata serrata punctata
serpis basi ^{prima} ~~intermedia~~ venis subtus profertim villosa, pollicaria. Racemi terminales verti-
cillis 6 floris. Pedunculus bifidus latus. Labium calycis obcordatum stans
tribus basi velis aliquot barbato apice denticulo purpureo
subtus stans quinque denticulis lateralibus ovatis mucronatis inter medius
subulatis apice purpureis. Bractea cordata mucronata reflexa
vidi duo uncinata corollae ^{calycis parum longioris} lobum inferius pallide purpureum oblon-
gam subtilissime crenulatum superius quadrifidum vixi lutescens
lobis oblongis. Anthera flava filamenta purpurea

Erigeron 0 racemis terminalibus, foliis ovatis serratis crispis, calycibus hepaticis

Thunb. fl. jap. 248. S. V. pag 546

So. Rompt. Am. 5. p. 704.

Habitat in Japonia

^{repens}
Caulis tetragonus, erectus, villosus, ramosus. Rami decussati
cauli similes. Folia petiolata, acuminata, inferne
integra glabra purpurea sentia, pollicaria. Petiolo
longitudo aequa folii. Rami digitales et pithamoi. Brac-
tea oblonga, acuminata, lobes glabra. Calyxes hepaticis.
Thunb

non vidi

album C. foliis ovatis obtusis: verticillis racemorum approximatis: rubiculis
Tetragonis, corollis crenatis Lin. ^{manus. 85. 7} ~~Suppl. p. 276~~ L. V. pag. 545

Habitat. in Java, India O

Caulis pedalis albo virido basi lignosus. Rami pauci. Folia
congenitum latiora et crassiora, ovata, concava obtuse serrata
Racemus ante floriferam tetragonus. bractea lanicolata,
cordata sine acuta. Verticilli approximati. Corolla magna
albo. Lin

Scabrum O - racemis simplicibus erectis, foliis ovatis serratis.
pauca Thunb in Act. J. Lin. 2.
Habitat in Japonia

non vid.