

Oryzum

*Ocimum venustum* herb. Thoreum  
an pulegioides Forsk. Halod.

*ciliatum* V. foliis lanceolatis oblongis utraque acuti subintegerrimis, caly  
cibus bracteisque ciliatis

Habitat in India orientali in horti <sup>et ruderali</sup> Rami striati decumante  
caulis herbaceus erectus ramis subulosis. folia petiolata, sequi  
pollicaria attenuata, integerrima vel serrata una alte  
rare obscura, subtus punctis puncta raris mucis terminalis  
e verticillis 6 floris. floris magnitudine ocyimi baplii. bractea  
utraque attenuata oblonga.

an *Ocimum ciliatum* Rumph. amb. 5. p. 266. tab. 93. fig. 1.

an *Ocimum africanum* foliis lanceolatis integerrimis pilosis. specis  
terminalibus verticillatis interruptis. Lour. Fl. Cochinch.  
p. 370

8-9 - refractum <sup>racemis apyellis villosis</sup> *Ocimum* <sup>foliis ovatis</sup> ~~longifolia~~ <sup>grosse crenatis basi transversis, corollis refractis</sup>  
*Ocimum* <sup>Hadiciense; foliis ovatis obtusis crenatis villosis flexilibus; floribus</sup>  
retrofractis Torr. Depr. pag. 119.

~~Habitata in montibus Arabi~~

Habitata in montibus arabicis Jellis et Madagascaria.

Caulis et folia hirsutia mollitacta.

Folia ovalia petiolata, ovata, versus apices ramorum caespita approxima  
ta, obtusissima, grosse crenata, basi transversa integerrima, palli  
cana latitudine eadem ac longitudine integerrima

Petiolis folio duplo brevior, basi parum dilatatus

Racemi semipedales, erecti. Flores 8-10 ad pedunculum verticillum. Pedi-

celli filiformes,

Calycis <sup>villosi</sup> fructiferi <sup>inferna</sup> basi gibbosi: laciniis inferiores setaceo aspen-

<sup>dentibus calycis</sup> dentibus. Corolla ea quae duplo longior: tubus basi parum supra calycem refra-

ctus ~~quae~~ sursum gibbosus.

Specimen e Madagascaria differt foliis subtus tomentosis mollissimis

~~specimen~~  
species Pleioanthi L'Heritierii est uti etiam *Ocy: Zatarhendi* Cor  
sholci



barbatum O. foliis lanceolatis <sup>pub</sup> serratis caule piloso, articulari barbato

Habitat in India Orientali O

Caulis erectus - squamatus. Tetragonus quadrangulatus, pilis variis  
erectis articulari barbato, rami quatuor oppositi pauci. Folia  
petiolata acuta subtus glauca v. indica petiole costis raris pilosa.  
Sesqui pollicina remota. Spica racemi terminalis. Calycis  
biflori.

*Falenus* O. foliis ovatis glabris, caule gemulato Molin. hist. nat. Chil.  
pag. 116.  
Habitat Chili

non vidi

basilium O. foliis ovatis glabris calycibus 3-lobatis Lin. L. V. p. 545

Ocimum Cam epit 300

Ocimum caryophyllum magis Bauh pin. 226.

• β. Ocimum caryophyllum macron. Bauh pin. 226

γ. Ocimum latifolium maculatum f. crispum Bauh pin. 226.

α. Ocimum viride, foliis bullatis Bauh Pin. 225

Habitata in India, Persia &

Caulis erectus, ramosus tenues villosus, palmarum spithamou. Solen  
petiolata, utraque acuta, extorsum oblique serrata. Racemus  
terminalis erectus, a verticilli saepe floris. Sol bracteae petiolatae oblongae  
utraque acuta

γ. foliis inaequaliter serratis-incisi



minimum O. foliis ovatis integerrimis Lin. V. pag. 545

*Ocimum minimum* Baah. pin 226. Monf. hist. 3. p. 407. f. 11. tab. 10 fig. 17.

Habitat in Teylora O

Caulis erectus, inferne obscure tetragonus, leviter pubescens, ramosus  
nollese vridi. Rami erecto patentes, folia petiolata ~~ovata~~ vix unguis  
culana, glabra, integerrima fere superne serrata una altera  
ve. Racemus & verticilli 6 flori. Calyx leviter pubescens laciniis 4 or magne  
pubescente. Corolla labium superius quadrifidum laciniis rotundatis  
inferius reflexum ventriculatum

subintegerrimis

amendanium O. foliis sublanccolatis acuminatis pubescentibus, racemis verticibus, caule subher-  
baceo <sup>genuculis barbatis</sup> ~~lin. Mant. di. P. V. pag. 545. Jacq. bot. Vol. 3. Tab. 86. Am. aiad.~~  
4. pag. 276.

Habitat in Armenia O

Caulis inferne lignosus pallide albedo viscosus, frondibus inferne teretibus, scabris  
sculis, articulatus, superne latens oppositi canaliculatis. Rami  
structura caulis breviores, ~~folia~~ petiolata lanceo ovato lanceolata  
vel ovata, acuta, vix, utrinque punctata, punctis impressis, serrata, basi  
canaliculata. Petioli longitudine dimidi folii, pulis longis adpressis  
Racemi terminales solitarii; verticilli sex flori, remoti. Bractea lanceo-  
la patentissima, acuminata longitudine florum, pulis rari ciliatis  
Palyces ante flores centram reflexi, florentes patentissimi: labium superius  
subrotundum lineis tribus elevatis, basi gibbo lobata, pubescentem: inferius  
vellosum lineis 4 elevatis dentibus <sup>interioribus</sup> lateribus ovatis intermediis subulatis muc. Corolla  
alba calycis duplo major. Stamenum dentes pelopisefioli. Stylus inae-  
natus ~~in secundum specimen est loto an lino~~

Caulis erectus pedalis fructus teretibus scabris articu-  
lato lanceolatis

punctatum O. racemis simplicibus erectis, foliis ovatis subtus puncta-  
tis Thunb. fl. jap. p. 2494

Habitat in Japonia

Caulis erectus paniculatus, uti tota planta pilis scabridis  
pedalis et ultra. Folia oblonga acuta, serrata. Racemi  
terminales digitales, flores oppositi. Bractea setacea  
Thunb.

non vidi.

sanctum O. foliis oblongiusculis obtusis serratis undulatis, caule hirsuto, bracteis cordatis  
manb. 05. \* V. pag. 545

Habita in India O.

Caulis squarrosus, erectus, brachiatu. Verticillus utrinque subanaliculatus  
ab. squarrosus mucronatus tuberculis pilis albis. Folia ovata: oblon-  
guscula, serrata undata; margines utroque subtus pilosus,  
senis purpureis subtus, superiora obscuriora. Petioli hirsuti atropurpurei.  
Racemi terminales erecti solitarii atropurpurei. Bractea  
petiolata cordata concava reflexa decidua. Longitudine calycis  
Calycis firmi basi globosam hirsuti. Corolla purpurea odorata  
ullus

michi haec satis nota

~~Pteris~~ *O. foliis ovatis serratis biplobus; caule herbo*  
*gibbo*

Habitat.

Caulis herbaceus superne profertur luteus. Folia inferiora breviter  
petiolata, cordato-ovata, superiora magis oblonga omnium  
rugosa serrata villosa. Racemus terminalis e verticillis pappo  
sis. calycis laciniis superior laciniolata reliquis ceteris

sub nomine *G. gibbosa* missa ab Allisonio ~~et~~ Jacini  
ocymii generis potius videtur. flores non vidi.

filamentosum O foliis ovato-oblongis serratis, filamentis longissimis, calycibus  
bri canescentibus, caule fruticuloso.

Ocimum filamentosum: foliis ovato-oblongis, serratis, filamen-  
tis corolla duplo longioribus Forst. descr. p. 70 D. n. 31.

Habitat in montosis Arabiis

Rami obtusi & teragoni quadrifidii superne canescentes.  
Folia vix pollicaria obtusiuscula extropium leviter serrata  
glabra. Racemus terminalis verticillo sexflori bractea loco  
callo fusco subtus canis. Calycis villosi canis

Ocimum grandiflorum caule fruticuloso: foliis ovatis serratis: genita  
lebus longispermis L'Herit. Scop. nov. Tab. 43.

Differt parum a L'Herit. grandifl.

grand. florum. *Ocymum* caule fruticosa, foliis ovatis serratis, glandulatis  
bus longissimis L Her. p. n. fol. 4 pag. 89 tab 43.  
*Ocym. filam.* Corth. p. 108  
Habitat in abyssinia

~~*Sp. Pl. in herb. in herb. in herb.*~~

*Astragalus lagopodioides* frutescens, petiolis spiniscentibus, foliis apice  
spinosis.

*Astragalus lagopodioides* suffruticulis pubescens fructu pedunculato  
lagopodioides bracteis serotinis imbricatis, dentibus calycinis subpluribus  
in longitudine corollae Encyclop. nova no 66. varietas β.

*Sagacantha orientalis*, vesperana floribus purpureis in capitulum  
pedunculo donatum congestis Tournefort Corol. no 30.

Caulis fruticosus, ramosus vixtus spinis  
Folia 4; supra, oblonga pinnis terminatis

Petiolis spiniscentibus

Spicae pollicaris, pedunculis terminalibus est apice ramorum sesquipedali  
canis pilosis. Flores remoti infundi

Bractea lanceolata membranacea filicantes imbricata longitudine  
calycem eumque involventes, caducis.

Calyces pilosis pini

Significatur a reliquis costa foliorum in spinam excurrentem



13. 14. serpyllifolium Oryzum Oryzum genitalibus  
foliis linear lanceolatis integerrimis, filamentis corollae trip. longis

serpyllifolium foliis oblongo cuneatis, acutiusculis, complu-  
vatis, subtus scabris Coste. Depr. pag. 100.

Emtex ramulosissimus: Rami divaricati, villosi, cani

Folia linear lanceolata, ~~non petiolata~~, basi parum angustiora, vix petiolata,  
integerrima, <sup>tenuissime villosa,</sup> cana, parva, facie Thymi serpylli

rudimenta ramulorum foliosorum ea omnibus aet. hinc folia fasciculata  
apparent.

racemus terminalis, erectus, <sup>loqui</sup> capitellatus; verticillis sex floris. Pedicelli breves  
callo insidentes. bracteae minutae, ovatae acutae, deciduae. glorae reflexae

calyx corollae duplo brevior, tenuissime villosus: dentibus binis inferiori-  
bus setaceis, superioribus ovatis

filamenta basi villosa, corollae triplo longiora

( Diversa a filamentis )

Tubiflorum O. foliis ovatis serratis glabris, Corollis filiformibus tubo calycis  
triplo longiore.

Habitat in India orientali

geniculis

Caulis herbaceus (ut videtur) articulatus articulis paucis crassis  
foliis petiolata vix pollicaria nervosa venosa acuta. Racemus  
terminatus verticilli 6 flori. bractea ovata acuta ~~racemus~~ <sup>cellis</sup>  
mutis utraque sub singulis verticillis. Corolla tenuis tubo perone  
sepiam dilatato semunquiculano vel paucis ultra. Calyx ad partem  
obliqui infidus lacina superiori ovata acuta non incumbens inferis  
ribus flatibus

an Pleioanthus sed nectarium nullum

in herb. Vapdenatus

albidum O. foliis lanceolatis vix attenuatis

glabratum 0 foliis oblongis glabris crenatis, racemis filiformibus.

Habitat in arbra Tostk.

Herbaceus glaber caule quadrifido. Folia pollicina obtusa  
petiolus filiformis longitudine foliorum. Stipuli 6 flori  
flori parvi

*Perpyllifolia* Paul

*Lectum* O foliis oblongis serratis, caule fruticoso hirsuto, hirsuto

*Ocimum zeylanicum* inodorum annuum Murr. zeyl. p. 175. tab. 80 fig. 2

Habitat in India orientali

Fruticulus fruticosus ramifus ramis petiolisque valde hirsuti. Folia  
petiolata, pollicaria basi versus integerrima obtusa cum acumi-  
ne brevi utraque punctata margine et subtus in venis pilosa  
vesticilli sex flori raiemosi. Calyx O. basiliis basi hirsuti. bractea  
ovata acuminata

menthoides O. foliis linear-lanceolatis serratis Lin. Fl. Zeyl. 229. f. V. pag 546.

*Mentha zeylanica* angustifolium folio dentato Raj. suppl. 284

Habitat in Zeylona

Caulis pedalis erectus brachiatus tetragonus villosus. Folia caulina  
petiolata ramorum sessilia, unguiculata leviter villosa,  
acuta remote serrata. Pedunculi terminales longi. floes  
pedicellati conici parvi. bractea cordata reflexa  
acuta. calycis villosi lobes superior latiore acuto.

verticillis multifloris

Tenuiflorum O foliis ovato-oblongis serratis, bracteis cordatis reflexis concavis pinnis folii  
Linn. spec. pl. naz. 833x f. v. pag. 545  
Ocimum maderense prostratum frutescens, gratissimi odoris, flore parvo, cau-  
libus villosis Pluk. alm. 260. t. 200. fig. 4.

Basilicum agreste Rumph. Amb. 5. t. 92. fig. 2.

Mentha Seylarica pinnata pupilla, angustissimo folio dentato Burm  
Zeyl. 150. t. 70. fig. 2.

Habitat in Malabaribus O t <sup>teretibus</sup>  
Caulis pedalis s: bipedalis, ~~obtusis tetragonis~~ <sup>teretibus</sup> purpurascens, bractea  
ter, pili parvis adpressis. Rami breviori. Folii <sup>conca-</sup> ~~caulona~~  
retolata ramorum <sup>vel</sup> ~~sepius~~ <sup>teretibus</sup> serrata, pilosissima uaguicula  
na. Spica ex apice ramorum et caulis interdum terne  
bractea cordata glabra concava ante. verticilli ~~est~~ <sup>est</sup> flori  
Calycis glabri. Corolla parva purpurascens

verticilli ~~est~~ <sup>est</sup> flori



Vaale O. calycibus pilosis caule bracteato *Loftm. pag 111*

*michi ignotum*

prostratum O caulebus prostratis, foliis ellipticis lineatis ~~lin.~~ Mart. / 566 + S. V.  
pag. 546

Habitat in India orientali ☉

Caulis perithamosus, erectus octofoliatu; pelis patentibus. Rami  
divaricati sumi ad radicem longiore prostrati. Folia petiolo  
sa subpilosa acute serrata, pollicaria fructu terminales  
solitariae et vix illis oblonga. Corolla minima conulescens  
lin.

non ved.

*Lolopanicum* O. folio ovato acuminatis ~~to~~ <sup>mentis</sup> ~~si~~ <sup>indulato</sup> ~~molli~~  
bus calycis lobis inferioribus quinque ~~dentibus~~ <sup>bracteis persis</sup>  
Medicus vet. soc: *prolat phys. 4. p. 194. 7.*

non vid.

Zeylanicum O. foliis ellipticis planis nervis reticulatis  
calycis lobis inferioribus 5 dentatis, bracteis deciduis nervis in  
act. polat. 4. phys. p. 197. 4. 6

mili ignotus

Petaeco Anis ~~culms erecto~~, anisus scabripetalis Retz. obs. 4. p. 22.

Habitat in sentibus Indio orientalis

capitellatum O foliis ovatis, floribus aggregatis, petiolis lateralibus Ken. Suppl. 276

Prosp. Tosa. amb. 164. n. 34. t. 20 sed flores minoris

Habitata China.

Caulis oleraceus, obtuse tetragonus, bisulcatus, parva ramis; pedalis.  
Folia petiolata, obtuse serrata, costata, rugosa, lamina, coriacea,  
non nitida. Petiolis saepe desinens in folium. Pedunculi axillares  
solitarii, capitula floribus aggregatis magnitudine nuclei Conyli  
Calyx communis pentaphyllus <sup>vel</sup> longitudine floris. Perianthia  
propria tubulosa sive sifida aequalia Corolla albo oculo nuda  
sive d. s. ex nudo. Tubus tenuis longitudine calycis. Limbus quadri-  
fidus: lacinia superior ut convexa, bifida; caeterae totae sifidae reflectus  
lin