

# Oenanthe

1. crocata O. foliis <sup>levis</sup> omnibus obovatis obtusis subaequalibus
2. festulosa O. stolonifera, foliis omnibus pinnatis filiformibus festulosis
3. pimpinelloides O. foliolis radiatis cuneatis fessis; caulibus integris lineari-  
ribus longissimis simplicibus
4. prolifera O. umbellarem pedunculis marginalibus longioribus ramosis ma-  
gulis
5. globulosa O. fructibus globosis
6. humilis O. foliis pinnatis alternatisque obovatis integris trifidis usque  
bubiferis

opii folia Oenanthe.

Oenanthe lusitana, opii folio et odore Tournef. inst. v. herb. 313

Habitat in Lusitania Brotov.

Caulis bi-<sup>subramosus, striatus</sup>tripedalis, erectus, <sup>simplex,</sup> inferne teres, purpureo cincto, superne  
# glaber, uti dulciter-angulatus. Folia <sup>in</sup> inferiora bipinnata, quinquejuga, partialia  
tota planta trinjuga, superiora subbipinnata, suprema et ramorum pennata: foliola  
opposita, unguiculata, <sup>ovoidia,</sup> sublineata, tri vel quatuor in nervis laevibus  
obtusis apice purpureis, <sup>reticulata</sup> internodiis interdum bifida, terminale tripartitum  
sublineata. Involucrum nullum; partialia naxophyllum brevissimum: folio  
lis subulatis. Umbellae radii novem, castigati partiali plurimi. Petala  
obovata, latenter de flexis, <sup>externis</sup> marginale quintum radiorum exteriorum reli  
quis parum magis

Salvia affinis evocata et quomodo diversa

capillans Ixia foliis linearibus, scapo polytachyo, spathis sic anops Thurb. Disj. p. 12 \*

L. V. pag. 84

~~Ixia capillans, caule multifloro, floribus pedunculatis erectis, foliis linearibus erectis Lx. Suppl. pag. 92.~~

~~Habitat in C. bono spec. in arenosis humidis u~~

~~Bubbus reticulatus, fibrosis magnitudine avellanae. Folia nervosa, glabra, scapo dimidio breviora. <sup>anopsis</sup> Capus <sup>pedalis</sup> venis apice diffusus, capillans erectus, bipedatis ramis pedicelli formibus unifloris. Flores in ramis terminales, vel in apice scapi alterni, sespiles, erecti, albi, venoso-reticulati. Spatha dextate venis fusca. Flores in hac specie videntur pedunculati, sed rami uniflori Thurb. l. c.~~

~~non differt scapulis tenetis insipite filii quospiam ramis capillanibus bi-  
s. triflori & 2 infiores sespiles nulli praesens in apice ramis spatha orate  
Lax. tubo breviores apice dextate laciniis lembi oblonga obtusa~~

nodiflora Ceanothe

Habitat in India orientali? Herb. Mus.

Caulis dichotomi, striati, glabri, uti tota planta. Folia trijunctata: pin-  
na oblonga, acuta, parva, impari. Pedunculi oppositi foliis. Umbella  
gradata. Involucrum foliolis 3. brevibus. Umbellulae <sup>in</sup> abortientes  
fructu cellis setaceis.

femulae ca. O. foliis supra et oppositis pinnulis subulatis sulcatis  
Thunb. prod. r. fl. cap. pag. 50  
Habitat in C. p. p. r.

penicidariifolia O. foliis omnibus lineamentis radicalibus bipinnatis  
caulinis pinnatis, involucrio univesali nullo, radicium populis  
vatis seplibus Poll. fl. Palat. 1. 22 292. Tab 3  
Habitat in germania

non vidi

filiiformis O. Solus omnibus simplicibus filiiformibus festulopi Walt  
fl. carol. pag. 113.  
Habitat in Carolina

non vidi

interrupta O. folio interrupta bipennati: laciniis incis-jerratis Thunb  
prodr. fl. cap. pag 50.  
Habitat in Cap-b-pne:

~~foliis non vid.~~



*tenuifolia* Can. foliis bipennatis: pennis linearibus, summis indivis  
Thunb. prodr. pag. 49.  
Habitat in Cap. b. p. p. i.

non dicitur

inebrani: *Oenanthe foliorum inferiorum pinnis ovatis, superiorum line  
aribus, petiolis angulatis* Thurb prodr pag 49  
Habitat in C. b. spai

2

non vidi

*Senecio* *O. foliosus* *decempositi* : *pinnulis* *subulatis* *pelocatis*

Theob. prod. pag 50

Habitat in C. b. p. i.

non vidi

exaltata *Ceanothus* caule striato, seminebus varbinatis striatis Thunb. prodr  
fl. cap. pag 50  
Habitat in C. b. p. ei

na. d.

glo  
Labulosa O. fruct. bus globosi Lin. l. v

Oenanthe lusitania, semine crassiore globoso Tournef. F.R. 4. 313.

Habitat in Lusitania, Barbana

Radix tuberosa pendula. Cauli pedalis et ultra sulcatus glaber  
Folii radicalis pinnata, ternato-quinata alia foliola lanceola  
sa alia unciniforma integra 2-3loba, glabra saepe pinnata bipin-  
nata foliola opposita pinnis linearis lanceolata bif.  
trifida summa pennata folioli angustioribus  
Umbella 4-6 radiata. fructus sessile in capitulo magnitudi-  
dine Cerasti fructi

Folii bipinnati foliis linearis lanceolatis

<sup>fig</sup>  
Fulosa O folonifera, foliis caulinis pennatis filiformibus fistulosis Lin. l. v.

8l. Dan. tab. 246

2 *Oenanthe aquatica* Triflora Monf. hist. 3. p. 269. f. 9. t. 7. fig. 8.

1 *Oenanthe aquatica* Bauh. pin. 162.

Habitat in Europa fœcis, paludibus &  
Caulis pedalis debilis fistulosus ramosus. Folia glauca inferiora  
bipinnata superiora pennata, pinnis lineari-bus in supremis  
brevibus oppositis ut petioli fistulosi. 4 involucrum 1 phyllum  
vel nullum. umbella radii 3-4

*Samela* C. foliis pennatis ternatisque obovatis integris trifidisque  
Habitat in Anfula Gare Thoria

Planta digitalis. Folia radicalia pennata 2 juga folioli tri-  
fidis. <sup>foliola</sup> infrequentia caulis integra parva vix femiunguiculata  
reliqua ternata longiora ternata unguiculata. umbella  
5 radiata involucrem monophyllum.

~~pinelloides~~ <sup>pum</sup> pinelloides O foliolis radicalibus cuneatis fessis; caulinis integris linearibus  
longissimis simplicibus Len. Spec. pl. p. 366 & Gaigu. fl. austr. 4. t. 395

Oenanthe apicifolia Bauh. pin. 162.

Oenanthe pappinacea sylvestris folio, semine dupliis Bauh. pin. 162.

Habitat in Europa australi

Radix <sup>caulis</sup> apice tuberculis magnitudine pipi versus apicem  
<sup>mentulæ</sup> Caulis pedalis erectus glaberrimus angulatus. Folia radica  
lia petroselinii sed crassiora bipennata. foliola unci for  
ma unci. caulina minus composita vix bipennata, penna  
ta pennis linearibus longis supremas sub ramis simplicia um  
bella inaequalis. Involucrum universale parvialeaque  
tubulato-setacea. Corolla parva radiata Len.

radicalibus superius compositis cuneatis fessis caulinis pennatis  
superius simplicibus

Plukenet. fig. mala



<sup>pro</sup>  
~~le~~fera O umbellarum pedunculis marginalibus Congonibus ramosis masculis  
Linn. Spec. pl. p. 365 + Jacq. fl. austr. 3. p. 62.

*Cenante proli fera* apula Bauh. pin. 163. Monf. hist. 3. p. 209. f. g. v. 7. fig. 5.

Habitat in Sicilia, Apulia &

Radix tuberosa plumbis. Caulis erectus sesquipedalis, foliis  
tus angulatis. Folio caulina bipinnata pinnis oblongis  
pinnatis inaequalibus glabris petioli vaginantes. Umbella  
universalis radii laterales 3. f. 4. Divisati horizontales  
flosculis masculis. D. f. flosculi subsessile, conferti in hemi-  
~~phaer~~ sphaerum, hermaphroditi

— Caulis subternatis foliis cuneatis fere

<sup>100</sup>  
scata O foliis omnibus multifidis obtusi subequalibus L.V. p. 2064 Jacq. hort. 3.  
Tab. 62

*Cenanthe cicutifolia* foliis facie, sulco vix conspiciente Lob. ad 1326. Act. ~~1747~~  
1747. n. 400. p. 235. t. 3.

*Cenanthe chorophylli* foliis Baub. pin. 162.

Habitat in Europa paludibus &  
Caulis bipedalis ramosissimus striatus, rufus. Folia pallide  
viridibus sulco flavo scabentibus radicalia tripinnata  
caulicaria bipinnata. foliola <sup>opposita</sup> <sup>reticulata</sup> obovata glabra obtuse  
serrato-incisa. Umbellae radii uniter septem involucri non  
nullum vel diphyllum.

obovatis

~~Dauc. creticus~~ Mull

Oenanthe peucedanifolia Pollett