

Ogihensia

Chigginsia

Ochtheocoma verticillata: foliis ternis lanceolatis pedunculis solitariis dependen-
tibus subquadrisfloris flor. Peruv. t. pag. 59 Tab. 89. fig. a.

Habitat in Peruvia nemoribus peruncationibus.

Caules fruticosi, tripedales, erecti, pauci ramosi, obtuse tetragonis. Ramifica-
tioni, superne tomentosi. Folia verticillata ternis, petiolato, integerrima, supra
siccata, subtus leniter pubescentia, venosissima, reflexa. Petioli et costa
subtus utraque sulco. Stipulae 3. interfoliaceae, minimae denticuli formae
supra sulcatae, deciduae. Pedunculi axillares, filiformes, folio dimidio
breves, 3-5 flori, rarius septemflori, purpurei, de basi foliosi. Corolla pe-
nicillata. Tubus tetragonis. Bacca albo purpurascens, oblonga, tetragona
triloculari. D. Peruv.

Chygnesia Flor. Peruv. l. pag. 55

Character essentialis

Cor infundibuliformis: limbo 4. partito Cal. 4. dentatus superius. Bacca bicuculari, bisulca, umbilicata, polyperma

aggregata 0

Chygnesia aggregata foliis oppositis lanceolatis, pedunculis aggregatis verticillatis fl. Peruv. l. pag. 55 tab. 83. fig. b.

Habitat in nemoribus Peruvia 5

Caulis fruticosus, ter pedalis, glaber, erectus, paucis ramosus, obtuse tetragonus. ^{dentico lanceolato attenuato}

Folia patentia, petiolata, integer rima venosa, glabra. Petiolus et costa sub 4. utrinque sulcati. Squala interfoliacea, parva, ovata, acuta, caduca. Pedunculi axillares plures verticillati, inaequales uniflori, breves

14 ex singula axilla fer. Corolla purpureo lutescens. Stigmata 4. acuta Bacca ovalis subrotundaque obsolete tetragona, 4. cuculari. Semina numero 4. a. Receptacula 4. dissepimento adnata fl. Peruv.

Ohigginsia obovata foliis oppositis obovatis acuminatis, pedunculis aggregatis
multifloris inaequalibus fl. Penn. 1. pag. 56. Tab. 85. fig. 6.

Habitat in umbrosis. Penn. 5

Caulis fruticosus quadripedalis, erectus, obtuse tetragonus, parum ramosus.
Folia opposita, petiolata, patenter obovata, acuminata, integerrima, utrinque
glabra, nervella oblonga. Petioli et costa subtus sulcati. Stipulae
inter folia, minima, ovata, caduca. Pedunculi axillares, 4. 7.
Inaequales, patentes, longitudine fere petiolonem, multiflori, per nervi
Flores breviter pedicellati, secundi. Calyx minimus, quadridentatus.
Corolla incarnata, tubus brevis, limbus patens. Bacca oblonga per
pures

videtur esse species Guettardae