

Olandia

virgata Oldenlandia

Oldenlandia virgata

Habitat in Guinea Auct

Caulis pedalis, erectus, paniculatus: rami oppositi; Vereteo, dichotomi. Sola
pollicaria, cunearia, internodis breviora, glabra. Pedunculi superne, latera
les et terminales, sope verni, intermedie brevior, biflori; laterales triplo
i, interdum versus medium pedicelli duo, uniflori, brevissimi

Wiedenow

corymbosa Oldenlandia

von Rohr

caule glabro

secondum herb-hin Old umbellata gaudet caule glabro

linean folio Odeolandia pedunculus bifloris foliis lineari bus possibilis brevibus
persili bus.

Habitat in India Orientali Ritter

Caules tetragonis, longi, base repente, glabri. folia angusta, semi-pelti-
caria, glabra. Pedunculi capillares. Capsule parva
Agenis Odeon biflora

capitata Odenlandia capitulis Vermiformibus, astillansque, foliis
oralibus, caule repente.

Habitat in India Orientali

Rami erecti, simplices, palmatos vel ultra, Vetragoni, glabri. Dolae
breviter petiolata, opposita, pollicaria, acuminae brevissimae ^{vel ultra} terminalata,
vix nervosa, avenia, utique glabra, integriformis. Stipulae beta
acuminatae. Pedunculi longitudine foliorum, terminalis super gemi
ni. Flores 6-7, sessiles in apice pedunculi, raro capitula duo in
pedunculo communi. Bractea subulata, ut laevis calyx. Heme
na longitudine corolla.

affinis paniculata

alata. Ol. pedunculis axillaris ^{sub}biflori cappulis alatis, foliis lanceolatis
Habitat in India orientali ^{tota} glabra
affinis paniculata. Pauli dichotomae. folia pollicaria basi
en petiolum attenuata. ^{aveneria} Pedunculi ex dichotoma et apice
ramonim. Toleola duo sub pedicelli. Pedunculi folio brevo
ret, pedicelli brevo. Cappula subtubinata ali quatuor
membranaceis angulatus duplo major quam in velenis
speciebus.

paniculata Oldenlandia paniculata at illaribus Verminalebusque, foliis ovali
lanceolatis, paule dichotomo
Oldenlandia paniculata: pedunculis paniculatis Verminalebus, foliis
ovali lanceolatis Lin-pphei: plant. p. 1667. & P. V. pag. 162. Barn. T. 15 f. 1.
Habited in India Orientali

Paulis eretus Vetragonus, folia gra si, glabrescunt. Tota planta. Dolci
petiolata, opposta, cerasa, avena, pollucaria. Pedunculi astillares
sepe gemini, bis trifidi, pedicellis bis; trifloris. folia florata inferiora
can coleata superiora subulata. foliis oppositis erectis angustioribus acuteis. foliis bar-
maria habet folia angusta undulata an gustis ad speciem dico-
sam pedicellis utrinque membranaceis folia connectentur.
Sipula infundibuliformis tripartita; laciniis subulatis. Pedunculi
astillares tandem rami evadunt.
Tenui-foliae - Dama Reed. 10. p. 49. Tab. 25. - Ptern - Tonga
non pulchra ib. p. 51. Tab. 26 videtur diversa cum folia tenui canula
et acuta.

confulatus aduncus spec. Schurm.

Simp. ex Oldenlandia

Habitat ad Serram Leonam herb. Gus.

Pedunculus erectus; semi-pubescent, glaberrimus; Tetragonicus. Dolia semipollucaria, linearia angustissima, inferiora longitudo internodorum, superiora breviora, levia. Flores in ramulis superne; pedunculi oppositi, capillares, uniflori; distantes; angustiulares; plenumque sene in fructu ramulo.

Oldenlandia

Habita en Puerto Rico.
Caules copiosos; duros; semipedales.

Arbolito

glomerata Oldenlandia

Habitat in Carolina Herb. Rukh.

Pauci proterumbentes, palmares; pilosi, subramosic. Solia breviter petiolata, an
guicularia, oblonga, ope levato supra raro pilosa, subtus glabra; arvensis, exornata
Pedunculi attillares, sessili, brevissimi, uniflori, utriusque tres. Capsula
lata

Cypet alordea Oldenlandia

Habitat in Parvula Mictlant herbfus.

Pauci decumbentes, palmates; simplices, pedicellarii. Sola pedicellata, unguiculata
vel parum longiora, oblonga, acuta, subarvensis, glabra, marginè s'abriuscula. Flores
axillares, solitarii vel gemini. Calyx herfuti. Corolla crassa. Capsula coriacea
dico minorei.

Depressa O Oenlandia foliis ellipticis petiolatis glabris, pedunculis
geminatis astillibus, caule diffuso Wild. spec. pl.
nay 675.

Nelat. p. 68. t. 31.

Habitat in India Orientali

non vidi

Dicotoma Olden foliis lanceatis pedunculis axillaris ter
minatisque corymbibus bifloris caule Dicotoma Rose
Habitat in India orientali Rottler adi. Tota plant
caulis herbaceus filiformis glaber lat. rugosus angulis fibris
tenuis folia superflua opposita lanceata glabra margine
fimbriata. polliciana revoluta. Pedunculi axillares
biflori foliis longiori terminalis interdum subracemos
floribus 40.

dichotoma ^{*Hecchier*}
caule ramoso pedunculis bifloris astillans foliis linearis canicola
et oppositis integrifoliae Thunr. in Com. 90th 1772. p 64. t. 1.

Habitat.

Olenandra

umbellata O. umbellis nudis lateralebus alternis, foliis linearibus Lin. 8c.

Teyl. 68. t. S. V. pag. 162.

Lysimachia adspicua, sat reja folio, maderapratensis, capitulo in summi
fote fere umbellatis Pluth. alm. 236 t. 119. fig. 4.

Habitat in India

rami inferiores oppositi

Ramuli diffusii, procumbentes, dichotomi; glabri uti tota planta.

Tobia Cnean lanceolata atroque attenuata vix unguiculata. Peduncula
umbella exstallans; pedunculate, 4-6 flora folio longiori. Rami pulvi
membranaceo cum foliis connate Petiolaris dentata propter umbellu
m specimenibus cultis vidi pedunculis unifloris cum ^{est} in eadam et illa
in que spontaneis pedunculis ramosis fastigiatu

Zanguebana Old. foliis linearibus, pedunculis paucifloris, corollis hypocrateriformi
brachior. fl. Cork. peg 70.

Habitat in Ora Zanguebana Africae orientali

Caules herbacei 3 pollicans, multiplex. Folia integerrima glabra,
fuscula, oppposita. Flores purpurei. Pedunculi terminalis. - Hygma lanosa
tutum.

non vidi

coimbo, 2 O pedunculis mult-floris, foliis linearis - lanae colata Lin. Spec. 16894

S. V. fez. 162

Habitat
oldenlandia humilis hysopifolia Plum. gen. 42. Sc. 212. fez. 1. Chedw.

42. fez. 1.

oldenlandia caule venenoso, foliis linearibus oppositis, ramulis minimis
floriferis, pedunculis ramosis et simplicibus Brown. Jam. 146.

Habitat in America meridionali.

O. pedunculis subprostatis, adscendentis, Vetragni lanae ¹⁸ amplexu oppositis. Sola
caules subprostati, adscendentis, lanae longitudinali exanata, longitudi-
nigro lanae colata, loria, linea longitudinali exanata, longitudo
internodorum. Stipulae opposita, obtusiflida, adnata apice aristis tubis
pedunculi alterni, solitaria, foliformes; intra singulari stipularum
terram spectante in singuli, longitudine folii, terminata umbel-
lula subquadrigona absque involucro. Flores albi Lin

non ord.

coenilia

fructuosa O. capsularis ~~pedunculata~~ foliaria foliis subulatis cauleisque scabris

stipulis fitigenis

Habitat in India orientali

fructuosa

Planta ^{rigida} ~~longitudinalis~~ vix ~~Digitalis~~ cærule foliisque folia subulata et
voluta. ~~Signa~~ rotulae ^{conica} inter nodus panum brevioribus. Stipula rotula
dato membranacea setis longis plenis misceatur. Capsula globosa
pulpa vix pilosissima ^{magis rugosa} ^{frans nigra rufa} ^{major} calyx cana rotata exserta

fructuosa in herbario

Coprinus capensis pedunculatus foliis pubulatis caule fructuoso.

Habitat in ~~Fusca orientali~~ C. o-fri

Planta parva ~~caerulea~~ varietas precedenti differt ~~in foliis~~ ^{notturibus} caule in ferne vni hotomo
folii inter nodis longioribus, incurvatis, capulis pedunculatis
oblongis ^{angulatis} laevis calycinis pubulatis stipula brevi membranaceo setigera
oldendando capensis pedunculis axillaribus unifloris, foliis lancearibus acutis.

pubescens vifida
vifida O. capitulo fefilibus subfoliatis, foliis lineariis caule pubescens
vifida.

Habitat in India orientali.

Planta nova procumbens tota pubescens vifida. Folia linearia
obtusifolia glabra & longiora foliis foliari interdum gemini. Tuber
globosum. Calyx calycis longitudo capitulo, ovata latior quam in
congeneribus

uniiflora Oldenlandia pedunculis simplicissimis lateralibus; fructibus hirsutis, foliis puberula
Is aucti sive I. V. p. 161.

Alpine aquatica major repens, foliis acuminateis, virginiana Plut. aln. 20. t. 74
fig. 5. mala

Oldenlandia calycibus fructuum maximis coloratis Gron: Virg 130.

Oldenlandia aquatica, foliis obovatis oppositis, floribus singularibus ad alas Brown
Junc. 146.

Oldenlandia *uniiflora* pedunculis simplicissimis, fructibus hispidis Lin. Spec. pl.
p. 174*

Habitat in Virginia, jamaicae & aquatica

Caules ramos - subdivisi repentes. Folia opposita, lanceolato-ovata, subpetiolata
indegree. Flores astillacei pauci; pedunculis propriis. Germina hispida
Lin. Spec. l.c.

non vidi

Dizyna Old. floribus pentandris degynis pedalebus; foliis lanceolatis

Reed: obs. 4. p. 23.

Habitat in India

quid? on hys genos?

non vidi

~~pubescenti foliis pedunculis at illaribus bi floris, caule erecto pubescente
foliis epineurosum.
Habitat in India Orientali~~

Caule palmari vel spinosum, pubescens uti tota planta. Sola
angusta lanceana folia super se qui polliciana. Rupile ~~ut~~ membrana
trevissima integra, inferne nulla. Pedunculi at illares alterni folio
breiores, capillares

Poly+ quinque partitus an Mollego vel Pharnaceum.

pentandra pubescens
Lemnophila old. foliis linearis lanceolatis, pedunculis axillaribus bifloris
Habitat in India orientali ad marginem agrorum
Paulus herbaceus erectus dichotome ramosus fructuosa pubescens
uti & tota planta. folia sspila linearis-lanceolata integerrima
pedunculi capillari eret. folio breviro. pedicelli brevissimi
Cappula globosa magnitudine fermeo Conandri calyx latius
sque lanceolatis aucti coronata. Stipula membranacea evanescens
Oldenlandia pentandra. floribus pentandri monogyros, foliis
linearibus, pedunculis bifloris Ratz. obs. 4. pag. 22.
~~Antorhinum humile angustifolium~~ floribus gemello, ex aliis
foliis producto Burm. thes. pag. 22 tab. II.

Cynlla indica Honigii

~~Antorhinum~~ flore lateo Burm. haec forte pertinet

guttata D. panicula terminali Vr. chotoma, foliis caule fructuoso foliis lanceo
latis ellipticis

Odenlandia *guttata* umbella terminali Vr. chotoma, foliis spathulatis
latis Forst. ^{Prod.} ~~Zapf.~~ pug. n. 55.

Habitat in Tongatabua cortex purpurea sciente

Rami glabri uti tota planta articulati: articulis unguicularibus
e lineis de currentibus ~~festangatis~~ ^{te trivione} apice annulo albedo et bali
hi pula persistente cincti. Colia breviter petiolata, seque pollicis
na, avenia, approximata ad apicem ramorum. Hipula utriusque
a petolo distincta connata, mucronata. Pedunculi angu-
catis palmari, vestrifidi.

an Hedyotis

replodes
Vinervia Old. foliis ovatis petiolatis, pedunculis ^{subverticillatis} pedunculatis axillanibus hispidis
& rineraria caule repente

Neladjsjia Rheed. Malab. 16. p. 61. Tab. 31.

Oldendandia repens: Caule repente, foliis obovatis petiolatis, axil
caribis florulis Burm. ind. pag. Tab. 31. f. 3.
Habitat in umbrosis declivibus solo arenoso humidi a fine Kong
Planta facie Replidis Caule diffusus repens dicto tonus Caule tetra
goni paleo exantus superne interdum pilis vix manifestis paucis
ad persis. Sola ^{vix} ^{trigyna} seminunciculana glabra, offr. ovato-subrotunda
petiolis brevibus
pedunculi axilla. Stipula membranacea ciliata. Pedunculi con
gitidine petiolis, uniflori. Capsula globosa grossa, pilis albidis hispida
non squamis membranaceis ut in repente Lin.
varia p. floribus folianis et verticillatis, caule parum velopore vel
glabrore

Oldendandia Vinervia caule decumbente, foliis ovatis rinerario
floribus verticillatis axillanibus capsule hispida Lin. Rete off
fici: 4. pag. 23

confundatur Ensta olla Rumph. Kongio eadem et Cratoxylon amb. Ruayl.

repens O. capsulae subsp. hispidae hispidae, foliis oblongis, Caulis repente dichotomo

Nutk. phys. Sub. 356. fig. 5.

Oldenlandia repens: capsulae subsp. hispidae hispidae, foliis lanceolatis her. Max.
404 L. V. pug. 161.

Habitat in India

Caulis glabrescens tetragonum glabri. Tolda Thymi ferruginei in petiolum levem attenuata
glabra, crassifolia. Capsulae hispidae in dichotomia vel at. illis alternis, vel
squamis minutis lanceolatis pellucidis. Calyx laevis glabra.

Angora

herbata Umbellata illanbus, caule calycibusque hispidis, foliis ovatis acutis
Lin Suppl. 1274 s. v. p. 162.

Habitat in Java

Planta diffusa. folia opposita, petiolata, exaequo ovata, integerrima
acuta venosa, nervosa. umbello articulata, pauciflora, pedunculata
Calyces campanulati hispidae Lin.

non vidi

verticillata floribus verticillatis sessilibus, foliis lanceolatis max. 40. * S.V.p. 161.
Nipulus fetigerus

Cratoegonium amboinicum Rumph. Amb. 6. p. 25. t. 10.

Habita in Amboina, Java, Colubus apodus, geniculus vellopis

Caules subpedales, simplices, articulati; Lorae, Teretes; ut ringue lele o estarati.

subtilis pallidior *flabellifolia* *scutellis Flores congesti.* Hypula membranacea in setas viridis, more
granae ooces; queanum non nullo fte. capillares, floribus longiores. Cap.
fusa tuberculata, veliculans, polysperma, connata calycis foliolis 4 or acuminata
~~in~~ *in* *in* *ope* *centis* *substrigosa*

Febbris febris