

23

22 *Olea*. Pal. 4-dentatus. Por. 4-fida: lacinia subovata. Drupe
putamine osseos, 1-2. loculare, 1-2-pertos.

Olea

Gentiliani no 25. Gostner de spet pag 75
Cat. 4 dentatus. Cor. 4 fida: Lacinia subovata. Drupe nucleo dispermo
ma

Olea Cat. 4 fida.

Olea Cat. 4 dentatus. Cor. 4 fida: Lacinia ovata. Drupe subtilis,
sub 2 spuma.

Olea . Cat. 4 dentatus . Cor. 4 fida: Lacinia subovata. Drupe per
tamine osse, 1-2 ocularis, 1-2 dispermo.

Olea

Calyx puberulus margo quadridentatus dentibus obtusis
Petolla, petala campanulata quadrifida laevioris oblongo
acute

filamenta nulla antero bene inter laciniias
germen hemisphaericum stylus longitudine tubi magna
oblongum acutum coagulum cornuum

europaea 1. Olea foliis lanceolatis integerrimis, rameis ^{argenteis} discoloribus, axillaris terminalibus paniculatis; foliis subtus discoloribus.

~~communis~~ Olea Brunsf. 3. p. 227

Olea & Aliva. Baeh. pin. 472. Blakh. herb. t. 199.

Olea europaea; foliis lanceolatis Lin. Syst. Veg. 57.

communis a Olea foliis lanceolatis planis subtus in canis. Hort. Kew. I. p. 13.

Olea sylvestris Matth. 200

Olea sylvestris foliis duro, subtus in cano. Baeh. pin. 472. Blakh. herb. t. 213.

Olea foliis lanceolatis, ramis tenuioribus Lin. Hort. Cliff. 4.

Serruosa Olea foliis lanceolatis planis subtus albidis, ramis vernicosis. Wied. Spec. pl. I. p. 44.

Olea europaea; foliis lanceolatis, panicula trichotoma Thunb. Prod. fl. cap. 2.

Congifolia V. Olea foliis lineari-lanceolatis utriusque aculeis planis subtus argenteis Hort. Kew. I. p. 13.

Lancea Olea foliis lineari-lanceolatis

Fernyinae ~~Olea~~ ^{8.} Olea foliis lanceolatis subtilis ferruginea: Hort. Kew. 1. p. 13.
Olea chrysophylla; foliis angustis lanceolatis utrinque acutis subtilis ac
res nitidis, paniculis lateraliibus. ^{Lamont.} La March illustr. 1. p. 29.

Catifolia ~~E.~~ Olea foliis oblongis planis subtilis inéanis. Hort. Kew. 1. p. 13.
obliqua ~~E.~~ ^{23.} Olea foliis oblongis oblique fletis subtilis pallidiss. Hort. Kew. 1. p. 13.

buxifolia ~~E.~~ Olea foliis oblongo-ovatis ramis patentibus divaricatis
Cayetana ~~E.~~ Olea foliis ovato-lanceolatis, floribus racemosis. Patagonia. inst. 2.

Habitat in Europa australi et Africa boreali, ^{p. 19.} in Cap. b. Spec., in insula
Francie, E. in Cap. b. Spec. in insula Mauritiana ⁵
foliis integerrima bipinnata, interdum longiora, interdum parum
breviora, basi acuta, avenia. Racemus foliis breviores, corymbis ⁵
E. foliis subaequaliter, magis compositi, ramis patentibus. Flores in pedi-
stadii in latif. ⁵ cellis ultimi plenumque verni, sessiles. Bractea deliciosa. ⁵ Dupa ex
Grecia in Campania et Calyp plenumque quod dicitur.

2

lancea. 2. Olea foliis lanceolatis integerrimis ^{paginae} utrinque concoloribus, racemis paniculatis

Olea lancea; foliis linear - lanceolatis, utrinque acuta, panicula terminalis, Drupis oblongis aliutis. ^{Lamanch} La March illustr. 1. p. 29.

Habitat in insula Francia. Commerson, Thonin 5

Rami punctis elevatis adspersi. Solia bispollicaria, plana, minime pubescentia argentea vel albida, sed utrinque opaca, avenia, cinnavia, consigillata. Panicula major patens, quam in Europa.

Drupa expedita Commerson.

3

Americana ³ Olea foliis lanceolato-ellipticis, racemis ^{pub} composite angustatis, bracteis
ornatis persistentibus connatis ovatis.

Ligustrum laurifolium ^{um}, fructu violaceo balteo purpureo Catesb. t. 61.
t. 61.

Olea americana; foliis lanceolato-ellipticis Lin manu 24.

Habitat in Carolina Boreali 3

Rami ~~in fine~~ ~~latis~~, superne alternati compreso-subtigrayoni. Solia
petiolata, integriformis, subter avenia subconica, subter avenia,
supra sex venosa nitida, utrinque acutiuscula. Racemi axillares
et terminales, pollicares vel paucim cunctis: pedicelli oppositi; uti
pedunculi Vitragoni. Bracteas minutis. Flores terminales, terni, subtri-
lei, mucronati et foeminei in eadem planta cum hermaphroditi Lin. Dots
per globosa, longa, speciosa. Flores Nues.

Floris hermaphroditi masculi et foeminei in eadem planta cum herma-
phroditi. Bractea globosa, longa, speciosa. Nut obovata, subtriangulata, basi
perforata Lin.

~~Canoea Olea foliis lanceolatis utrinque glabri, panicula terminali, Drupis oblongis
acutis exsertis. La Merkt. Illust. pag 29.~~

Habitat in insula Borbone. Commegon herb. f. 5

Rami Teretis, glabri, punctati, superne compresi. Solea petiolata 4-5 polliciana,
utrinque attenuata, glabra supra et infra, avena, nervosa; acuta. Pedunculi
ex astillis super non tristis specie sive: partiales oppediti. Drupo exserta.

Olea foliis oblongis, floribus racemoso-paniculatis ^{terminalibus}
Olea capensis; foliis ovato-^{oblongo} rotundatis ^{terminalibus}
Olea capensis; foliis ovato. Lin. Syst. V. p. 57. Berg. fl. Cap. 1.

Cariaceo a foliis ovato-oblongo rotundatis planis petiolatis subris. Hort. Kew. 1. p. 13.
Ligustrum ^{Sp. Schr. sup. foliis integris l. 13. ab apic. 234. t. 107. f. 1.} capense perennans, folio cordato puberulo. Dill. Eth.

193. t. 160 f. 194.

unifoliatum foliis ellipticis uncali, petiolis virgatis Hort. Kew. 1. p. 13. Gaugu-

^{hort. Schöntz. 1. p. 1.} hort. denotatum foliis oblongis integris Burm. afr. 233. t. 81. f. 1.

Olea laurifolia; foliis ovato-oblongis subacutis, panicula terminali ^{Lamont.} ^{1. p. 29} Teraricata La Mart illus. 29 ~~recte~~

Habitat ad Cap. b. Spec.

Ramij ^{est:} pedunculis lineis decurrentibus superne retinaculi. Folia
petiolatis integrae Cariacea, ariens, et sicc venosa, integriformis, interdum
intervallis ^{interiori} emarginata, et superiora mucrone brevi terminate ~~flavum~~
~~et~~ ~~lutea~~. Racemi terminali ramorum, decompositi, brachiati,
pedunculis pedicellisque patentissimis. Flores pedicellatis. Bracteae
parvae, subulate, distincte.

obtusa base
acuta, sup. ra-
nitida

Olea foliis oblongo rotundatis ^{terminalibus}

temporalibus

Salicina O. foliis lanceolatis integerrimiis rae emi suprae compatis patentibus
Habebat in ~~grueno~~ fructu ^{fructu} ~~fructu~~ ^{I. cap. b. Spec.} Theroni ^{angustati} ~~angustati~~

Rami ferentes glabri cotyle cineres. folia opposita breves petiolatae recte
pellucens lata utrinque attenuata arenaria bis. triplacida subtus
pallidiora utrinque glabra. Flores pedicellis in pedicellis. Petala
ovata acuta bracteo ~~decidua~~ decidua.

Olea Caneca. foliis linear - lanceolati utrinque acutis pinnata
terminali fructu oblongo acutis la Mark. T. Enc. pag 29

⁵⁴
emarginata f. Olea foliis obovatis emarginatis, racemis paniculatis terminalibus
pannifloris

Olea emarginata; foliis ^{oblongis} ~~oblongis~~ ^{lamant} emarginatis, panicula panniflora terminali La Mart: Illustr. 1 p. 29. ~~no 81.~~ f. 8. f. 2.

Habitat in Madagascari herbarium Guibei & Desfontainii 5

Arbor ^{quadrangularis} ~~pedalis~~. Rami glabri, cortice cinereo. Folia petiolata,
l. 8. 4 pollicaria, obtusa, integerrima, coriacea, aerea, nervia,
utrinque glabra, supra nitida. Trupa magnitudine ferre nuncis
Juglandis, dulcis.

~~americana Olea foliis lanceolato-ellipticis s. V. p. 57. 3. Mant. 24.~~

~~Leguminosum laevis foliis, fructu violaceo bacis purpureis Cat. 6. t. p. 61.
7. 61.~~

~~Habitat in Carolina Garden~~ 5.

~~Olea americana foliis lanceolato-ellipticis, racemi compotis bracteatis angustatis
americana O. foliis lanceolato-ellipticis integerrimis, racemi angustatis, bracteis
omnibus persistentibus connatis pars vs H. Kew. t. p. 14.~~

~~Rami teretes glabri. Folia petiolata glabra acuta tripl. qua
dripolligera basi in versu attenuata puberula. Raceme
attlasses polligerae. bractea minuta ovata.~~

E Olea foliis ellipticis acutis, bracteis perfoliatis infimis cyathiformibus
persistenter, superioribus foliaceis magnis deciduis: Symb. bot. 3. p. 3.

Olea excelsa; foliis ellipticis integerrimis, racemis angustatis, bracteis per
foliatis: bascot cyathiformibus persistenter; superioribus deciduis
magnis foliaceis Hort. Kew. 1. p. 14.

Habitat in Madera

Rami cotice cuneas, glabri, punctis elevatis adspersi: articuli basi angustiores
bus, superne panum dilatati. Folia bi-tripolliaria, Lesque pollicem
lata, utrinque attenuata, integerrima, glabra, coriacea, loria, a
venia, subbas palpidote, obsoleta venosa. Pétioles angustulases. Ra
temi attillares, plerumque solitarii, rarius gemini, pollicares; bin
pliari. Pedunculus a bracteo Egathi forma, bifida; calixis divaricatus,
uti pedicelli angulatur: pedicelli oppositi uniflori, longitudine corol
lae. Bractes oblongae, membranaceae, conicavae, margine interdum villa
te, superiorer maiores, decidui, in fine quadrangularibus: & cores
Ol. polito duplo majorer. Calyx minimus; dentibus obtusis. Porula
calycis duplicata major, profunde quadrifida. Filamenta fere nulla:
antlers longitudine corolla. Germen conicum acuminatum, an
theris brevius.

apetala ⁷ Olea foliis ellipticis, floribus apetalis. Symb. bot. 3. p. 3.

Habitat in nova Zelandia ⁷

Rami angustis cineres punctatae. Solia bipollinaria et ultra patentissima,
acuta, irregulariter acuta, integerrima, coriacea, glabra, avencia, cineraria. Petioli unguifolares. Racemi axillares, subsolitarii, simplici
usq; imi, pedicolo parum longiorer. Bractea squamis duo oppositae
ad basim pedunculi communis. Calyx quadrididus: lacinia minuta,
acutea. Corolla nulla. Filamenta bravissima: Anthers divergentes.

Cernua ♀

Olea foliis oblongo-lanceolatis, racemis simplicibus axillaribus,
floribus cernuis. Symb. bot. 3. p. 3.

Olea obtusifolia; foliis oblongo-ovalibus obtusis marginata replica-
tis, racemulis brevibus axillaribus. Lamotte. Le March. illustr. I. p. 20.

Habitat in in Bula Mauritii Com merson, Thoren t. Bequia Pollonia

Rami glabri, cortice ciaesco, punctis elevatis adspersi. Olea la-
to-lanceolata, basi attenuata, paucita, apice rotundata, saxe emer-
ginata, integrerrima, coriacea, glabra, loria, avenia, margine
reflexa. Pedioli semiunguiculares. Racemi petiolo parum longio-
res, 2-3 duos vel tres, interdum solitarii. Bractea minuta, arada
solitaria ad basin pedicellorum, et duos alios lanceolatos sub
calyce. Flores Ol. bativo duplo maiores..

Olea foliis elliptico-lanceolatis subserratis, pedunculis laterali
bus aggregatis

Mohsii Kromph. Am. Et. forc. 5. p. 844.

Olea fragrans: foliis lanceolatis serratis, pedunculis laterali bus
aggregatis Thunb. fl. Jap. 18. t. 2.

Osmanthus fragrans Lour. fl. Cochinch. 29.

Habitat in Cochinchina, China, Japania.

Rami et rami Trichomi, glabi, catiue ceras. Dolia bipollis
lata et ultra, attenuata, basi acuta, interdum integerrima,
margine subreflexa, parallela nervosa, obcurse venosa, supra
nitida, pubes pallidiora. Pedunculi ex illas, quinque- cato,
angustiato. Corolla quadripunctata

b. t. v. 2
For absp. of one, in eng. - open right. O - orp. 10

~~Hypanthaea~~

Character esentalis

Porolla in equalis calyci infidens. Legumen trivalve terulofum.

Micromarpog¹⁰ Olea foliis ellipticis acuminatis serratis, racemis terminalibus +

Phillyrea indica; foliis ovaliis acutis; racemis terminalibus longioribus
fl. Portinch. 19.

Habitat in Portinchina 10

Arbor medicinis, ramosissima: rami patent, tortuosi. Folia parva
glabra, reflecta. Flores albi. Drupa parva, rotunda nigra lour.

L. C.

Habitus. Rami infra oppositi, inferne teretes, superne alternatione
compressi. Folia petiolata, opposita, indivisa. Pedunculi et pedi-
celli oppositi. Petioli supra plani, subtus convexi. Pedunculi
et petielli oppositi.

vulgare Ligustrum foliis lanceolatis, panicula ^{imperforata}~~innotomata~~ pedicellata op. posticis p. G. Thunb. fl. Cap. 15. p. 17
Ligustrum vulgare ~~L. L. L.~~ Spec. pl. pag. 10 ~~L. C. P. 4~~ ~~H. L. L. 14. f. 530~~ Pollent. h. 4.
Ligustrum Bounf. Math. p. 176 Lobel.
Ligustrum Germanicum Baeh. Pin 475.
Gbuta hampf. Gymn. Exot. fasc. V. pag. 296.
~~Blasius~~ ~~142.~~ Moll. Tab. 162

7 Habitat in Europa collibus glaberris. Tropica t.

q a foliis deciduis
β 14 Valicem foliis semper virentibus ^{ramulis apice pubescenter}
Rami recte glabri. Sola petiolata op. postic., foliacea & ultra
integerrima avenia glabra & rigida acuta. Panicula terminalis

Thysso Terminali

~~Tolka Adul
reduncle an serper oppo'
Patens to
petobi mons. super
klani
tolka opposits~~