

Omphalea

- 3 Cal. 4phyllus. Corol. nulla. Filamentum con columnare cui antherae apice insidentes
4 Cal. 5phyllus. Cor. nulla. Stigma trifidum. Capsula carnosa trilobulata
1. utillans O. racemis axillaribus foliis distichis ovatis acuminatis nitidis, petiolo
brevi semisuperis mucronatis, caule fruticoso
2. cauliflora O. racemis caulinis basi squamosis foliis distichis oblongis acutis nitidis,
caule arborescente
3. cordata O. racemis compositis lateralibus, foliis sparsis cordatis subtus vellosis, basi
biglandulosis, caule scandente
4. mucifera O. ramis compositis foliosis terminalibus, foliis sparsis oblongis glaberrimis
basi biglandulosis, caule arboreo.

Species omnes desident Richard

Omphalea.

Habitat in America herb. Musci

Folia petiolata cordata-cvata, subtus reticulata venosa, pedalia: venis villosis, integerrima, interdum cordato-lanceolata, basi angulis duobus est profertur. Petiolus apice biglandulosus

axillari C. micmi axillari, foliis oppositis ovatis acuminatis
nitidis, petioli brevissimi, stipulis mucronatis, caule fruticoso

Sic. prodr. pag 95

Habitat in Jamaica

non vidi

Argyhamnia

cauliflora O. racemis caulinis basi squamosis, foliis oppositis oblongis acutis reticatis,
caule arborescente Sw. prod. pag. 95.
Habitat in Jamaica 5

non vid.

Cordata
Quadrata

*Omphalea racemis compositis foliis terminalibus, foliis parvis cordatis
pubtus villosis, basi biglandulosis, caule scandente. Sw. prod. p. 95*

*Omphalandra frutescens diffusa, foliis amplioribus ovatis petiolatis
bis biglandulis, racemis terminalibus Brown. Jam. 334*

Omphalea Quadrata foliis ovatis L. S. V

Habitat in Germania

Rami glabri cortice duncato. Folia petiolata ovato-oblonga
acuminata vel cordato ovata: basi glabra venosa supra
nitida. Panicula lateralis semipedalis pedunculi
partiales alterni parvi cymula in parte parva brev-
i pedunculis partialibus, alternis distantis foliolum
petiolatum lineare obtusum cymula duplo longior

Differentia mutanda

trianandra O. ^{foliis} racemis compositis ^{foliis} ~~ver~~ ^{terminalibus}, foliis sparsis oblongis glaberrimis biglandulosis, caule ~~herbaceo~~ ^{terrestris} ~~Tr. p.~~

Omphalandra foliis obovatis glabris ad basin biglandulis, floribus
trianandris Brown. Jam. 338. t. 22. fig. 4.

Omphalea triandra foliis oblongis h. Am. acad. 5. p. 410 P. * S. V.

per
Habitat in Jamaica

Rami ~~terrestris~~ ^{sup. atyctog} purpurascentes. Folio petiolata, oblonga subcoriacea, obtusissima glabra. Pedunculis laterales spithamensi erectis. Cyma alterno rami divaricati die ^{rotundis} foliolum petiolatum cyma triplo longior, lincani lanceolata cum una cum petiolo fere tripollicari

cymulis racemosis foliosis, foliis oblongis basi biglandulosis

an *Linnaea triandra* Confer. fig. brownii
Monadelphia Sch. Diariona