

Oenopordon

1. acanthium O. calycibus squarosis: squamis pubulatis patentibus, foliis ovato-oblongis
pinnatis
2. illyricum O. calycibus squarosis: squamis inferioribus lanceolatis imbricatis, foliis
lanceolatis pennatifidis
3. arabicum O. calycibus imbricatis
4. grecum O. calycibus squarosis anethoideo tomentosis, foliis spinosis pubulatis
lanceolatis pinnatis tomentosis
5. deltoides O. calycibus squarosis anethoideo tomentosis, foliis petiolatis
ovatis angulatis subtus tomentosis
6. rotundifolium O. foliis petiolatis subrotundis integerrimis inermibus, squamis
calycinis lanceolatis, caule februlle
7. acardon O. acaulis, foliis lanceolatis pennatifidis

oenopordon macroanthum

confert cum Cardus greco parvo acanthifolus tomentoso flore minore
Tours. C. . . herb. mass.

vol. 2.

arabicum *Corydon calycibus imbricatis* L. l. V. p. 720. Jacquin. h. Vind. p. 70. t. 149

Acanthium altissimum lusitanicum. Mont. h. 3. p. 153.

Carduus tomentosus, *acanthi folio*, *altissimus lusitanicus* Tournef. f. R. T. 441. +

+ *Basel. 40. 50.* *Carduus tomentosus acanthium dictus*, *arabicus* Pluk. alb. 05. t. 154. f. 5.

Habitat in Lusitania, G. Narbonensi ♂

Canalis *Tomentosus*, alatus, alis spinoso-dentatis serratis. Volea capitea
nuncinata, pedali: lacina oblonga, angulata, dentibus spinosis: superiora
ovata oblonga, remote dentata, dentibus magnis spina ter minatis, magnitudine
fere *C. acanthii*, superioris folio florali longior. Calycis sepalia extrinseca
ovata, interiora lanceolata, extrema nitida. Radii pappi peltati bini
bini. Semina striata, transversa rugosa

Onopordon

Carduus creticus tomentosus aeanthi folio, flore magno purpurascente Tournef. Cor.

Habitat in Creta

Solva inferiori tomentosa. Squama calycina ovata lanceolata, exteriores reflexe, interiores medio sanguinea.

affinis illyrico. an varietas glutinosa? cauli vero magis alatus; feno minus valde alio cauli usque ad flores pertingentes, ridas subarachnoidea.

Onopordon maximo flore purpurascente Vahl. 1710. 5-

Carduus tomentosus, aeanthi folio Alepico magno flore int.

f. herb. 241.

f. flore maximo dilutiore

glutinoseum Onopordon calycibus imbricatis, foliis ^{glabris} inferioribus oblongo-
^{sinuatis} ovatis

Caulis lanceolatis dentatis

Carduus craticus, acanthi folio, viridi et glutinoso, flore purpurascens
Tournef. cor. 31.

Onopordon viride, glutinosum, maximo flore purpurascens Vaell. in
art. par. 1710. n. 6.

β Carduus craticus, acanthi folio, viridi glutinoso, flore albo. Tour
nef. cor. 31.

Habitat in Creta. Ex herbario Vaillantii

Caulis crassitie digiti intermedii, teres, sulcatus, ^{alatus a foliis decurrenti} ope lentis uti folia
pulverulentes, tamen viridis. Folia ^{venosa} inferiora O. acanthii, pedalia, den
tato-spinosa: caulino remote dentato-spinosa. Ala spinis validis
armata. Capitulum terminale, solitarium, O. illyrici majus.
Involucrum ~~antheris~~ lanceolato, sequentes ovato, inferi exteriores ses
qui pollicares, ope lentis ciliato, in glabra, in spinam desinen
tes.

pennatifida Sicoronea

Habitat in Armenia boreali herb. Ruk

Caulis herbaceus, erectus, lavis, glaber, in pedunculo diviso. Folio lanceolato,
inferiora petiolata, dentato-pennatifida, bipollicaria dentibus ovatis subdentatis
inferioribus profus minoribus: caulina sessilia, pennatifida: pinnis lineari lanceo
latis, integerrimis, terminalis longior. Pedunculi elongati, ^{usque} folis paucis lineari
filulatis, remotis. Calyx laxo subimbricatus: foliola exteriora angustissima
interiora linearia. Pappus pelosus, stipitatus

est potius Leontodon

secundum Descript. Diversum Strob. altero

uniflorum *Inopodon* caule uniflorum: foliis pennatifidis laciniatis dentatis,
Dentibus spinosis Cavan. Ic. pag. 60. tab. 88. +
Habitat in Catalonia

Acanthium O. calycibus squamis ^{subulatis} patentibus, foliis ² ovatis oblongo sinua-
tis Lin. S. V. p. 720* Fl. Dan. 1.

Acanthium Dod. pempt. 721.

Spina alba tomentosa latifolia sylvestris Bauh. pin. 302. Loef. p. 117.
261. t. 27.

Habitat in Europa meridionali cultis &

Caulis Planta junior magis lanuginosa & lana
Caulis ramosus uti tota planta & lana ^{serena} densiter cinerascenti virens, junior
lana densa. Folia inferiora ovata superiora lanceolata dentici-
tus spinis rigidis flavescens amara. Alos recta ad pedunculum
vixque ^{resurgens} ~~se~~ ^{resurgens} ~~erectis~~ dentato sinuato pinnosa. Capitula solita
na sub arachnoidea magnitudine nucis juglandis. Pappus pelosus
setosus.

illyricum O. Calycibus squamis: squamis inferioribus uncinatis, foliis lanceolatis ^{lanceolatis ovatis}
pennatifidis. Lin. s. V. p. 720. Jacq. hort. Vind. 2. T. 140.

Alanthium illyricum Lob. ii. 1. Barrel. T. 501

Spina tomentosa altera spinosior Bauh. pin. 302

Carduus quibusdam dicitur acanthium illyricum Bauh. herb. 3. p. 55.

Habitat in Europa australi

Tota planta lanata tomentosa cinereo cana. Folia pedalia et ultra
~~caeruleo ovato lanceolata remote apice in spinam valedam~~
~~referentes, feniis etiam spinosis et spinis minoribus. ala undulata~~
~~infra calycem spatiosae referentibus. Calo Capitulum~~ ~~ovato~~ ~~caeruleo~~
~~3 plo major. squamo purpureo referentibus apice vespitantes~~ ~~Calo~~

Mudrosanthus
O.

~~foliis~~
foliis radicalibus pinnatis caulibus canaliculatis squamis
tubulatis
calycibus canaliculatis patentibus

Habitat in Tergide Schouboe

Caulis bi-3 pedalis sulcatus pubescentis. Folia radicalia
pinnata laciniis canaliculatis dentatis simplicibus:
caulibus decurrentibus squamis calycibus inferius patentibus
diffusis

Onopordon

Carduus græcus capitulis minoribus Tournef. Cor.

Habitat in Græcia herb. fus.

Canoto tomentosum. Caulis erectus, alatus: ala dente sinuato, spinoso. Folia in
genova pedalia, mucronato-pinnatifida: laciniis lato-lanceolata, in ipso lobis
spinosis; caulibus remote dentato-sinuata, dentibus spinosis. Flores superne al-
terni, approximati. Pedunculi simpliciter, raro ramo unico, parum infra capite-
lem, absque ala. Capitulum magnitudine *Card. crispi* vel parum majus, lanato
arachnoideum. foliola ovato-lanceolata, spinosa, externa patentia, interna
flexilia. Pappus radiis breviter pilosis
an hoc græcus sit?

Onopordon

Carduus græcus parvus acanthi folio tomentosus, flore minore Tournef. Cor
rag.

Habitat in græcia. herb. Tusf.

Caulis ramosus, lanato tomentosus, uti folia proserpentibus. Dentes spicati
inter majores quod non in reliquis herb. Tusf. ubi tantum unus vel alter.

Pedunculis terminalibus ramosis, uniflori. Capitulum duplo majus: folio
la calycis amethnoidea, longiora quam in aliis Tusf.

an hæc græcum ?

Onopordon

Carduus gracilis parvis acanthifolius tomentosus, flore minore Tournef. Cor. p.

Habitat in Oriente herb. Mus.

Caulis superne lanato-tomentosus. Cœlea 3 polliciana, descurventia, dentato-pinnatifida
dentibus spinosis, supra glabra excepto costa, subtus lanata: ~~caulis~~ radice alba pedalis
& ultra, pinnatifida: pinnis inferne versis semper minoribus, ovatis, dentibus angulatis
dentibus spinosis, spinis minus validis quam in caulibus, utrinque lanatis, supra to-
men viridiora, subtus incana. Capitula axillaria & terminalia, 3 plo minoribus
O. acanthi, arachnoidea. Calycis squamis subulatis, patentibus, apice spinosis, fla-
vescentibus.

gracilis

græcum O. calycibus squarosis arachnoideo tomentosis foliis spinosis subulato-
lanceolatis pinnatis tomentosis Lin. Suppl. p. 349. g. f. V. p. 728
Carduus græcus, parvus, acanthi folio tomentoso, flore minore Tourn.
corol. p. 31

Onopordon græcum calycibus subsquarosis, arachnoideo tomentosis,
pinnis subulato lanceolatis pinnatis tomentosis Gouan ill. p. 64. t. 25

Habitat in Oriente O

Caulis palmari, pedalis ad tripedalis valde tomentosus. Folia radicalia
sesquipedalia. dens tomentosa una in petiolum perantifidum abeuntia. Pedun-
culi solitarii uniflori, magisque tomentoso arachnoideis quam in
ceteris, raris majori magnitudine. Squamae magis erectae et lanceolatae
quam in onop. acanthis, minus quam in arabico. Gouan

non vidi.

Deltoides O. calycibus squarrosis arachnoides tomentosus, foliis petiolatis ovatis angulatis
pubtis tomentosus Hort. Kew. 3 p. 146.

Habitat in Sibiria ?

Paulis proferit in superne arachnoides tomentosus. Folia cordato
lanceolata angulis rotundatis, basi per petiolum parum recurva
tri supra glabra margine ser. ~~reticulata~~ - Squama subulata Radice
Culi uniflori

— radialibus cordatis lanceolatis

rotundifolium ^{petiolatis} foliis subrotundis integerrimis cernibus lanceolatis, squamo
lanceolatis, caule subnullo

Arcton quonundam Dalech. hist. 1307

Centaureum majus alpinum acaulos ferme foliis verticillatis lanuginosis

Poirnef. in P. 4 449:

Rhaponicum caule humili unifloro, foliis integris tomentosis Hall
hist. n. 160.

Berardia subacaulis, foliis crassis tomentosis subrotundis, caule
unifloro Villars.

Onopordum rotundifolium All. fl. Ped. p. n. 526 Tab 30. fig. 1.

Habitat in alpinis Sabaudia et Helvetia 7

Caulis plerumque nullus ~~erigitur~~ pennis Pygmae interdum 2 f. 3 p. 10.

Pennis crassitate pennis cygneis simplicibus sinuatis, lamina cano-anesca
obductus uti tota planta. Folia radicalia vel in cauleferenti

supremum 2 vel 3 in caule renoscentibus magnitudine sole manus
folium caulis ellipticus per petiolem parum recedentes petiolus planus. Flores sessilibus
lanceolatis inter folia magnitudine ferre pugni oratum. Squamo calycis umbri
Cato spinula terminatis

Hallens. varietatem Centaureo rhaponit. facit videt hist. p. n. 160

acaulon Onopordon acaulis L.S.V. pag. 720*

Onopordon acaulis ferme, flore albicante Turf. Vaill. act. 143. Hall. goth. 357.

Habitat.

caulis angulatus ~~dentatus~~ angulatis venis in pinnis ^{suaviter} validis de
colis A. illyrici, tomentoso-albida. Caulis omnino nullus. Calyx unus sessilis ad radicem,
Dein alii calyces laterales erant pariter sessiles Lin. l. c. Calyx glaber
squamis exterioribus ovatis in pinnam attenuatis