

Onosma

1. *Simplexiflora* O. foliis confertis lanceolatis leneanibus pilosis.
2. *orientalis* O. foliis lanceolatis hispidis, floribus racemosis corollis pubescentibus fructibus pendulis.
3. *echinocephala* O. foliis lanceolatis hispidis, floribus racemosis; corollis obtusis fructibus erectis.
4. *mucronata* O. flavigena, foliis lanceolatis, pedunculis axillaribus foliis tanis fructiferis pendulis.

gigantea

M

Sibirica habet n. fallax

Microanthos

4 uniflora O. & Brign. foliis lanceolatis pedunculis at illaribus foliatis
Calyxibus ^{fructu} nutantibus corolle obtusa
Onosma orientalis Pall. S. vol. 2. app. pag. 38 Tab. L

Habitat in Siberia O.

caulis erectus, spathamous. riles albi rigidi et propterim supeme
et calyces adspersi, ramosus rami simplices astillares flori
feri. folia sessilia lanceolata margini ^{distantia} Brigno ciliata
qui foliorum oblongula integerrima, Pedunculi in axillis
foliorum foliarii, uniflori, florates exodi fructiferi nutantes
Calyx laevis ciliari pubescens Congitidine ^{lutea} tubi corolle
Corolle tubus vil ^{venus} sine vellosus. tubus sub limbo incrassatus.
limbe obtuso.

Microanthos B. caule ramoso sub glabro. foliis ovato-lanceolatis subter
cavis, floribus paniculatis ad March pag. 407.

Onosma

Hort. Hafn. decumbentes numerosas
foliis planis diffusi demum adscendentes recte pilosi. Slatini folia
linea non frequentia, bipinnata ^{scutellae.} ultra opposita, linearia
rambo rigiduscula supra concretata subtus contracta
pilosa profectione pubescentia ^{concreta.} marginae acerba. Pedunculi ter-
minales viridi carescens uti calyces racemi cornui latus
quaque pectitus laetius linearis laevis colatis. Corolla calyx
in duplo longior semipollucis pallide flavo basi purpureo
intensius colorata, tubulosa, superne breviter ampliata laetissima
rotundata patente. Stylus corolla longior

forte & amplissima

~~Guareolens Memop folij linearibus aicuumnat i rectis
marginis costilaginis: primordiis alibus pennatis, ramiis
angustis Smitha Lin. Trans: 1. p. 2 5 3.
Habitat in nova Hollandia 5~~

non vidi.

gigantea. O caule ramoso altissimo, foliis oblongo lanceolatis foabro
calycibus pilosissimis la mark. p. 4107

Habitat in oriente

non vidi.

~~perlata A. ramosa decurva bene, foliis ovato-oblongis subdentatis
variegatis sparsis foliis perennibus~~ La Marche pag 40,
~~Lyciopsis variegata~~

~~Habitat in Caudia O~~

frutescens Onosma

Habitat herb la Marthe

Solia inferiora lato la nocolata, hypoleuca

schonata Onopha

Habitat herb - Deserto.

Pauli crassiflē penno anſeno, ramosus, hispidissimus, ut tota planta: rami
alterni simplices. Folia canaliculata

habeo

Flammea Onosma

Habitat in Syria herb-Desert.

Caule plures, ascendentes, puberulus; herba; spichamoni. Dolce populi, pollicana,
caniculata, integerrima, fabricula, subaspera. Flores superne, axillares; folia
nigra, pedunculata. Pedunculi quadri-feri nudatores. Semina punctata munia
ta
an O. orientalis?

Oneoma

Symphytum orientale angustifolium fl̄e coeruleo Turnef Cor.

Habita in Oriente Herb. Desfont. 34

Cauli-pubes, erecti; fampedalo. Sola radicula pedata, polliori, caniculata, incana.

Onosma

Symphytum orientale, Echii folio flore albo tenue spinosum Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. myr.

Caules plures, ascendentes, simplicispinos

Symplicia *spina* *Orosia* foliis confertis lanceolato-lineariibus vellosis L. Spec. 196. * S.V. p. 100
Echium coeruleum Alp. ext. 130. t. 129. Monsp. t. 3. p. 439. f. 11. t. 27. fig. 3.

Habitat in Siberia.

Paulus Gmelini Symplicia lignosa, intenuum ad basi ramo uno alteriore. Dolia
confertissima utere basi imbricata, digitis fere congesta, angustissime lan-
ceolata et fere linearia, basi attenuata. Racemis septem duos, caulem verni-
nantes, vix pedunculatae. Flores Sympyti absque paleis

ciliata Onopanax pilosissima, foliis angustis - lanceolatis verrucosis
floribus rusticibus, feminis tuberculatis Desfont. fl. atl.
pag. 161. tab. 161.

Habitat in desertis arenosis Barbanae. ♂

non vidi.

macrophylla A. vernicosa, foliis radiculis ellipticis: caulinis lanceolatis
flexib; cule debili, raceme laevis.
Anchusa macrophylla La March.

jenica Onosma folio petiolati oblongo - lanceolati serice vellosa
Ned. spec. pag⁷⁷⁴.

Symplyrum orientale obovato folio argenteo, flore flavo-purpureo
Tournef. Cor. 6.
Habitat in Oriente.

non ad.

coerulea Onopordum glauca scaphularia canaliculata ferina velutina, staminibus corollis
la longioribus Wild. Spec. pl. pag 775.
Symphytum orientale angustifolium flore coeruleo Tournef. Cor. 7.
Habebat in Armenia 4

remed.

tenue-flora Onopanax foliis perfoliatis linearibus obtusis hastis, corollis cy
lindarum calycinis foliis linearibus panicum conformatis
Wild sp. pl. pag 775.
Lymphaea orientalis etiam foliis, flore albo tenuissimo
Tournef. cor. 6.
Habitat in Orientale

Harvard

- 3 echinoides O. foliis lanceolatis hispidis, fructibus erectis Lin. t. V Gmel. f. 4 d. 40
Jacq. fl. austri. 3. t. 295
- Anchusa echinoidea lutea, crenthe flore, montana Pol. Ciph. t. p. 102.
t. 103.
- anchusa lutea minor Baeh. pl. 255
- p. Anchusa lutea Dalech. hist. 1102.
- Anchusa lutea Cam spit. 736
- Anchusa lutea major Baeh. pl. 255.
- Anchusa lutea major Baeh. pl. 255.
- Habitat in Austria, Pannonia Helvetio et Europa australi repubus
- 24
- Canis plures adscendentis foliis seminatis e foliis longis capillis
seminalis glauco-pelosum. folia latae et folia hirta se superponunt
non se confundunt. Racemi gemini terminalis subspiciles apice reflexi
non se confundunt. Racemi gemini terminalis subspiciles apice reflexi
seminalis glauco-pelosum. folia latae et folia hirta se superponunt
lanceolatis. Stylus corolla longior calyx non florifera est
floribus rameofolis fructibus erectis
- nigra

Capparis Onosma caule ramoso divaricato foliis oblongo - lanceo-
cubis hispedis, pedunculis astillibus fructiferis reflectis
carollis obtusis Wed - Spec. pl. pag 735.

Onosma orientalis Pall. S. 2. tab 6.

Habitat in aere opsi vepre more cappense.

orientalis Onosma foliis lanceolatis hispidis, fructibus pendulis Lin. S. V. p. 180

Cennthe Orientalis Am. Ac. 4. p. 267*

Habitat in Oriente.

Caules teretes, hispidae. Colia alterna, sessilia, integrerrima, hispida pilis
viridibus aut albicantibus. Racemus terminalis duplex racemos. Bracteae
lanceolatis, angustioribus, hispidae. Flores pedunculati; calyxis foliola e corona
ta figura in linearum transiunt. Corolla quinquefida symmetris pubulata;
scutis, patulis, stamina pubulata, longitudinaline corollo. Differt igitur ab
O. Echinoide; quod non pilis flavescit; quod corolla non obtusa; quodque
calyx fructus non eretus; nec foliolis linearis lanceolatis Lin. Am. Ac.

orientalis O. folius - - - - - floribus racemosi fructibus pendulo
corolla pubulata