

Ophoglossum

Cpheoglossum

Habitat Port Praslin Comerson herb. Fus.

Stipes teres, laevi, nitidus. Petioli bipartiti: foliola profunde fissa, palmata
lobi lanceolati, sive ad apicem, attenuati, semipedales vel breviores, glabre, intra
geminis, margine flavescende; nervi bifidi vel bipartiti, interdum sempolli-
cem lati, interdum angustiores, margine fructificantes, eodem modo
ac in frondosa.

confer Rumph. Amb. C. p. 75. T. 33.

an due species, alter foliis angustioribus geminis vel petiolo bipartito
5-fido, alter foliis petioli bipartiti fronda plures diviso

Scandens Ophryoglossum caule flexuoso tereti; frondibus conjugatis pennatis: pinnis
utroque principalibus Lin. b. V. pag. 926.

Habitat in Lapula Trinitatis In Ryan.

Stipes teres, subpubescenti, flexuosus.

Folium frondes conjugate pennate, ^{cum pari} 14 puz, pedales: pinnula petiolata
unica terminali, alterno, quadri pollicares; canaliculata, basi
subcordata, extrosus sabrenata; creni serrulati, intus fructifero raris
omni utroque adperso pili raris; inferiores pennate cum pari
vel impari, quinata vel quaterna.

Fructificationes in dentibus elongatis, ad lat & margine pinnularum,
lineantibus obtusis; unguiculantibus paralleli.

Petioles omnes villosi

elongatum Ophiozles puri.

Habitat in India orientali herb. Thesf.

Facies oph. pondentis. Truncus alterni, petal. brevissimae, pediculis longioribus, ductu
in folia sterilia pellicula lata. fetiles semipedales, angustiores, attenuati
in apice bifidi. fructificationes breves, glabrae

Bulbophyllum OphioGLOSSUM

Habitat in Carolina herb. Mus. communicavit Richard

Bulbus minutus. Spons orata, unguiculari, inferne in scapo. Scapus digitalis.

Spec. a semiunguiculari

mediculae profundius ovatis scapo aphylo Lin. Suppl. p. 443. * L. V.

1792.

Habitat ad Cap-b-pai

vulgatum O. fronde ovata

fl. Dan. Tab. 147

OphioGLOSSUM Bauh. pin. 364.

OphioGLOSSUM vulgatum Bauh. pin. 354 Plum. fil. xxxvi. Tab. B.
fig. 5.

B. OphioGLOSSUM minus, subrotundo folio Bauh. prodr. 150. pin. 354.

Habitat in Europa partibus Sylvaticis

Lupitanicum O. fronde lanceolata Lin. LV

Ophioglossum pumilum autumnale Just. rind. leaf.

Ophioglossum ~~Lupitanicum~~ angustifolium minimum Bar. ic 252.

^{fig. 2.}
Habitat in Lupitania et Italia

reticulatum O. fronde cordata Lin. L. V

Ophioglossum cordatum et reticulatum Plum. fil. 148. T. 164.

Ophioglossum vulgari facie Pet. fil. 179. T. 10. fig. 4.

Habitat in America meridionali

palmatum O fronde palmata basi pinnifera Len 1-V

Ophioglossum palmatum Plum. fil. 139. t. 163. - Bot. fil. 178. t. 66. fig. 2

Habitat in America meridionali

Stipites basi lanati - Erons bifida in stipitem glabrum attenuata
laciniis lanceolatis, pithameo vel ultra, integerrima, glabro
tenuissime venosa. Spec. & ad bursa frondis pedicellata vix
pollicares hab. Thunb.

pendulum O. Frondibus lineariibus longis fere indivisi Len. LV

Scolopendra major Rumph. amb. 6. p. 84. Tab. 337. Fig. 3.

Habitat in India abboribus parasiticum, pendulum
Frondes indivisa vel dichotoma: laciniis lanicolatis longis

Scandens O. caule flexuoso tereti, frondibus conjugatis pennatis: foliis
utrinque pinnatis. Lin fl. zeyl. 374 + Lin Spci: pl. pag. 15104

Tien walli-panna Rheed. mal. 12. p. 65. t. 33.

Tilia scandens pulchra brasiliensis Breyer. cent. 105. t. 96.

Adiantum solubile Rumph. amb. 6. p. 75. t. 32. fig. 2.

Habitat in India t

aliud ut videtur e Philippinis vidi in herb. Mus.

flexuosum C. caps flexuoso tereti, frondibus oppositis petiolatis palmatis:
junnis lanceolatis integerrimis glabris Lin-suppl. p. 443. T. V.
pag. 926.

Dianthus solubile polyperdis / *major* Ramph. amb. L. p. 75. t. 33
Habitat in Andria

japonicum O. caule flexuoso angulato, frondibus suprae compositis: pennae
lis alternis incis. Hunt. fl. jap. p. 5. V. pag. 926.

Habitat in Japonia

Linea