

Ophiorhiza

1. microp. O. foliis lanceolato-<sup>o</sup>ovatis <sup>ellipticis</sup> capsularum lobis divaricatis obtusis
2. micicola O. foliis ovatis capsularum lobis erectis acutis
3. subumbellata O

1 mango O. foliis lanceolato-ovatis Lin. t. v. p. 197.

Ophiontiza Lin. fl. Zeyl. 402† Mat. med. 79. t. 1.

Habitat in India orientali &

Caulis simplex. Folia opposita (Adhatoda) integerrima glabra,  
nervis oblique transversis, petiolata. Pedunculis terminalis, corym-  
bus ex species simplicibus sine bifidis, umbellatis digestis ex uno  
centro et patentibus. Flores sessile a latere superiore horizontali piceo.  
Corolla infundibuliformis, interne barbata. Capsula ovata, compres-  
sa, bilobulata dissepimento valvis contrario, bivalvis ad demum  
dehiscens Lin.

foliis lanceolato ellipticis

2 *Mitrella* *Ophionhera foliis ovatis* Lin. l. v. pag. 197 l. m. obj. pag. 99. tab. 3. fig. 2.  
*Mitrella* Hort. Cliff. 492. Gron. 28.

Habitat in America meridionali 2

Caulis pedalis simplex vel ramifus, erectus inferne ~~vel~~ <sup>et</sup> ~~trigonus~~, <sup>supreme</sup> ~~tricuspidatus~~ <sup>tricuspidatus</sup> ~~scissus~~  
glaber, laevis. Folia petiolata opposita, lanceolata-ovata, acuminata, venis  
gra, utrinque glabra. foliola in axillis majorum. Pedunculi terminales, dichoto-  
mi, laxi. Flores minuti sessile distincti: flori solitarii in dichotomia. Saus  
corolla villosa. Germen ad basin bipartitum. Styli duo. Stigmata subrotunda  
pubescentia l. vi.

Charakter inula a Swartzio traditur Reinhard

non ad idem Desf.

subumbellata O. caulis foliis lanceolatis umbellis axillaribus trifidis  
Ophiocniza subumbellata caule fruticoso, foliis lanceolatis  
acutis umbellis axillaribus trifidis Forst. pl. austr. no 66  
Habitat

non vidi