

Ophrys

Simbrata O. bulbis fibrosis, caule folioso, nectari. labio indiviso  
Simbrato Walt. fl. Carol. p. 221.  
Habitat in Carolina.

non vid.

*Cphrys*

Habitat in America Septentrionali herb. Desfont.

Radix fibrosa. Caulis palmari etultra, tenuis, glaber. Folia duo in medio, opposita, cordata, unguicularia, mucronata. Flores circiter 7. parvi: Nectarii lobium bipartitum: lacini subulato, angusta

uni folia Ophrys

Dorset

Habitat Dorset. heb. May.

Caulis semipedalis, totus usque ad apicem fere velut vagina foliorum. Spica  
pollicaris. Flores parvi.

*Ophegys bifolia canadensis major*  
Habitat in Canada herb. mus.

herb.

*Helleborus scaberrimus* floribus minimis luteis Plum. t. 105. 1.

Habitat in Antillis herb. Surinam. Apud Guayana

Caulis basi bulbosus, inferne vaginis foliorum vestitus, compresso-angustus

Folia opposita, 3-4 pollicaria, lanceolata-oblonga, obtusa, multinervia, glabra,

Pedunculus prostratus. Flores spicati, prostrati secundis, distantes, pedunculata  
4-8, 10-12 floris

*Ptilifolia* O. scapo nudo, foliis lanceolatis, nectarii labio integro, petalis dorsalis  
lineariibus Linn. Spec. pl. pag. 1341. S.V. p. 813.

*Ophrys* scapo nudo, foliis radicalibus ovato-oblongis dimidii scapi longitudine  
Gron. voy. 1. p. 185

Habitat in Virginia, Canada paludibus 2

Loeselii Oph. bulbo subrotundo, scapo nudo Inyono, Nectaris labio ovato  
lin. spec. pl. pag. 1341. & S.V. pag. 1341 & S.V. 8 Pl. Dan.

Ophrydophyllis bulbosa Loef. prusj. 100 tab. 50.

Habitat in Europa boreali paludibus <sup>cur</sup> in alterum annum scapo  
persistente <sup>per</sup>bulbi globosi <sup>textus</sup> <sup>unicis</sup> <sup>membranaceis</sup> solca radicalia duo vel tres unicum reliquis  
latius brevius <sup>et</sup> oblongum reliquo lanceolata obtusa  
scapo breviora. Caput palmari vel dodrantali nudus super  
ne triquetus. Flores pedicellati erecti. <sup>et</sup> ad 6. Bractea linea  
res pedicelli longitudine. Petala subulata <sup>patentia</sup>. Nectaris labium  
petalis majore ovatum



ovata 0

paludosa 0 bulbo subrotundo, scapo subnudo pentagono, foliis subrotundis herbaceis  
lobis <sup>interis</sup> ~~in~~ Spec. pl. pag. 1341. # S. V. pag.

*Orchis bifolia* minor palustris Pluk. alm. 210. t. 247. fig. 2.

*Bifolium palustre* Raj angl. 3. p. 385

Habitat in Europa boreali paludibus turfosis sili

Bulbus globosus <sup>in sup. radicatus uti *Orchis*</sup> tunicis membranaceis vestitus magnitudine  
pisi. Folia radicalia 3-4. spatula alterna vix semunquibus  
lania apice in pagina inferiore scabra. Scapus digitalis. Flores  
conspicui pedicellati vixi flarescentes. Petala duo lateralia  
ovato-oblonga reflexo-erecta 2 interna lateralia recurva linea  
na supremum rectum. Labium lanceolato-ovatum reflexum  
ha

monophyllos O. Rapa nudo folio ovato, nectarii labio integro Lin. S. V.

Pseudo Onchis monophyllos Clus. hist. 1. p. 269.

Opterys monophyllos bulbosa Loef. p. n. v. 180. tab. 57.

Erinactis folio unico, amplexu cauli, spica prolixa multiflora  
Hall. hist. 1293. tab. 36.

Habitat in Borussia, nec in paludibus sylvaticis 4

Bulbus globosus foliis tuncis latens scissus. Caulis palmari vel  
pedali, filiformis glaber. Spatio, nullo an interdum altius  
supra radicem folio <sup>nullo an vel ultra</sup> obovo basi vaginali  
triplo brevior, multiflora. Flores pedicellati <sup>minus</sup> spica caula  
res: petalum supremum ovatum lobata 4 lanciolata.  
nectarium oblongum.

mononchis O. bulbo globoso, scapo nudo, Nectari labis trifido. Cruciato

£ Mononchis bifolia flore pallide vivente Mendr. pugil. fig. 5.

Mononchis montana minima, flore obsoleto vix conspicuus Mich. nov.

gen. p. 30. tab. 26.

Orchis trifolia floribus spicati herbaceis Segui p. 131. tab. 16.

Orchis bulbo unico subrotundo, labello cruciformi Hall. hist.

(262.

Orchis odorata moschata s. mononchis Bauh. pin. 84.

Orchis radice subrotunda, labello hastato Gmel. fib. 1. p. 10. t. 4. fig. 1.

β. orchis lutea, hirsuto folio Bauh. pin. 84.

γ. trionchis lutea, folio glabo Bauh. pin. 84.

δ. trionchis lutea alba Bauh. pin. 84. 2.

Habitat in Europa pratis uliginosis <sup>hispania</sup> <sub>3</sub> interdum duo angustiora

Folia duo <sup>3</sup> ad radicem lanceolata <sup>hispania</sup> unicum parum latius brevius

Scapus palmari filiformis <sup>hispania</sup> vixip medium foliolum subulatum

Specia sope  
caule longior

Specia pollicari multiflora flores sespiles cernei. Bractea sub

lata longitudine germinis brevius. Petalum supremum oblon

gum inferiora ovato lanceolata

alpina 0 bulbis ovatis, sicaponudo, foliis subulatis, Nectanei labio indiviso,  
obtusis utrinque dentatis Ken. Spec. pl. pag. 134. Jacqu. Vind. p. 295. Tab. 4. h.  
Chamaeorhis alpina graminea folio Bauh. Pinod. 29. pin. 01.

Orchis radicibus subrotundis, labello ovato, utrinque denticulo notato

Hall. hist. fa n. 1263. tab. 22.

Habitat in alpebus Helvetiae Norvegiae Laponiae &

Bulbi rariore planta magna. Bulbi radicales plura lineari  
sicapo paulo breviora obtusiuscula pulposa. Sicapo tripollicari  
flores approximati. Bracteae lanceolatae. Flores longiores sespiter.  
petala una lanceolata - interiora parva subulata. Labium  
obtusum

infectifera O.

myodes bulbis subrotundis, scapo folioso, necdani labio oblongo, quadripartito,  
laciniis duabus mediis elongatis lanceolatis L. V. p. 213. Faeg. Musc. vol. 2. p. 375  
Orchis musco corpus referens, five galea, et alis herbis Vaill. p. 147.  
Tab. 31. fig. 17. 18. Bauh. Pin. 83.

Orchis radicibus subrotundis, labello sericeo bifido, brachiolis brevibus  
subulatis Hall. hist. 1265. Tab. 24

Orchis myodes galea et alis herbis. B. hist. 11. p. 767

Habitat in pratis et pasuis

Ophrys muscifera bulbis subrotundis, scapo folioso, necdani labio  
quadripartito Hudf. fl. Angl. p. 291. +

Habitat in pasuis et pratis cal solo calcaro anglis, Europa  
austriaca, Barbant

Caulis palmari vel pedalis inferne foliatus superne folioloso ut semper  
lanceolato. Folia radicalia lato lanceolata. & longe remotissima  
Bractea lanceolata longitudine floris. Petala parviora exteriora  
Anthera oblonga undia. interiora minoribus angustioribus atropurpurea  
Labium dependens cauli parallelum medio concavo maxilla  
notata sericeo nectaris laciniis linearibus obtusis lobus intermedius  
angustus linearis exteriorum parum dilatata aliquis longior  
apice subbifidus

unifolia O. bulbo ovato scapo tereti vaginato, foliis tereti fistulo  
80, medio partus o *Bot. prod. pag. 59*  
Habitat.

non vidi



*Arachnites* *O. bulbis* *subrotundis*, *scapo* *folioso*, *nectarii* *labio* <sup>lato</sup> *emarginato*  
appendice *lato* *lin. l. v. p. 113*

*Onchis* *fuliflora* *galea* *et* *labio* *purpureo* *scandibus* *Bauh. herb. 2.*  
*p. 767.*

*Onchis* *araneam* *referens* *Sequi* *suppl. p. 244. Tab. O. fig. 1.*

*Onchis* *fulva* *referens* *major*, *foliis* *superioribus* *candidis* *et*  
*purpureis* *inferioribus* *Bauh. pin. 03. Vaill. tab. 30 fig. 13.*

*Onchis* *radicibus* *subrotundis*, *labello* *holosericeo*, *emarginato* *appen-*  
*dice* *lato* *Hall. herb. 1266.*

*Onchis* *fulva* *referens* *colore* *rubiginoso* *Bauh. pin. 03.*  
*Vaill. parif. tab. 30 fig. 15. 16. pag. 146.*

*Onchis* *araneam* *referens* *Bauh. pin. 04. Vaill. parif. 146*  
*+ 30. fig. 10 + 13.*

*Ophrys* *araneifera* *bulbo* *subrotundo*, *scapo* *folioso*, *nectarii*  
*labio* *subrotundo* *intero* *emarginato* *convesso* *Hedf.*  
*fl. Angl. pag. 392 +*

*Habitat* *in* *pratibus* *et* *populis* *cretaceis* *Anglia*, *Europa* *austro-*  
*lis* *et* *Barbana*

*nota* *syn. Hall. ad* *araneifera* *huius* *forte* *notus* *pertinet.*  
*videatur* *cum* *syn. genuina* *est*

Caulis pedalis. folia lanceolata inferora latiora. Spica rara tri  
vel quadriflora. Petala tria extensa orato-lanceola duplo longiora  
majora quam in myode, obtusa alba <sup>innervata</sup> ~~venata~~ <sup>herbacea breviora</sup> ~~et~~ <sup>crispula villosa</sup> ~~et~~ <sup>stigmata</sup> ~~venis~~  
venantibus. duo interiora linearia <sup>crispula villosa</sup>. Nectarii labium  
magnum subrotundum integrum emarginatum convexum coloratum  
feneceum, ad basi macula bilobata nitida glabra, utrinque  
macula dente obtuso ~~extrema~~ <sup>subtus</sup> ~~extrema~~ <sup>concolora</sup> supra atro-purpurea  
margine viride, infra herbacea Hudf.

grandiflora 0

Orchis orientalis fucium referens, flore maximo Tournef. Bor. pag. 31

Orchis sicaraboum referens Bryn. Cent. pag 101. Tc. 45

Habitat in Barbana

Folia radicalia ovato oblonga nervosa acutiuscula sequi polli-  
caria ultra pollicem lata, unicum inferne in caule oblen-  
gum vaginari. Spica pauciflora 3-7. Bractea dato  
lanicolato longitudine floris. Petala tria extensa con-  
niventia ovata. Labium quadrilobis hirsutum lacinia  
intermedia longior laciniis rotundatis

Differentia ad Descript. ulbeni elab.

apifera O. bulbis subrotundis, scapo folioso, nectari labio quinquelobo,  
lobis furtis inflexis Huds. fl. Angl. pag. 391 +  
Orchis fucum referens major, foliis superioribus candidis et purpureis  
lobis B. pin. 3. Vahl. papif. 30. fig. 9. pag. 146  
Orchis fuciflora galea et alis purpurascens Bank. hist. II. 766.  
Orchis radicibus subrotundis, labello holopurpureo emarginato appen-  
diculato Hall. hist. 1266. +. 24  
Habitat in partibus Angliæ et Europa Australis et Barbaris  
cætares 4

+ *Ophrys arachnides* bulbis subrotundis, scapo folioso, nectari  
labio lato emarginato appendiculato Her. L. V. pag. 813  
Folia radicalia latera. flores plures quam in precedente si mea  
vera est  
Petala tria externa, patentia, oblonga purpurascens intrin-  
secis viridibus. Duo interna lateralia linearia villosa viridia  
Nectari labium magnum, subrotundum quinquelobum coloratum  
brunneum atropurpureum lobis furtis inflexis maculatis basi  
bilobata luteo variegata, glabra nitida utraque macula dente  
obtusis exserta Huds.

*Sceloporus Ophrys bulbis ovatis caule terete foliis lanceolatis  
cuculli rostro prolongo Cavan. Ic. 2 p. 46. Tab. 161.*

*Habitat in Hispania*

*Bulbi oblongi caulis pedalis flores subsiles bractea in  
cullata. Calyx violaceus foliolis ovatis. Petala 2 superiora  
vulgate violacea. tertium dependens trilobum <sup>lobis</sup> limbo medio  
majori limbo utroque revoluto ut tubum ventris operat  
Cavanellas*

*non vidi*

*Lutea Ophrys bulbis ovatis - foliis ovato-ovatis caulini amplexivaulti  
tus canaliculatis, Corolla petala majoris tripartito luteo Cavan. Ic.  
2. p. 46. Tab. 160.*

*Habitat in Hispania. C*

*Caule terreo foliifus, vix pedalis. Folia radicalia subtus argen-  
teu. flores alterni. foliola calycis 3. ovata. Corolla  
3 petala superiora brevia lutea testum magnum superne  
cannatum. canna fusca tomento brevi lucida. Germen  
oblongum Cavan. labium nectarii tripartitum. lacina  
media emarginata*

*villosa* Ophrys neotani labio infido hirsutissimo, caule subaphyllo

Orchis orientalis, fucium repens, flore parvo, villosissimo, tubo aureo  
<sup>Japon. Cool. 30</sup>  
Orchis muscari majorem coeruleam representans B. Reyn. Cent. pag

100. 7c. 44

Habitat in Babano solo calcareo

bulbi globosi. Folia radicalia 5-6 ovata lanceolata sesquipedalia  
unicum caulinum vaginans lanceolatum inferne. Spica 4 f. 5

flores remoti sessiles patentissimi. Bractea lanceolata  
comptitudine germinis lateralibus minor

Petalum supremum <sup>lateralibus minor</sup> galeam formans oblongum. <sup>lateralibus minor</sup> Labium  
obovata <sup>lateralibus minor</sup> nervis tribus saturatioribus. Labium

interiora circiter  
lanceolata

dependens petali duplo longius supra valde hirsutum subtus  
glabrum <sup>lateralibus minor</sup> flavescens nervis plurimis purpureis punctum  
pili <sup>lateralibus minor</sup> castanei purpurei longi. Calicinia intermedia obovata den-  
ticulata <sup>lateralibus minor</sup> nervis reticulata lateralia <sup>lateralibus minor</sup> angustiora  
oblonga breviora

*Emergosa* *O. scapulofoveata* *nectarii* *laticornis* *concolor* *crucis* *insignita* *Saigu.*

coll. h. p. 60. l. v. p. 814

Habitat

prope myadem collocanda



anthropophora O. bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio <sup>longo</sup> tripartito  
medio elongato bifido linc.

Onchiflorae nudi hominis effigiem representans, foemina Vaell.  
Tab. 31. fig. 19. 20

Onchiflorae radicibus subrotundis, picea longa, flore inermi, lobello  
per angustum bifido quadrifido Hall. h. 1264. Tab. 23.

Habitat in Europa australi Barbararum

Folia lanceolata, plura, basi <sup>scapum</sup> caulem vaginantis obtusa scapo dimidio  
breviora. Scapus pithamouus vel pedalis interdum in versus medium  
folium lanceolatum vaginans interdum in minoribus squama ovata,  
superne angulatus. Flores numerosi medio scapi. Bractea lanceo-  
lata attenuata longitudine germinis. Petala duo exteriora ovata lanceo-  
lata, galeam formantia. Petala duo interiora angusta. Labium  
descendens pedalis longius laciniis fileiformibus, parvis planis

Secundum herb. Vaillantii hinc pertinet  
Onchiflorae anthropophora oryzae Ed. Cluspr. 1. 320

Onchiflorae parvo herbaceo colore cum limbo purpureo cincta Tournef

Tab. 1. h.

Det. Gussien

alata O caule folioso foliis lanceolatis, Labello trifido: Cademia media brevissima  
Lin. Suppl. p. 404. L. V. 113.  
Habitat in Capite bonoppei 4

alata O. caule diphylo, foliis oblongis acuminate spica  
Secundo Thunb. prodr. pag. 2

alata Oph. labello trifido, Cademia media brevissima caule  
polyphylo Thunb. prodr. pag. 2.

non vidi

*Orchidea*

caulis pedalis <sup>angustis glabris</sup> ~~refertur~~ foliis <sup>vaginatis</sup> ~~liquor~~ subulatis <sup>vaginatis</sup>. Corolla  
forte resupinata <sup>perita</sup> ~~la~~ <sup>duo</sup> lateralibus ovata attenuata obtusa  
aquea <sup>crassiuscula</sup> basi altero latere parum longiora, reliquis  
majora Tertium inferum basi linearis planum medio dilatatum  
conicatum demum angustatum obtusi <sup>apiculis</sup> ~~apiculis~~ <sup>longitudine</sup> ~~reliquis~~  
<sup>perum</sup> latitudine minor duo interiora oblonga breviora  
basi dilatata <sup>sup</sup> ~~medio~~ <sup>parum</sup> ~~angustior~~ <sup>exterioribus</sup> ~~breviora~~  
labium <sup>patentissimum</sup> ~~angusto~~ <sup>lanicollatum</sup>.

an eadem ac alata Thun



Volucris O. bulbis subrotundis, labio triangulari sagittato Lin. Suppl. p. 403. t. 1. v.  
p. 114

Habitat in C. bono spei v

Caulis pedalis. Folia caulina amplexicaulia, ovata, oblonga  
acuminata nervosa. Spica oblonga multiflora. floribus  
diffantibus. Petalum primum inter sequentia, lanceolatum eratum  
2.3. superiora, exteriora ovata, erecta. 4.5 ovata, concava,  
reflexa, prioribus paulo breviora. Labium minus supra stamina  
ante petalum primum majus obcordatum subpedicellatum  
Lin

Volucris Ophr. Labio exciso ovato, foliis caulem vaginantibus oblongis Thunb  
prodr. pag 2.

non vid.

barbata O. petalis ovatis, nectarii labio indiviso: apice dilatato truncato, supra ad medium barba colorata. Walt. fl. Car. pag. 227.  
Habitat in Carolina

non vidi

caulis phalca & scapo feli feroni vaginato, racemo laxo, nectari labio lineari  
bifido Linn. S. V. p. 114

*Neotkia nectari labio bifido linear Am. Acad. 2. p. 361. t. 4. fig. 24.*

Habitat in Siberia

Caulis palmaris teres, crassitie feli vulgaris. Folia caulina, caule  
amplexora, supra medio etatem patentiuscula limbo erecto,  
obliquo, inferne laxe vaginantis, subnervosa. Racemus longi  
tudine caulis. Flores remoti. Bractea ovata pedunculis duplo  
longioribus. Petala lanceolata patentia, subopercalis. Nectario  
lanceolato, petalis duplo latiore, triplo longiore, bifidoq, lati  
tudine attenuatis rectis. Corolla reflexa Sat. huiusmodi

triphylla O. labello triangulari basi dentato, caule triphylo Thunb  
nondr. pag. 2.  
Habitat in Cap. b. spei

si mea Thunbergii bulbum induratum habet



Ophno

Habitat in Cap. b. spec.

Caulis semipedalis. Folia tria distantia inferum reliquis triplo latior  
et longior ovatum <sup>bipollicinare</sup> secundum ovato lanceolatum vertuum lanceola  
tum omnia serrata nervosa acuminata. Spica bif. tripollicina  
ni flores distantes. Bractea ovato lanceolata acuminata mem  
branacea longitudine germinis. Labium trilobum laciniis equali  
bus rotundatis intermedia tridentata. folia lateralia obovata

~~ex ophryde volucris forte nondum~~ forte & niphylle Thunb

Caffra O. Nectarii labio reniformi latissimo emarginato lin. S. V. p. 814  
Lin. Am. acad. 6. p. 111 n. 96\* Thurb. prodr. pag. 2.

Habitat ad Capite bono spai.

1 Ophrys alani nectarii labio integro undato Lin. Suppl. pag. 405\*  
S. V. pag.

Habitat in Cap. bono spai

Caulis spithameus et ultra. Solia tria primum obsoletum secundum  
ovale lanceolatum, tertium spithiforme speciosa pauciflora: bractea  
ovata acuta. Petalum primum lanceolatum, concavum 2. 3  
latissima subrotunda, longitudine primae. 4 et 5. semiovdato  
acuminata, longitudine eadem. Labium ex ipsa machinula  
genitum, minus ovato lanceolatum undatum Lin. Suppl.

non vidi

inversa O. Labello bifido integro, foliis ensiformibus Thunb. prodr  
pag. 2.

Habitat in Cap. b. 1. per

bicolor O. Labello ex albo bifido, foliis linearibus ensiformibus Thunb  
prod r pag. 2.

Habitat in Cap. b. p. p. v.

Costa Ophrys

Habitat in Cap. bono spei

Caulis perithamowus velut vaginis foliorum. Folia coarctata lanceo-  
lato subulata complicata sesquipollicaris spica tripollicaris  
cylindrica crassa. Bractea ovata acuminata flore parum  
longior & loco parvi. Petalum supremum lanceolatum postica  
in calicem desinens longitudine petali Petala duo exteriora lanceola-  
ta interiora angustiora linearia uti labium omnia fere  
aequalia.

forte ophrys brecler Thun

atrata O. florum cucullo hamini-fero bicorni Mant 121. x. S.V. p. 014

Habitat in Cap. b. p. 4

Caulis palmans, simplex. Folia prope semiamplexicaulia, numero-  
rosa, versus basin latiora, versus apicem longe subulata s. linearia  
Inca terminalis. Flores spithis remoti sub singulis bractea setacea  
longitudine floris. Petala ovata s. lanceolata obtusa. Stamenum  
longitudine petalorum, terminatis corniculis duobus, erectis,  
lineariibus parallelis. Planta tota ex plicatone nigra evadit lin.

atrata O. labello cordato spatulato, foliis lineari & vacis Thunb  
prodr. pag. 2

non vide

2  
1  
Ses. Ophrys nectari labio reniformi subrotundo. caule polyphyllis

Habitatio Cap. b. pai

Caule semipedalis glaber crassitie fere penne columbinae. Folia  
copiosa lanceolato-subulata angusta, sesquipollicaria semum  
plexicaulis erecto patentia, ca noticulata margine plana  
Siccia oblonga bipollicari multiflora. bracteo subulata  
longitudine floris. Petala 5 du 7na exteriora lanceolata aequalia  
duo interiora sem recordata exterioribus majora, aiuta duri  
la basi rotundata, unguiculata ungue brevi. Nectari man  
nula staminum obla ovali bifida quasi ex duobus corporibus  
oblongis attenuatis obtusis ad medium constrictis conflata inter diri  
puras labium nectari sa unguiculatum. lamina subrotunda  
basi pau excisa p<sup>ra</sup> semi unguiculari ungue longitudine  
lamina

eadem abs que dubio cum atrata