

Ophrys

Nidus avis Oph. bulbis fibroso fasciculatis, caule vaginato apophyllo, nectari
labio bifido Lin. R. V. Fl. Dan. tab. 187.

Nidus avis Lob. ic. 195.

Ontho abortiva Jussia Bauh. Pin. 26.

Cyntractis apophyllo, flore inermi, labello bicorni Hall. bot. 1290 t. 37.

Habitat in Svecia, Germania, Gallia Danis nemoribus &

Radices carno cylindrica. Folia nulla. Scapus pedalis vaginatus
vagini bijocliis anibus obtusis. Flores numerosi pedicellati. Bractea
lanceolata longitudine pedicelli. Petala aequalia lanceolata
obtusis. Labium petalis parum longior basi angustior bifidum

Corallorhiza O. bulbis flexuosis, caule vaginato aphylo, Nectarii lobis trifido
lin f. v.

Orobanche radice coralloide Bauh. pin. 80.

Orobanche spumii f. corallorhiza Rup. pin. 284. 72.

Corallorhiza Hall. hist. 1301. tab. 44

Habitat in Europa boreali desertis &

Folia nulla. Scapus ^{ciniter} dorsalis vel pedalis vaginis inferne
~~invenitur super longis~~ tribus vertus infima ovata. Flores
pauci 10 ciniter vix pedicellati. Bracteae minutae ovatae
petala una extensa oblonga in galeam conniventia. uniterio
ra ovata. Erietas penduli

Spurialis O. bulbis aggregatis oblongis, caule subfolioso, floribus spuriali seun-
dis, nectarii labio indiviso crenulato Lin. spec. Syst. V.
Testiculus odoratus Cor. 4c. 106

Orchis spurialis alba odorata Bauhin. hist. 11. p. 769

Orchistastrum autumnale pratense spuriale album odoratum Muhl.
nov. gen. p. 30. Sequ. suppl. pag. 253. tab. P. fig. 9

Eperactis bulbis cylindricis, spica spuriali, labello crenato Hall.
hist. 1294 tab. 40

β. *Triorchis* f. *tediontis alba odorata major* Bauh. pin. 84.

γ. *Orchistastrum officinarum palustre album odoratum* Muhl. gen. 30.
t. 26.

Habitat in Italia, Gallia, Anglia graminosis,

Solia radicalia lanicolata sesquipolliciana crispifolia duo
vel tres in caule vagrantia. Caulis spithameus. Solia planta
insequentis anni oblonga. Spica bipolliciana et ultra. Sili. Bracteae
lanicolata carinata longitudine germis. Petala tria exteriora
in cylindrum conniventia lanicolata. Petala interiora lanicolata
labeum extrosum parum later denticulatus.

Cernua O caule folioso: floribus cernuis nectari labio oblongo integro acuto.

Lin. S. V. p. 213. Spec. pl. pag. 1340 *

Habitat in Virginia, Canada &

Radix fibris crassis plurimis. Folia radicalia, linearia, longa. Caulina vagenantia, brevissima. Spica densa, longa. Flores ante recurvati, cernui.

Corolla parva petalis superioribus confluentibus: labio inferiore oblongo, acuto, integro lina.

Squamata O. bulbi fasciculatis, scapo elongato aphyllis sub
operculato, foliis radicalibus imbricatis oblongis acutis carna-
tis, nectarii labio infido barbato reflexo Tourt prod. p. 59
Habitat

nova vidi

ovata O. bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectaria labio bifido
Lam. 1. 27.

Ophrys Duchf. hist. 565.

Ophrys bifolia Perr. 87.

Euphrasia foliis ovatis, labello bifido Hall. hist. 1291. Tab. 37.

13. Ophrys trifolia Bauh. pin. 87.

Habitat in Europa subhumidis pratis & ^{plandagiis} opposta

Folia duo nervia bipollicaria ovalia parum supra radicem
caulis caudalis pubescens in medio squama ovata acuminata
Spica 4-6 pollicaria flores distantes pedicellati. Stipulo pedicello
breves ovata. Petala extensa oblonga, interna angustiora lan-
ciolata. Labium lineare petalis triplo longior dependens et
semipatum lacinia bifida laciniis linearibus obtusis. Germen
obovatum

repens
plantaginea ophrys caule repente folioso, foliis ovato lanceolatis
petiolati.

Habitat in G^{le} de Franis, Thonin
^{Thonin}

Caulis repens a pedibus inferne foliosus. Folia vero inferiora
minora intermedia pollicaria acuta, Venosa tri vel
quatuor venis simplicibus reticulata. petiolus folio dimi-
dio brevior lineari basi dilatatus membranaceus vaginans
ore obliquo. vagina integra perfoliata. Superne squamis
tribus vel quatuor lanceolatis basi vaginantibus. Spica un-
guiculatae floribus ad duodecim minuti. Bractea ovata ac-
uminata membranacea germine brevior. Calium trilobum?

Cordata O bulbo fibroso, caule bifolio, foliis cordatis Lin. l. V.

Opheys minima Bauh. prod. r. 31. num. 07.

Bifolium minimum Bauh. hist. 3. p. 534.

Euphrasia foliis binis cordatis, Labello bifido postice bidentato Hall.
- hist. n. 1292. Tab. 22. fig. 4

13. *Opheys minima*, floribus purpureo-croceis Mentz. pug. tab. 9. fig. 2.

Habitat in Europa ⁱⁿ frigidis & sylvis humantibus & ^{vela villoso}

Caulis *Spithameus* tener debilis, basi ad radicem squamis duobus
lanceolatis, in medio folii duo angustulanae sessilia opposita
glabra ~~vel~~ ^{vel} flores pedicellati parvi distincti Racemus polli-
cari. Petala tria exteriora oblonga interiora minora linearia
laciniis labii petalae divaricati

bifolia Ophrys labio bifido caule bifolio, foliis ovatis petiolatis.

Habitat in Isle de France Thoirin

Bulbis indivisis oblongis facies Oph. cordato caulis tener fruticulosus.

Folia duo opposita ^{acuta} unguiculata glabra. petiolis brevibus planis.

Flores gemini pedicellati bractea ovata longitudine pedicelli. Labium
pedicellatum bifidum lateribus ovatis acutis divaricatis

Galaxia Ophrys

Habitat in Insula Bobonia

Caulis inferne vaginatus vaginit membranaceis. Folio duo in medio
caulis alterna ovata pollicana cūta basi in vaginam deprentu
purpurea uti caulū. Flores 9. pedicellatis bracteo lanicolato
tenues longitudine pedicelli

malaxoides Ophrys caule bifolio bracteigera
ex Fraxula bobonis

anfractu Verbena foliis oblongis serratis, pinnis terminalibus elongatis, bracteis ovatis aciu-
minatis, ^{peristylis; # semine longioribus} caule fruticoso

Habitat in America meridionali An. V. Rohr &

Rami tetragoni, purpureo-cinereiscentes.

utroque

folia opposita, sesqui pollicaria, oblonga, in petiolum attenuata, apice acuta
^{obtusius} ^{obtusius} serrata, basi integerrima, ad presens villis minutis supra nervo-
sa, subtus nervofo-venosa, ^{retusiora} pallidiora.

Spica terminalis, sesqui pollicaria, ^{vel semipetalis} imbricata. Bractea ovata, semiunguicula-
ris; subbilobata, acuminata longitudo per se ipsius bractea terminata.

Bractei oppositae ~~et~~ alternatim excavatae.

Calyx ^{per unguiculam} bractea brevior in foreola rachidis reconditur; angulatus. Laxa cavata
rachidis obversa convexa altero plano marginata

Stylus calyce duplo longior. Semina lineari triquetra solitaria
parum angulata glabra lassa

Catholica O bulbo fibroso, floribus tripetalis: galea ventricosa magna: labio
cruciato, scapo folioso Lin. P. V. pag. 814. Am. acad. 6. p. 110 n. 947
Orchidei affinis, flore luteo Burt. cont. 3. p. 12. t. 21.

Habitat in Cap. b. p. 4

Cauli pedalis. Folia tria alterna amplexicaulia, lanceolata:
radicalia breviora. Racemus 4. s. 5 florus. Bractea longitudine
corollae. Corollae galea monophylla, ventricosa, magna. Petala
2 lateralibus lanceolata patentibus longitudine galeae. Labellum
parvum lanceolatum sub galea inflexum laciniis lateralibus
patentiformis, ad basin dilatatum utrinque lobo Lin.

peruviana O. bulbis filiformibus, foliis caulinis ovatis petiolatis
sagittatis, nectarii labio integro spica spicati

Plum. in p. 170 tab. 103. fig. 1.

Habitat in America

non vidi

trifolia O. bulbis fasciculatis, foliis radicalibus ovatis, nectarii
labio integro lato subtriangulari Walt. fl. Carol. p. 221.
Habitat in Carolina

non vidi

Lizania