

Orthocarpus Nutt.

~~Erigeron segregatus fistulosus~~

Cal. 3 phyllis. Petala 6. Bacca plures sessiles 23 vel poly
sperma.

trilobatus, Orchidoxarpus foliis ellipticis acutis

Annonia fructu lutescente leri secundum arietis referente Catesb.

Car. l. p. 85. t. 85. Daham. arb. l. p. 56. t. 19.

Annona triloba, foliis lanceolatis, fructibus trifidis. Len.

Habitat in Carolina ♀

Rami teretes, glabri, apice ferrugineo tomentosi, uti folia juniora et
petioli. Corolla et sepallina, utrinque glabra, nervosa. Ovaria
laterales, solitaria, pendula. Calycis lobula pubescentia, uti
pedunculis, ovata.

multiflora Hypp: foliis lato-ovalibus lobatis integerrimis, cymis axillaribus multifloris

La Mart. P. Encl. pag. 107.

Habitat in Cayenna &

non vidi

parvifloro? Orthocarpus foliis obovatis acutis

Habitat in Carolina. Herb. Desfontaini.

Rami teretes, inferne glabri, superne ferrugineo tomentosi.
Folia brevissime petiolata, 3-quadripollicaria, parum acumi-
nata, integerrima, glabra, subtus pallidiora, costa et venis
majoribus tantum ferruginea. Flores laterales, breviter pedunculati,
solitarii, parvi, extra ferrugineo tomentosi. Bacca mag-
nitudine nucis coryli, oblongo vel obovato, mucrone terminata,
et vellis brevibus flavescentibus subtomentosa

monogyne

Habitat in Cap. b. spec. hab. Progenii 5

Bacis Enema vel Stoebe Gnaphalodes. Caulis fruticosus. Rami teretes, aggregato-
 verticillati, purpurascens, villosi-subinervi, foliis imbricatis. Folia via semunqui-
 culana, sessilibus, adpressa, lanceolata, mucrone membranaceo fusco terminata,
 margine ~~villoso~~ ^{oblongo}, intus glabra, concava, ^{prosertum margina} extus villosa. Flores in capitulo globo-
 so triplo majore sessilibus. ~~bracteis~~ ^{bracteis} duo linearis ad basin calycis oppositi
 Calyx 5phyllus, longitudine fere floris: folioli duo paulo inferiori locati: phlo-
 la linearis, concava, dorso piloso villosa, mucrone androscano ^{collostrigilo} spicato. Corolla
 monopetala, infundibuliformi, tubus pilosus, rigidus (ut Peranthemum altum fru-
 tum tubulare refert) limbus quinquepartitus: lacini lanceolati. Anthera 5que
 sessiles in faucibus sagittatis, arcuata. Germen globosum hupidum. Stylus crassus, exsertus,
 brevis, trigonus. Stigma obtuso triangulari. var. Rayn

P
 alter. Rami teretes purpurascens villosi, foliis terti, apice bene quadrifido
 folia sessilibus ~~seu~~ ^{seu} vix semimolliviana imbricatis arcuata, floralia bene
 avana, rigida enervi diata glabra, superiorum margine villosa uti flora
 lia lanceolata hirsuta floris a apice unimorum, congesti in capitulo
 foliis ^{B sessile} interstretis
 novam genus forte Paspri nodis

grandiflorus 3. Orthocarpus foliis cuneato-oblongis utrinque obtusissi-
mi, petalis exterioribus maximis

Annua grandiflora Bartr. id. ver. germ. t. 2.

Habitat in Carolina Bosc. 5

Rami teretes, glabri: ramuli rufi tomentosi. Siliis brevissime pe-
tidata, bipollinari, integerrima, venosa, supra glabra, subtus
pallidiora, venis rufis tomentosis, punctis utrinque villosis tomen-
tosa. Pedunculi terminales, breves, solitarii, uniflori. Calycis fo-
lida oblonga, obtusissima. Petala tria exteriora bipollinaria, polli-
cem lata, obovata, basi striata. Baccæ oblonga.

Senegalensis Hipp. foliis ovatis teriter dentatis, ramulis punctatis, floribus verticil-
latis La Mark. f. Enc. pag. 101
Habitat in Senegal 5

non vidi.

pygmaea Onchidocarpus folius cuneato-lanceolatus

Annua pygmaea Bartr. et ver. germ. p. 21. t. 1.

Habitat in Carolina Borc 5

Caulis sesquipedalis. Rami teretes, glabri, purpurascens.
Folia brevia petiolata, bi- & tripollicaria, utraque integerrima,
apice obtusiuscula, utrinque glabra, venosa. Peduncul
axillares et terminales, solitarii, ^{vel gemini} uniflori. Flores natan
ter. Calycis foliola petalis 4plo breviora, ovata, villosa.
Petalis oblonga, extensa pollicaria, basi striata. Recepta
culum fructus magnitudine pisi. Baccis oblongis, magnitudine
Pisum, mucronato, glabris, 2-3permis.

~~Europa Americae Mediae species 2. p. 21.~~

curthosa Brunnechia Gardn. Defunct. 1. p. 213. t. 45. f. 2.

Habitat in Bahama, in Carolina Bose.

8
Caulis volubilis, striatus, ^{angulatus} glaber. Folia petiolata, alterna, bi-
3. Inipolliconi, ovata, acuta, integerrima, ^{basi subtransversa} of lobis, simpli-
ter venosa. Racemi axillares et terminales, laxi, folis longior.
9 oletarij, ^{unicapitatus} pedicelli ^{pluriales} albari, apice 3-5 flori, flori ferè ternes, bas.
bractea lanceolata, membranacea acuminata ^{terti}, fructiferi
compressi unguiculares: flores pedicellati nutantes, pedicelli
capillares apice ^{superne} articulati

Axiūm

Stamina in fasciculo sive collector secundum Richard
an cytu polyadeptha notius

Refer. inter Aruer inuentur