

Orchis

Orchis calceata longis incurvis herb. Am. Det. Guss.

Setaceo nris Orchis Neitani labio tripartito laciniis filiformibus subaequalibus petalis
tribus ex venisibus lanceolatis oblongis

Habitat in Guinea Thonning?

Bulbi oblongi, indivisi. Culmi pedales, striati. Folia vaginantis, linea
nigra nescitata, 3 pollicaria, sursum sensim minor. Spica spithamea

8 locos frequentes, distantes. Bractea subulata, gemmae parum breves

res. Corolla parva, ^{##} Neitani Calcar Neitani gemmae longior curvatur

Lacinae labii intermediae basi parum angustior, laterales paululum longior.

Petala duo interiora oblonga subfalcata

martiniensis Convolvulus foliis ellipticis, caule repente subvolubili Jacq. Syst. V. pag. 202
Jacq. pl. Amer. Jacq. amer. 26. tab. 17

Conv. martiniensis caule repente, radicante foliis ellipticis Jacq. pl. Amer.
pag. 344.

Habitat in martinis umbosis, inundatis

Caules repentes, glabri, subvolubiles. Folia elliptica, ^{obtusa} mucrone terminata, glabra
bipollicaria. ^{et petioli} Pediculi uniflori, tripollicares, superne lobatissimi. Calycis

lanceolati
oblonga simplici
venosa
petioli brevis & rami

foliola tria exteriora ovata, acuta, ^{venosa} maxima, laevissima; interiora duo multo
minora, lanceolata, acuta. Corolla alba Jacq. l. c.

ad acetosella folio pernotus
cum molli collocata

Ciliaris a radice carnosa, folio reniformi orbiculato labio ciliari lin. suppl.
- p. 405 * S.V. pag. 817

Orchis Burmanniana bulbis indivisis nectari labio multipartito lineari
folio cordato amplexicauli, scapo unifloro lin. Am acad. 6. afr

00. * Spec. pl. pag. 1334

Habitat in Cap. b. p. 2

^{Bulbus villosus oblongo-fusilem}

Caecium unicum radicale cordato-subrotundum pollicare nervosum
amplexicaule villosum uti scapus. Scapus erectus spatulatus

simplex spinosus. Spatha ovata, amplexicaulis acutiuscula
pubescens flori unicus in meo erecta cernuus. Germinum ^{inferum}

petala patentia

villosissimum longitudine petalorum cuneiforme. Petala tria
superiora erectiuscula lanceolata. duo alia interiora longiora
lanceolata attenuata. Nectarium ^{et} postice cornu lunato gemma

breviore. Labium ^{erectum} magnum subtripartitum: lacina media
bifida longitudinaliter in ramentis pubulatis labio maxima, despecta

stamenium columna petalis ^{longior} dimidio brevior. Styli duo feli
formae paralleli, exserti longitudine columnae. Stigmata
oblonga, styli paulo angustiora.

pectinata orchis ~~Thunb.~~ labello multipartito lacinis upullantibus, foliis
orbiculato ciliatis Thunb.
p. 405 * S.V. pag. 817

mascula *O. nectarii* Labio ^{labo}quadriplo crenulato: cornu obtuso, petalis opposi-
tus reflexis Mart. 405. Flor. Jan. 7. 457

Orchis mono mas, foliis maculatis Bauh. Pin. 810. Vaill. Tab. 31.

Fig. 11. 12.

Orchis radicibus subrotundis, petalis linearibus reflexis, Labello
trifido, segmento medio longiori bifido Hall. h. 1203. Tab. 33.

β *Orchis mono* foliis non maculatis flora roseo Scop. p. 225. t. 15. fig. 6

γ *Orchis palmata palustris latifolia* Bauh. pin. 86

δ *Orchis palmata montana altera* Bauh. pin. 86

ε *Orchis palmata palustris maculata* Bauh. pin. 86

Habitat in Europa passim

γ. *Orchis mono* foliis fessilibus maculatis Bauh. Pin

Habitat in Europa lucis

Bulbi magni folia radicalia lato canaliculata super vagina

festulosa foliacea 2 vel 3 inferne in Scapo. Scapus interdum cubitali

Spica elongata. Bractea ^{canaliculata} ovata valde att. germine breviores.

Petala omnia canaliculata. Labium trifidum ^{int} laciniis intermedia

omnes orchideam descr. cum Poll. conferentur et Mart. h. n.

longior, bifida, denticulata. Nectri coram crasum germinibus brevior

ustulata O. nectaris labio quadrifido punctis scabro: cornu obtuso petalis di-
stinctis

Mant. 405. Flor. Dan. tab. 103.

Orchis panonica IV. Pluf. hist. 1. p. 260.

Orchis militaris pratensis sequ. Veron. p. 123. t. 15. fig. 4. Vahl. tab. 32. f. 35-36

Orchis radiceibus subrotundis, petala labello quadrifido punctis scabro, cor-
nu obtusum ped. calicem brevissimo Hall. hist. 1273

Habitat in Europa pratis &

caulis decumbens vel pedalis adpressus foliis 4-5 remotis sesquipollicia-
ribus. Spica cylindrica interdum bipollicaris vel ultra Flores
parvi sere conopsea. Sepala bracteae germine breviores ovata
lanceolata dorso linea purpurea. Petala acuta interiora minus
ra. cornu germine triglo brevior.

color adpressenda in Orchid.

militaris O nectarii labio quinquefido punctis scabro: cornu obtuso: petalis con-
fluentibus hinc - Mart. 409. Jacq. Coll. 2 p. 260. Flor. Aest. t. 307

Cynosorkis latifolia, herba cucullo major Bauh. Pin. Oct. 31. f. 21

Orchis galea, et alii fere cineris Bauh. hist. 2. p. 755.

Orchis radicibus subrotundis, spica conica, labello quadrifido, bracteis
et pedore perangustis Hall. hist. 1277. Tab. 20

Habitat

Orchis militaris varietas f. Linnei Species

Habitat in Europa

Orch. fusca humilior foliis angustioribus, acutis. Spica conferta
conica. Petala acuminata. Lobus lacinae intermediae major
ut varietates hujus Hall. addit

Orchis similem referens Vaill. Mon. 31. fig. 22-26. Sequens f. Veron
Tab. 15. fig. 9

Orchis alteram occidens Cercopithecophora Colum. Ephraf. p. 320

Orchis cercopithecum exprimens Lusitanica altera Breyn.
Cent. 11. p. 42.

Differentia Murrayi praesuma, Orchis Hall. 1275 uti species distincta
addenda

falsa *Orchis nectaris* labio quadrifido laciniis oblongis, cornu brevi, petalis
confluentibus Haerq. fl. Austr. vol. 4. t. 307. Lin. S. V. pag. 009

~~Habitat~~

Orchis magna latis foliis, galea fissis, seu nigricante Bauh. hist.

2. p. 754

+ *Orchis radicibus subrotundis, spica longa labello quadrifido, bracteis
latis angustis, confusis latis sematis* Hall. hist. n. 1276. tab. 31.

+ *Orchis militaris major* Vaill. t. 31. fig. 27. 28. 29.

Orchis militaris varietas de Lin. Spec. pl. pag. 1334

Habitat in Europa australi & e
magnitudine reliquis antecedit, Scapus saepe sesquipedalis vagina
foliacea lata inferne. ^{craspedi digiti} Stipula pluma radicalia elliptica
methamora obtusa. Spica saepe semipedalis. Flores copiosi
inferne remotiores. Bractea parva minuto ovata acuminata
Petala tria externa ovata acuta trinervia intus pallidiora
Labium ~~fratris forte~~ quod magnum pollicare laciniis duobus
lateralibus linearibus intermedio dilatato bifido laciniis
lateralibus oblongis dentatis. Seta subulata inter laciniis
brevissimus. Cornu ⁱⁿ gemmae longitudine dimidii gemmae cras-
sum obtusissimum

variegata Orchis

Cynophrasis militaris praeter seclatior floribus variegatis Bank. pen. 01.
prodr. p. 20.

Orchis militaris praeter seclatior, floribus variegatis Segu. pl. Ser.
2. p. 123. t. 15. fig. 3.

Orchis radicibus fibrotis specia brevissim. Labello breviter
quadrisido circumscinato, punctato. Hall. hist. n. 1275
t. 30

Orchis variegata Gaeyh. coll. 2. p. 267.

Habitat in Austria prope

Orchis
tridentata
All. Scop.

bulbi gemmae subrotundi compressi Scapus erectus pedalis
folia plura inferna approximata striata glauca virentia
3 pollicaria 1. latata. Bractea longitudine gemmae acuminata
tota erecta striata pallide carnea. Spica brevior densa sub
rotunda. Petala omnia in utrumque erectum convergentia
pallide purpureo carnea. 3 externa duplo longiora lanceolata
acuminata. 2 interna lanceolata - linearia hoc uti petalum dorsa
le lineae unius intus atropurpurea, dus in petala 2 externa
labellum. Nectarii cornu subulatum, retusculum gemmae parva
calum paulo brevius. Labium papillae sanguineum reflexum per
pedes lobatus longior purpureo punctatum apice striatum lateralibus oblon
gus inter medius, obtusatis crenatis intermediis 4.

tridentata C. necitane latic lni subquadrisido, spica ovata petalis interonibus
coadunatis bracteis longitudine germinis
Orchis militaris minor Bauh Pin. Repp.
Orchis militaris praetensis elatior, floribus variegatis Legg. Tab. 11. p. 123. Tab. 15.

fig. 3.
Orchis militaris Repp.

Orchis radicibus subrotundis, spica brevissima, labello breviter quadri-
fido circumferato, punctato Hall. bot. n. 1275.

Orchis tridentata Scop. fl. Carn. 1109.

Orchis variegata All. Bot. Ped. 1820.

Habitat in Helvetia, Carniole &

et reliquis orch. militaris differt. Scapo robusto foliis pollicaribus
vobis vaginantibus in caule. Sepalis bracteis lanceolatis. Spica
pollicari. Petala duo interosa lanceolata angusta acuminata.
Labello emarginato floribus multo minoribus. Cornu longitudine
fere germinis

moravica O nectari labio trifido, laciniâ media subrotunda emarginata
amplissima, petalis erectis conniventibus Gaeyh. Collect. 1. p. 61.
Linn. S. V. pag. 809
Habitat

non id:

papilionacea O nectarii labio indiviso ^{crenato} emarginato ampliato: cornu
subulato, petalis conniventibus Lin. spec. pl. pag. S. V. pag. 209

Orchis rubra bulbis indivisis, nectarii labio indiviso, crenulato integro
rotundato, cornu subulato, petalis patulis Jacq. coll. 1. p. 60 S. V.
pag. 209 All. Auct. ad fl. Ped. pag 31. n. 1826

Habitat in Hispania, Italia Austria, Barbaria

Bulbi oblongi. Scapus ^{sub} quadratus vaginatus vaginis purpureis
tibus lanceolatis. Folia radicalia 3-5. Scapo triplo brevioris

lanceolato linearia, latitudine conopsea. Spica 4-6 flora
flore erecti. Bractea purpurea lanceolata germen involvens
longior. Peta 3 exteriora ^{erecta} lanceolato-ovata interioribus longiora

ru. Labium nectarii magnum planum purpureum venis
obscurobus subramosis, denticulato crenatum parum emargi
natum Cornu sub obtusifusculo germine brevius

Orchis orientalis et Lusitania flore maximo papilionem referent
Tournef. Cor herb. Vaill.

rubra huc referatur

pallens O nectari labiis trifido integerrimo, cornu obtuso medio, petalis
patentibus Lin. Manteg. P. V. pag. 109. Jacq. fl. austr. vol. 1. tab. 98.

Onchis bulbosa, floribus flavescentibus Segu. Veron. Tab. P. fig. 3.

Onchis radicibus subrotundis petalis galea lineatis, labello trifido
integerrimo Hall. k. 1201 tab. 30

Habitat in Helvetia Italia alpina. (Hall.)

Folia radicalia acuta interdum pollicibus duo lata inter
dum angustiora. Racemus vaginis duobus vestitus superne
nudus, dorsalis. Spica pauciflora. Bractea sublata
vix longitudine germenis. Petala ^{obovata} lam. ^{supremum} ovatum
lateralia ovato lanceolata obtusa. Labello pubescente
emarginatum. Laciniis lateralibus oblongis

palustris O

Orchis mascula Crana Prop. aust. pag. 500

Orchis palustris Gaëqu coll. 1. pag. 75

Habitat in pratis Austria.

Bulbi indivisi ovati vel subrotundi. Scapus foliosus erectus, teres semipetalis
folia acuta inferne vagrantia & in composita semipetalis junctura
cata. flori saturate purpureus, petala omnia erecta, oblongo ovata
obtusula, duo interna concavata. Nectarii eorum obtusula, per mure
paulo brevius. Labium & fiduciam lacinae laterales rotundate interne
vix minima emarginata Gaëqu.

Orch. vidi

hispidula O culmo aphylo foliis reniformibus Lin S. V. pa Suppl. pag.
401. + S. V. Doug

Habitat in Cap. b. sp. dedit Kunym.

Planta tota hispida, magnitudine *Ophrydis Monarkidis*. Radix
seticulata. Folia duo, radicalia amplexicaulia. Scapus sempiter-
nus, specia secunda: floribus minutis. Petala tria ad interiora calycis
formia, ovata villosa duo interiora linearia, glabra, duplo longio-
ra. Nectarium labium laciniis quinque linearibus. Corolla unius
vum, longitudine floris lin.

Oritis hispida Thunb.

Palmarum vel pamm. ultu

Peucedanum O. *capo folioso*: foliis lato-ovatis, labello quinque partito: Racemus flex

Huohi Lin Suppl. p. 401. x L. V. p. 209

Habitat in Cap. b. hei 2

Racemus magnus multiflorus. Flores magni albi fere

Thunb. prod

1
Congiornis Onk. nectari labio infido subrenulato, cornu longo obtuso
adscendente, petalis conniventibus Pers. it. 2. p. 247
Habitat in Barbana

non vidi

~~Sagenea Cudifia Hort. Kew. t. p. 162.~~

~~Sideroxylon foliis acuminatis dentatis, fructu monopyseno flavo~~

~~Burm. ap. 235. Tab. 82.~~

~~Habitat in Cap. b. p. 5~~

Sentia

Secunda O latillo tripartito & laciniis filiformibus, foliis
ovatis glabris, specia secunda Thuab prodr. pag. 4
Habitat in Cap. b. frei

pecta

Cynanch foliis oblongis glaberrimis ^{lacinis, corollae} nitidis, umbellis axillaribus
pedunculatis, pedunculis capillaribus ^{petiolis} intus apice villosi

Habitat in Cayena von Pook no 157

^{volubili subterrene}
Caulis teris, strigatus, glaber. Folia opposita petiolata ^{ps} qui pollicis
na ~~parva~~ ^{parva} acuminata ^{ps} leviter acuminata, ut utrinque glaber
rima, integerrima ^{ps} nerva nitida, obscure nervosa areola basi
obtusissima ^{ps} ^{ps} pallida ^{ps} simpliciter venos costa
et nervis purpurascens. Petioli purpurascens unguicula
res pedunculi axillares solitarii, petiolo longioris, filiformes
pedicelli ad apicem conferti subumbellati, capillares 3-5. pedun-
culo longioris, basi bracteae minutae. Calycis foliola ovata obtusa
glabra corolla brevior corolla lacinis ovata acuta extus.
glabra intus apice villosi consepimentibus

elata O. nectani labio obcordato denticulato coram Longo pen-
dulo Pers. et 2 p. 240
Habitat in Barbani

non vidi

Solanacea ~~W. the~~ *rozia* Hort. Kew. 1. p. 149 + L'Herit. Jert. Angl. tab. 1.
Habitat in America australi 74

vana O. *nestans* labio ~~not~~ magno bilobo subrotundo

Plum. ii. p. 170. t. 103. fig. 2.

Habitat in America

non vid.

~~ramiflora Samara floribus pentandris~~

~~Rapanea guianensis Aubl. flor. Guian. pag. 121. tab. 46.~~

Catipolea O bulbis rectis, nectari cornu conico: Labio trilobo latera lobis reflexo,
bracteis flore longioribus Lin. Mant. 486. Fl. Dan. 4. 266

Orchis palmata proterensis maculata Bauh. Pin. 89. Vaill. Tab. 30 fig. 14
15. Tab. 31. fig. 1-10

Orchis radicebus palmatis caule fistuloso, bracteis maximis, Labello
trifido serrato, medio segmento obtuso Hal. hist. p. 1279. tab. 32.

β. *Orchis palmata palustris latifolia* Bauh. Pin. 86.

γ. *Orchis palmata montana altera* Bauh. Pin. 86

δ. *Orchis palmata palustris maculata* Bauh. Pin. 86

Habitat in Europa proter. γ

Caulis fistulosus pedalis. Folia quatuor vel quinque in caule vagi
nanti lanceolata valde attenuata fere maculata inferora
palmata. Flores approximata in speciem oblongam. Brai
tea lanceolata valde attenuata pollicaris. Petala duo latera
lia sursum flexa. Tria conniventia omnia lanceolata ovata
labii lacina intermedia subrotunda denticulata. Calcar ger
minibus brevior

Onenta O. nasani cornu gormine brevia, labio indiviso subior
dato crenato, petalis dorsalibus patulis fl. Dan. tab. 076
Habitat in norvegia

non vidi

Polypodium repandum, pinnis lanceolatis elongatis subrepandis, ceteris tribus
confluentibus distinctisve, fructificationibus sparsis
Hemionitis maxima lingua cervina affinis Plum. filii pag. 124.

Tab. 145.

Habitat in montib. Ryan

Stipes cum fronde tri- vel quadripedalis, purpurascens, glaber
nitidus, leviss, altero latere sulco lato striato.

Frons pennata: penna ^{tri} ~~quadri~~ ^{vel} ~~interdum sex~~ ^{vel} ~~juve~~, inferio-
^{vel sex} ~~res~~ ^{proportione} ~~res~~ ^{pinnarum}
res, quatuor inferiori subpinnolatis, basi ~~caudata~~

Sambucina *O. tubris* rectis, nectarii cornu conico: Labio ovato subtrilobo, bracteis
longitudine florum lin. 8. Suec. 803* Jacq. flor. Austr. vol. 2. tab. 108.

Orchis panonica octava Pluf. hist. 1200 26y

Orchis palmata sambuci odore Bauh. pin. 86

β *Orchis radicebus palmatis, bracteis coloratis, labello circum serrato
trilobato, lobo medio emarginato* Hall. hist. n. 1200 ^{β.} Eius eadem
cum incarnata

γ *Orchis palmata, sambuci odore, floribus purpureis* Tournef. F. R. H.

⁴³⁵
Habitat in Europa 4

Caulis pedalis. Folia lanceolata 4. 4 in caule. Bractea lanceola
to latiori quam in reliquis longitudine germinis. Petala tria
exteriora linear lanceolata. Duo interiora parum breviora, obtusa
laciniis laterales labii majori rotundato venticulato. Cornu
crassiusculum obtusum germine brevior
variat corollis pallide flavis et livido purpureis

incarnata O. nectarini cornu conico, labio obscure trilobo serrato, petalis
dorsalibus reflectis Lin. Flor. Suec. 2802. f. 2. V. p.

Onchis palmata lutea, labio floris maculato Segu. suppl. p. 224.
tab. O. fig. 5

Onchis rudicibus palmatis, bracteis coloratis, labello lacinis serrato
trilobato, lobo medio emarginato Hall. hist. n. 1280.

Habitat in Europa.

Similis latifolia, a qua differt. Folis pallide viridibus immaculatis,
nec saturate viridibus maculatis. Caulis dimidio brevior. Bracteis
vix flore aut germine longioribus. Corollis pallide incarnatis; nec
rubris. Petalis duobus dorsalibus totaliter reflectis, nec tantum parti-
tis, nec maculatis; nectarini labrum simile lin.

Specimen herbani Dubium

maculata O bulbis patentibus, nectariis cornu geminibus brevior: lobis
plano, petalis dorsalibus erectis Len. spec. pl. 1^{no} 3 13 35 Mart. 4 87
Latyn. in basilicum foemina Bod. pempt. 240
Onchi palmata, montana maculata Bauh. pin. 85: Vaill. parif. tab. 31.

fig. 9. 10
Onchi radicibus palmatis, caule solido, labello trifido sinato, medio
segmento acuminato Hall. bot. n. 1270

Habitat in Europa praesertim in Italia Canicola remota
Caulis solidus cubitalis saepe. folia duo vel 3 inferne in caule et
duo superne angustiora breviora. plerumque maculata. Spica
angustior quam in macula. Bractea longitudine geminis
Petala 3 extensa erecta duo extensa conniventia. Nectari
labium trifidum, planum: lobis lateralibus majoribus crenatis:
intermedio angustissimo, integerrimo

odoratissima *O. nectarii* cornu recurvo brevior, labio trilobo, foliis
linearibus Lin. Man. 5. v. Mart 487. Paugu. fl. Aust
3. t. 264

Palmata conopkyllata Benth. hert. 2. p. 777.

Orchis palmata angustifolia minor odoratissima Benth.
Basel. p. 24. Segu. Supplem. p. 25. t. P. fig. 6.

*Orchis vidiensis palmatis; flore candida, labello obtuse
trifido, caliculi germine brevior* Hall. Bot.
Strop. no 1274. tab. 29.

Habitat in Helvetia

Ullan ex herb. Desfont.

Taxier Conopsea. Caulis pedalis et ultra. Stolia lanceolata, tri vel
4 pollicaria, superiora remota, breviora. Spica tri pollicaria. Flores
parvi. Bractea lanceolata, longitudine florum.

Coriaceum Cryptosomum

Moutabea Guianensis Aubl. fl. Gu: pag. 879. et 600 Tab. 274.

Habitat in Guiana An v. Rohr,

Rami nigri, erecti, glabri, et fusco flavescens

Folia petiolata, alterna, ^{triad. fol.} ~~sub~~ pollicaria, oblongo lanceolata, ^{capite} basi

versus primum angustiora, subacuminata, acuta vel obtusa
scula, basi ^{sub} ~~oblonga~~, integerrima, coriacea, utroque glaberrima,
obsoleta nervosa, arena, subtus vix flavescens.

Petiol. semper unguiculato, fusci, subtus convexi, supra planius

sculi. Stipula nulla.

Peduncul. ^{ex} axillares, ^{superioribus foliis dimidio} petiolo parum longiores breviores

nanum supra articulo
a ramo decidens

Conopsea O. neitani cornu sedaceo gemmibus longiore. Labio trifido, petalis
duobus patentissimis Lin. Mant. 487. Flor. Dan. Tab. 224
Spec. pl. p. 1336^v *Orchis palmata* minor, calicibus oblongis Bauh. Pin. 85. Waell. porif.
Tab. 30. fig. 8.

Orchis radicebus palmatis, calicibus longisimo, labello trifido
obtusis unicoloris Hall. bot. n. 1287 Tab. 29

β. *Orchis palmata angustifolia* minor Bauh. Pin. 85.

γ. *Orchis palmata pratensis* Martiana Bauh. Pin. 85

Habitat in Europa pratis montosis &

Caulis pedalis. Folia ad basim ad medium arcu-lineariter lanceolata
angusta superne nudus. Spica elongata bis. Tri-pollicari
floribus remouituli. ^{parvi} bracteis subulatis longitudine gemmis
Petala ovata lanceolata. Lacinae latius obtusiuscula ante
gemma lateralis vix simulata. Calicis filiforme recuruum
Gemmibus duplo longior

flava O nectari cornu filiformi longitudine germanis: Calice triplo
integerrimo Len. S. V. p. 810 spec. pl. pag 336
Orbis palmata elegans lutea virginiana cum longis calicibus luteis
monf. her. 1. 3. p. 499.

Habitat in Virginia &

Folia inferiora palmata, lanceolata, magna. Spica angusta; flores
foliis luteis her.

Inaeolens. O. speciosa ovata, floribus semisuperatis, nectarii labes
semiorato bidento, foliis lineantibus Vell. fl. Delph. 2.
pag. 3. Tab. 1. fig. 1

Habitat

~~Lychnis haerens, foliis ovatis, floribus semisuperatis, nectarii labes
semiorato bidento, foliis lineantibus Vell. fl. Delph. 2. pag. 3. Tab. 1. fig. 1~~
michi
ignota

Siparuna

Character Essentialis. Flores masculi et foeminei in eadem umbella.

Mas Calyx quadrifidus. Corolla nulla. Stamina

quatuor adaequam

Foemina Calyx inaequaliter quadrifidus: Corolla laciniis connatis, Corolla nulla. Germen superum. Stylus cylindricus

Bulbus fasciculatus
Sufrescens O nectarii cornu longitudine germinis, labio ovato basi dentato len
S. V. p. 810

Orchis radicibus multis, labello quasi ala^{ta}, calcare germinis longi
tudine Gmel. fib. 1. p. 20. t. 4. fig. 2.

Habitat in Siberia 4

non vidi

Gratium O nectarii labio bilobo intermedio: Com longitudine geminis
Linn. S. V. pag. 810. Flor. Zeyl. 3197

Habitat in Zeylona

Orchidii species, caule ad summum folioso A

Caulis fruticulosus. Folia lanceolata linearia alterna, superiora breviora, quo superiora et longiora. Spica foliosa. Labium superius infidum, inferius obverse cordatum, bilobum. Callicar tenue

na di

Hypobovaea O nectarii cornu longitudine germinis: Labio lineari integerrimo truncato
Len. Mant. 121. * S. V. p. 810 Petrii obs. pag. fasci: 3. pag. 30 Tab. 3.

Habitat in Flandria

Caules vix palmarum. Folia lanceolata longitudine cauli polli-
cana vel ultra Spica ovata. Bractea lineari lanceolata
longitudine florum. Corolla viride lutescentes. Petalum
superum latius ovatum. Labialia duo superiora lanceo-
lata, ad primum conniventia. 2 inferiora oblonga labium
vix petalo longius Len.

gimbrata *O. neebarii* cornu germinibus longior: labio tripartito ciliari, petalis
patentibus, foliis oblongis Hort. kew. 3. p. 297. *

Habitat in Canada

Caulis erectus glaber, ex aenipite acute tetragonus. Folia caulina, non
nulla (3-5) sessilia, acuta, glabra, nervosa cinnata, basi vaginan-
tior, biuncialis. Spica ovata, oblonga, multiflora. Flores corulco
purpureo-fertiles. Bractea lanceolata, nervosa, germinibus paulo
longioribus. Petala plana aequalia trilincaria. Supremum ovatum
obtusum, erecta. 2 exteriora ovata acuta patentissima, duo interio-
ra oblonga obtusa, juxta petalum dorsale erecta, infra medium
dilatata, ibique denticulata, basi attenuata. Lacina labii lata
cuneiformes aequalis, plana in medium subdivisa in cilia subu-
lata. laterales divaricatae; intermedia patens. Germen mun-
diale H. kew.

abotiva 0 bulbis scilicet nectarii labio ovato integerrimo, caule aphyllis
Lin

Jacqu. fl. Austr. vol. 2. t. 193.

Pseudolimonodorum australe Clus. hist. 1. p. 270

Erythraea aphylla, calice longo, lobello ovato lanicolato Hall. herb
n. 1280. tab

Habitat in Gallia, Helvetia, Anglia, Italia sylvis umbris &

Solia nulla. Caulis cubitalis vaginatus violaceus vel ligneus.

Flores remoti. Bractea longitudine geminis. Omnis omnium

superiora majores, Inquetri. Petala petalum supremum ovato
conciliata, duo reliqua exteriora angustiora. Petala interiora
minora. Calicis cornu longitudine geminis

Sancta O. nectaris lobis lanceolatis quinque dentato: cornei incurvo, petalis
conniventibus lin. l. f. pag. 807. Cuius Spec. pl. 1330 +

Habitat in Palottina

Caulis pedalis maximam partem nudus, superne vestitus foliis
alberrimis foliis acuto. Racemus laxus. Bracteis lanceolatis, longi-
tudine germinis. Petala acuminata tria, confluentia in galeam
oblongam apice distincta. Dentes intermedii lobis per se
longioribus lin.

Folia radicalia oblonga, vix pollicaria, obtusa. Siquis spithameus
tractus vaginis arduis lanceolatis. Flores distantes patentes. Bracteis
lobis squamis caulinis. Nectarium subulatum curvum, longitudine germi-
nis. Petala suprema lanceolata, acuta: labrum trifidum: lacina ^{quae can-} lateralis
vix lanceolata: lateralia tridentata, dentes inaequales herb. Desfont. Billar
dicere habent

Psycodes O. ^{*Bulbis cognatis*} *nectarii* cornu petalaeo longitudine germinis. Labio tripartito

Ciliato Lin. l. v. pag. 811. Spec. pl. pag. 9337 +

OT ~~his~~ *nectarii* cornu petalaeo floribus aureis, spica habitore congestis,
bracteis longitudine floris, labio inferiore nectarii, fimbriato capilla-
ceo Gron. Voy. 1. p. 104.

Habitat in Canada

Habitus O. maculato. Caulis foliis lineari acuminatis parvis
spica longa densa. Petala tria externa ovata, duo interna
oblonga, pubescentia. Labium reflexum: laciniis basi angustis
fimbriatis, canaliculatis apice ciliatis Lin

Psectabilis O. nectaria cornu longitudine geminis: labio ovali emarginato,
caule aphyllo, foliis ovalibus Len. Spec. pl. pag 1337 + P. V. pag 211.
Orchis foliis radicalibus binis ovalibus, galea tripetala, nectaria labio
ovato integerrimo Gron. Voy. 136.

Habitat in Virginia

Folia radicalia bina, petiolata, obtusa, longitudine fere plantae.
Scapus s. Siliqua: Bractea lanceolata ovales, longitudine ger-
minis. Florum petala 2 exteriora patula, viridia; tertia concavitate
venosiora. Labium ovale emarginatum: apicibus divaricatis
Len.

Lyuloides *O. nectarii* labio tripartito linearis subaequali cornu filiformi
Longisimo Lin. Suppl. p. 401. S. V. p. 811

Habitat in Hamptshathu

Folia radicalia lanceolata-ovata, petiolata. Capus apiculatus in medio folio parvo, lanceolato. Flores in pila oblonga alterni. Labium superius triphyllum, ovatum. in medio longiore inferius paulo longius laciniis linearibus. Cornu petalis sexies longiore. Lin.

non vidi

japonica O nectarium Cornu recurvo, labio subulato integro Thunb fl. jap.
pag. 26.

Habitat in Japonia

Caulis subangulatus, glaber, fistulosus. Folia semiamplexicaulia, lan-
ceolata, subcarnata, glabra internodiata, cincta sex superiora
breviora angustiora. Flores spicati nivesi plurimi. Petalum dorsa-
le ovatum, concavum erectum integrum. Lateralia duo subtrangu-
lana concava dependantia, magnitudine superioris. Petala interiora
lanceolata erecta conniventia. Labellum cylindricum parum
attenuatum, dependens unguiculare. Cornu gemmae triplo longior
Gemma concava. Thunb.

non vidi.

Aphylla O. Neesii labio trifido, floribus secundis scapo squamoso
Orchis aphylla; ~~racemosa secundis. Flores campanula~~ Forst. descr.
p. 157.

Folia nulla Forst. Bases Ophr. spicatis

Scapus ^{cum spica} pithamorus tres lori. squamis sparsi ovati **acuminatis adpres-**
si, fello ferrugineis

Spica longitudine dimidii scapi. Flores alterni distincti patentiusculi.

Bractea ovata acuminata germine brevius.

Petalum supremum oblongum duo linearibus subulata reliquis longius
labium laciniis rotundatis corne subulato & recurvo longitudine
vix germine

vindi O. scapo ramoso, floribus vindiis nectariis labiis indivis
papuloso Tork. fl. Aeg. p. 156

Habitat in arabia

Stem striata nervosa

Habitat in arabia

muscosum Polypodium frondibus inferne tri-supernae bipinnatifidis: pinnulis lanceo-
latis serratis acutis ciliatis, stipite peloso.

Folia hermodensis elegans ramosa, pinnis rarioribus profunde dentatis

Fructu rariorem inasens, cauleculis muscosa lanugine referti

Plum. alm. 1857. Tab. 244. Fig. 2.

Habitat in Montserrat de Ryan.

Stipites plures, infra foras pedales et ultra, crassitie feli emproctii
altero latere striati, pilosi, basi et inter foliola e pilis longis patentis

frons mollibus ^{13-14 long} ~~superfici~~

altiorum

Frondes pedales. Foliola petiolata, ultima decurrentia, infima ^{ma} ~~opposita~~
^{reliqua} ^{altiorum} ~~superiora~~ bipinnatifida, extropia pinnata apice pin-

natifida, sequentia pinnata ^{ultima} ~~suprema~~ serrata ^{incisa} ~~incisa~~; pinnis

lanceolatis ^{in pinnis} ~~in folioli~~ secundariis ^{longioribus} ~~basis~~ ^{acuta} ~~in pinnis~~ ^{reliqua} ~~reliqua~~

vase ciliato. ^{omnes} ~~omnes~~ acuto, tenero, venis simpliciter ^{re motu} ~~ramosis~~

Puncta fructificanti Duplici serie in singula pinnula, distan-

cia. Squamae ^{nulle} ~~nulle~~ Polypod. Fructu longe alia est

(Figura Plum: cum Pol: Fructu ind. Onest haec fructi convenit, melius
vero cum definito, ideoque haec retuli squamae nulle)

Flava O. bulbis indivisis nectarii labio subrotundo indiviso, foliis ensiformibus
ex nervosis radicalibus

Orchis flava; bulbis indivisi, ovato-oblongis; nectarii labio subrotun-
do, integro dorso. descr. pag. 157

Folia radicalia ensiformia altitudine scopi, ensiformia, basi complurata
nervosa, ^{nervata} nervis tribus elevatis reliquis majoribus, glabra pluri-
scapus cubitalis striatus

Flores racemosi a medio scopi, nutantes, remoti. Bractea ova-
ta acuta patens vix semiunguiculari. Pedicelli cum
germine sesqui pollicares

Petala oblonga, patentia, supremum latius
nectarii cornu brevi bilineari obtuso

an Khatou - Kayda Marawan Pheed Mat 12. p. 51. t. 26

pedicellata Onchis Nestani latio quadrifido laciniis linearibus, germine bus pedi-
cellatis longitudine corni, foliis radicalibus ovato geminis

Habitat in Insula Francis Thoin

Folia radicalia, duo, ovata acuminata, bipollicaria, pollicem lata
amp. laticaulia. Scapus semipedalis in medio foliolo cincto ungui-
culari vaginante. Spica teres rara & flora. Bractea lanceolata
semunguiculari acuminata patulo, longitudine pedicelli. Petalum
supremum oblongum reliquis latius lateralia oblonga interiora
minora. Labium trilob. trifidum petalis triplo longior laciniis inter-
medea bifida hinc quadrifida laciniis omnes lineares angustae
obtusae. Nectarii cornu filiforme rectum pollicare. Germen
pollicare pedicellatum pedicello longitudine pedicelli

an bulbis fasciculatis vel solitariis

3. Neibani labio lacinolato integro medio undulato petalum supremum ov-
subrotundum lateralibus ovato lacinolata, interiora minora

Longifolia
angusta

Orchis neitani labio una lanciolato indiviso, cornu geminibus breviori

foliis subulatis elongatis

Habitat in America & Madagascari

Caulis sesquipedalis striatus teres, &

folia 5-6 basi vaginantis, glabra complicata inferiora longitu-

dine spae caulis superiora

specia cylindrica bipollicaris. Bractea lanciolato subulato

longitudine floris. Petalum supremum subrotundum erectum

duo lateralia exteriora pedentia ovatus inferne gibba. duo reli-

quis parum longiora. disci interiora oblonga minor. Labium lancio-

latum obtusum basi undulatum longitudine petalorum. Cornu sub-

lato recto

subbi ignoti

vindiflora. Oakes

Habitat in Brasilia

Caulis palmariis foliis vaginatus. Folia lanceolata complicata 5-6
in caule. Spica brevis oblonga obtusa. Bractea lato lanceola
ta longitudine floris. Flores parvi

gigantea Ontis neclani labio trilobis cornu longitudine germinis scapo
nudo foliis nervosis

Habitat in Insula Bourbonia.

Folia ad basin caulis lanceolata elliptica, spithamoa acumina
ta basi acuta in petiolum amplexicauo saepe in desinen
tia nervi pollicis binos lata nervi 7 elevatis. Scapus byie
dalis crassitie panno asperino superne foliolo unciali obtuso
Flores pauci inferiores remotissimi nudatis subpedicellati
Bractea longitudine germinis. Petala ovata lanceolata acuta
lobi labii rotundati dentati lati. Cornu obtuso
affinis flavo for Kälör.

Voinea Inhis

Habitat in Florida

Caulis vix perithamnos. Folia 5-6 in caule inferiora ovata lato lanceo-
ta vix serrata, superiora angustiora sessilia. Spica cylindrica sesqui-
pollicaris. Bractea lanceolata longitudine floris.

sesquipollicaris

Corolla adhuc describenda.

Falcata O. Cornu liliiformi longissimo, foliis ensiformi canaliculatis
falcatis Thunb. fl. jap. p. 26

Habitat in Japonia

Folia radicalia plura, equitanta ensiformia, convoluta, revoluta
falcata, glabra, digitalia inferioribus brevioribus. Scapus erectus
glaber foliis brevior. Flores spicati. Nectarii cornu curvum pollicis
re Thunb.

batrachites O. nectani cornu brevissimis, latro rufido intermedia
 brevissima lateralibus longis linearibus; bracteis flore paulo
 longioribus Schrank's bayrische Reise pag. 96
 Habitat in Bavaria

non vid.

non videtur *batrachites* nectani Schrank's bayrische Reise pag. 96
~~latro rufido intermedia brevissima lateralibus longis linearibus; bracteis flore paulo longioribus~~
 non videtur *batrachites* nectani Schrank's bayrische Reise pag. 96
 non videtur *batrachites* nectani Schrank's bayrische Reise pag. 96

punctulatum Polypodium frondibus pennatis: pinnis alternis subpetiolatis Canaliculatis
 serratis ^{basi obliqua} (marginibus punctatis, fructificationibus solitariis
 lingua cervice dentata, punctulis, nervis notata Plum. fil. pag. 746.

112.

Habitat in Montserrat in Ryan.

Speci cum fronde 4. 5 pedali, femitero; supra sulco excavato, subretusis
 ^{omnia distincta}

foliolo
 supremo
 truncato
 cuneato

frons pennata, 5. 2 pinnis. Foliola alterna, ^{omnia distincta} periana remota, subpetiolata,
 intermedia 4. 5 pollicaria, inferiora et superiora sensim minoria, can-
 celata, ^{venata} acuminata, serrata, basi ^{venata} superius obliqua, deorsum rotun-

dat
 a cordato puncto
 ad marginem
 st. p. ite glabra
 nec villosa

data, nervo tenuissimo striata, nervi alteri ^{alteri} nervi ^{alteri} singuli apice
 puncta nigro terminali, alterni simplices, pinnim breviori
 macula fusca faciente terminati, subtus costa villosa.

Fructificationes in simplice fere et naque versus marginem.

Cum figura Plumieri optima convenit nisi quod serraturae in Plum.
 profundiori et dentes majores quam in meo. A Pol. femicordato
 var. dignoscitur, punctis ad marginem, conspicui profertim silice
 obestitur, a simile et dissimile dignoscitur foliulis subpetio-
 latis nec decurrentibus

no 112
 18012

Iguona orbiculata altero margini raris subreniformi

anastata O. nectarii labio petalisque lateralibus anastati nectarii
Galea cucullata.

Habitat in caput. B. Spei

Caulis apophyllus & vaginatus. Bractea lanceolata attenuata
longitudine germini
to colorato. Spica pauciflora. Nectarii galea fere
nectarii aquilegiae longitudine germinis

articulatum Polypodium frondibus lanceolatis lucidis, fructificationibus parvis, furculis
repentibus hispida, stipitibus articulati
Lingua serena lucida, pedicellis articulati Plum. fil. p. 110. Tab. 136.

Habitat in Montserrat in Hyar
furculi repentes, conspiciuntur ^{panum} undique texti setis subulatis, porrophytis
suffragantibus, patentibus.

Stipites erecti, remoti, 5-6 pollicares, glabri, substriati, inferne versus
uniarticulati, geniculis nodos.

Frondes pedales, pollicem vel ultra ^{panum} latas, lanceolatas, apice obtuso
vel acuto, basi attenuato, per 1/2 partem ^{panum} decurrentes, trans versus
subtlesione confectum nervo ^{panum} nervi simplicis; marginato: margini
venis, ^{panum} panum inaequali, dilute colorato.

Fructificationes parvae, numerose parvae, squama reniformi texta
totam fructificationem ^{panum} Hyar.