

Onhis 2

x x x

Onho

Habitat in insula franco Herb. Thauri

Folia radicalia, in petiolum attenuata, spithamea, pollices duos ad tres lata
nervosa, glabra. Scapus sesquipedalis, erectus, superne folio uno alterove lan-
ceolato, uti bractea, semi pollicare. Germen bractea longior. Calicis subula-
tum, germine brevius.

acuminata Onkii

Habitat.

Herb. Desfont.

Bulbi oblongi. Caulis semipedalis. Folia inferius, confertis, bipollicaria, oblonga, obtusa. Spica bipollicaris, oblonga. Petala attenuata

patens Orcho

Habitat

Herb Desfont.

Caulis prostratus. Folia lanceolata, inferna saepe apollitana. Flores
pauci, d. stantes. Bractea longitudo geminae. Nectarium breve conicum
obtusum: Labium trifidum: lacina intermedia subtrifida: lobis divaricatis

Condensata Onho

Habitat Herb Desfont.

Caulis sesquipedalis. Folia lanceolata, spithamea. Spica oblonga,
bipollicaris. Stems conferti.

barbata Ontio

Habitat

herb. Desfont

Caulis pedalis. Folia lato-lanceolata, 3-4 pollicaria, serrata-serrata minuscula,
frequentia. Bractea lanceolata, geminis brevioribus. Calicis longissimum puberulum.
Lobum ciliato-lacinatum. Bulbi carnosissimi, oblongi raphaniformes

Aurea Onchis

Habitat in Carolina Lich-Desfont.

Radix ^{licis} bulbosa bulbi oblongi. Caulis pedalis, erectus. Folia D-Hantia, byol
liana, ~~san~~ pinnis minoribus, lanceolatis. Spica oblonga, pedicellata. Bractea
lanceolata, longitudine germinis. Calicis ~~sp.~~ sififorme, germinis brevius: Labi
um ~~an~~ aurea, ciliato-laciniatum

barbigena Onchis bulbis indivisi, foliis subrotundis reniformibus, scapo squamoso, nec
tanti cornu spirali, floribus secundis
Habitat herb. Rayeni an cap. b. p. m.

Bulbi oblongi - Scapus semipedalis, pilosus pilulis, squamis remota lanceolata
viti bracteo attenuata, longitudine geminis - Spica 3-4 pollicibus. Calicis
longitudine geminis, spiritaliter recurvato - Petala apice inflexa divisa.

Onchis

Habitat in antillis herb Surinam. no 856. apud Huf.

Caulis crispitè pennis anserinis, purpureo maculatus, foliosus. Folia byzanti-
cana, ovata, serrantia, sul septem nervia, nervis alba cincta, acuta: flori-
bus frequentibus, lanceolatis, germine breviorum. Specie palmanis, flores approxi-
mati. Nestani comu filiformi recta, germine longiori
vires foliis ovato-lanceolatis

monophylla Orchis

Habitat in Anpula Bortonia Commeson herb. Grif.

Radix oblonga, indivisa. Stola radicalis, solitaria, vel gemina, elliptica
longitudine scapi. Scapus pedalis, glabra. Scapus nudus, superne flores
5-6. Neptunia labium equaliter quadripartitum, Corne germine brevior
alend. specimen folio tantum bi pollicibus. Folium vaginans in medio
caulis. Germena sesqui pollicaria. Neptunia cornu pollicare. Bractea lanata
late germine duplo brevior

Orchis

Habitat in insula Borbonia Commesor herb. Prof.

Bulbi defunt. Caulis sesqui-pedalis, glaber, crassitie fere pennis cygneis
inferne vaginis tectus. Folia superne, elliptico-lanceolata, attenuata
palmata, nervosa. Bractea lanceolata, germine brevior. Ovaria distan-
tes. Germen oblongum, pinnellatum, glabrum. Cornu nectarii longitudo-
ne germine, extrosum sensim crassior

Onchis

Habitat in Canada herb. Guss.

Bulbi palmati. Folia duo radicalia, palmata, subrotunda sessilia, glabra, multivenosa. Scapus pedalis, crassitie penne anserinae, subtilissime striatus, nudus glaber. Cordistans. Bracteae lanceolatae, longitudine geminis. Calcar subulatum, longitudine geminis. Labium corollae curvatum. Flores unites 12. Patria Canada in herb. Guss: an erronee, adjectum erat falsis forte. Onchis bifolia latifolia Bauh. pin.

Onchis

Habitat in Madagascar Commesf. herb. Tuss.

Bulbi ignoti. Folia linearia, infima saepe pedalia: caulina pauca, remota, sesqui-
breviora. Caulis sesqui-pedalis. Spica longa, spithamea. Germine oblongo, ungui-
culano. Bractea subulata, germine parum brevior. Calcar germine bre-
vius.

Onhis

Habitat in Canada herb. Jusf.

Bulbi fibrosi? Folia duo radicalia, palmaria subrotunda, multinervia. Scapulis pedalis, erectus, glaber, nudus, nitidus. Flores distantes, plures, patentissimi, cana.

8 Lines habeo No 1

Longicaule vnto Orihi.

Habitat in Madagafcar Commaron herb. huj.

Radix solitana, oblonga. Folia radicalia, elliptica, spithamou, glabra, acuta.
Scapus nudus, pedalis, crassitie pennis aspernis. Bractea lanceolata, semper
lucida, lanceolata. Germen bractea duplo longior. Calicis corolla cylindri-
cus, pollicaris: Labium trifidum lacina altera profundior, ^{lineans} altera lineans
lacinae duo oblongae, aequales.

Orchis

Orchis canadensis, foliis lato-oblongis.
Habitat in Canada herb. Mus.

habeo

Onhis

Onhis canadensis, Ludia raphaniformis

Habitat in Canada

habes

calcarata O. nectarii labio. septem calcarata? Cornu longissimum
Walt. fl. Par. pag 220
Habitat in Carolina

non red.

Cynanchum denticulatum, foliis cordatis oblongis acuminatis denticulatis, pedun-
culis subtriplicis, petalo lanceolato plano, caule hirsuto.

Habitat in Guiana non hinc.

Caulis volubili, teres, crassitie fidei empiricis, et vix hirsutus.

Folia petiolata, opposita, sesqui pollicaria, cordata, auriculis
retundatis oblonga, acuminata, acumina integerrima, denticula-
ta, subciliata, glaberrima, excepto in venis et costa, tenera

Sufanno O. nectaris alis amplioribus ciliatis Lin. l. V. pag. 207. Thunb. fl. jap. p. 257.

Orchis amboinensis, floribus albis fimbriatis Herm. parad. 209. t. 209

Flor. Sufanno Rumph. Amp. 5. p. 2. Pl. t. 207. fig. 2.

Habitat in Amboina & Japonia

Caulis fere striatus, foliis vaginatus pithamosi vel ultra. Solia vagi-
nantia, coriformia, canaliculata, striata glabra, erecta patentia

Caulem subaequantia, cunctis quinque. Flores tres per se florentes

Bractea lanceolata, acuminata, germine breviora. Petala tria

exteriora ovata, acuminata, concava, striata unguiculata.

Basilla Petala interiora nivea aequalia erecta convergentia

interioribus longiora. Labium tripartitum lacinis laterales dilata-
ta, ciliata, unguiculata, intermedia lanceolata integra, vix lineam
lata. Nectaris cornu cylindricum germine duplo longior Thunb.

non vidi

monorthiza O. nectani labio tripartito lacinialibus lanceolatis
cornu laciniae compresso longitudine germinis caula filipes

Orthis monorthiza

Sw. prodr. pag. 180.

Habitat in jamaica

Caulis sesquipedalis folia lanceolata breviter
longitudine germinis

~~Ononis
pseudocypri~~ *Gadigifera* foliis pennatis quinatis obcordatis subtus inanis, Spicis axillaribus ovatis

~~Caulis fruticoso~~

~~Habitat in C. bono spicis~~

~~Caulis teres erectus seu ramosus superne inanis. Folia sunt unguiculata subsessilia~~

~~Foliola mucronata, supra glaberrima, subtus pubescentia, approximata ut fere digitata~~

~~sessilia, mucrone reflexo. Pedunculus bipollicaris apice glomeratus~~

~~inanis. Flores subsessiles in ^{illis} semi inanis. ^{pubes} Solo flore extus pubescente~~

~~Taxis Ind. filif. ex hujus varietas~~

~~est forte Ononis mauritanica Lin.~~

punctulata O. petalis lateralibus sedacis nectaris longitudine germens
Specia multiflora foliis superioribus ovatis
Habitat in Barbados madfello

hirsutum *Quercus hirsutum*, foliis oblongis ^{cordatis} basi sine apertis
laciniis corollae rotundatis

Habitat in insula Trinaculi Non Pehr no 92

Tota planta hirsuta excepta corolla, pilis flavescenti-
bus hirsuta. Rami teretes. Folia petiolata, opposita oblonga
anteriore acuminata basi terminata basi versus angustius
sa supra dilatata supra simpliciter venosa subtus
venosa venis ramiformibus, basi sine excisa lobis rotun-
datis dispersantibus tri vel quadrinerviatis Petiolo
fere pollicari. Lobula calycis ovata acuta corollae
porum longiora tenuis sine nervosa. Corollae glabra
laciniis rotundatis planis.

bicolor O. nectani labium trifidum lacinus linearibus nectani
cornu subulato germine longiore clavato
Habitat in agri oryzaeici Andis Rothler mense Decem-
bri et Januarii florens.

Bubbi solitarii indur. Labii lacinae aequales potentes
galea corni vena brevis et curva. Petala lateralia patentes
sumo reflexa obliqua, oblonga striata. florens
vindex nectani cornu albicans Rothler

Oppositum Polypodium fronda ^{subbipinnata} bipinnatifida, ^{folioli} pinnis oppositis lanceolatis inferioribus abbe-
vatis remotis: lobi obtusi ^{in agris} ^{sepius} pubescente
Conchiti pinnulis rotundis non dentatis Plum. fel. pag. 36 tab. 47.

Habitat in montserrat in Ryan. inferna glaber
Stipites cum fronda bipinnata, pubescentia, supra sulcatus.

Frondes subbipinnata, 41. perg.: foliola simplicia, opposita, distantia, interme-
dia quoad pollicem aequa, superiora et inferiora ^{senpiti} minora, infima emota
omnia lanceolata, glabra, attenuata, nervis simpliciter ramosis,

infima ~~vel~~ unguiculata
vel minora basi
incisa

pinnatifida: lobi oblongi, latere interiori ~~conditi~~ ^{obtusati}, exteriori recti, inte-
gerrimi, apicem sepius evanescente, latius interiori reliquis parum
longius ^{longioribus} nervium, distincta

(Si Plumieri planta ^{sepius} ^{pluribus} ^{multis} ^{marginibus} ^{acanthoribus} ^{hinc} ^{non} ^{pertinet}, certe proximus est, lobis foliorum
basi protamnis parum majoribus in Plumieri, quam in nostra
a Pol. tetragono Swartzii differit Stipite non tetragono

ad polypod. patens accedit at in specimen ovis
amici ovis in specimen videtis foliola subtus et costa
super pubescentia nervi Spuma oblonga uniformis a nervi
nervo divisa in costa non umbilicat

Polyp. n: D. Ryan

de

*Distichis
longifolia*

O. petalis lateralibus petalis nectari cornu clara
to, foliis lanceolatis distichis
Habitat in Insula Bourbonis

Siparuna

Character Essentialis. Flores masculini et feminei in eadem umbella
mas. Calyx quadrifidus. Corolla nulla. Stamina

resupinata O. bulbo indiviso, nectarii calice lineari e longato indiviso, ^{resupinato} nec cornu gemi-
nibus brevior, foliis geminis radicalibus petiolatis:

Habitat in Insula Bourbon

Bulbus pollicis
si tomatope
longus puber
adnatus
folia radicalia oblonga utrinque acuta mucronata longipollitana
Scapus semipedalis filiformis, squamis tubis remotis ovato attenuatis
ungueularibus. Spica ^{parva} pauci flora 13 flora. Flores remoti usuli
Bractea ovata, acuminata gemine ^{ovato-oblonga} triplo brevior. Petalum supremum
subrotundum, lateralibus duobus ^{ovato-oblonga} minoribus lanceolatis, interioribus
petala duo lateralibus longiora angusta obtusa versus basin parum
longa, interiora ^{ovato-oblonga} breviora angusta obtusa versus basin parum
minora ~~latiora undulata~~ Cornu gemine duplo brevior

petala adhuc examinanda

^{hura}
monorthis Onchis Neclaii labio quadrifido lacinis setaceis, cornu apiculato

Petalum supremum ovatum duo exteriora ovata baccolata, interiora
subulata medio parum latiora. Labii lacinae subaeuales. cornu
subulatum extus crispum inaequaliter, acuta, gemine longior

habenano O. nectarii labio tripartito. Lateralibus staccis. Cornu filiformi
petalis decuplo longiore Lin. acn. Acad S. p. 408. + LV.

Satyrium erectum, foliis oblongis, petiolis vaginatis amplexicaulis,
spica terminali, nectariis longissimis Brown. Journ. 324

Habitat in Tamasca 4

Caulis pedalis. Folia ovato-lanceolata, 10 vel ultra, sensim minora
Bractea ovata, acuminata gemminibus brevior. Germena polli-
cariosa. Petala tria superiora conniventia, subrenata; lateralia
duo ^{ovata} oblonga patula. Labium tripartitum laciniis filiformibus
intermedia duplo brevior. Cornu filiforme petali 10 plo longior

setaceo
~~monochloa~~

Orchis bulbo solitari indiviso, nectari labio tripartito: lateralibus setaceis,
cornu lineari compresso germinis longitudine ^{spans} ~~longitudine~~ ^{varineto} ~~longitudine~~ folio angusto
Salyanum + Brown. Jan. 7

Bulbus oblongus magnitudine Cory

Orchis setacea Jacq. Amer. pag. 220

Habitata Jamaica, Hispaniola &

Bulbus oblongus magnitudine Coryli. Caulis pedalis tener inferne vestitus
squamis vaginatis apice ovatis. Folia inferiora et suprema minima
lanceolata intermedia tripolliciana ut lanceolata angusta
utrinque attenuata. Spica pauciflora 12 flora, flores retroctum
scili. Bractea subulata germine breviora. Petalum supremum
ovatum erectum duo latera ovata lanceolata patentia, interiora
setaceo medio parum dilatata. Lacinia labii subaequalis. Coracum
extrorsum parum incrassatum, acutum.

Ciliari O. nectarii lobis lanceolato ciliato: cornu longissimo. Gronov. Varg. 136.

S. V. pag.

Orchis marilandica grandis et procera, floribus luteis calicane longissimo.
lobulo fimbriato Raf. suppl. p. 508.

Orchis palmata elegans lutea americana, cum longis calicibus luteis
Monj. hist. 3. p. 499

Habitat in Virginia Canada &

Caulis sesquipedalis glaber. Folia amplexicaulia distantia lanceola
que inferiora latiora longiora sensim minoras & q. in caule.
Spica oblonga sesquipollicaris flores distincti: bractea lanceola
q. longitudine germis. Petala tria externa subrotunda integerrime
supremum arcuatum concavum duo interiora linearia breviora
natum breviora apice ciliata labium ovato lanceolatum reliquis
duplo longius. Cochlear germibus longus

bifolia O. nectaris labio lanceolato integerrimo: cornu longissimo, petalis patentibus
L. V. pag 808 Mart. 404 Pl. Dan. tab 35

Testiculi species v. Cam. Epit. 625.

2 Orchis radicibus oblongis, labello lineari Hall. hist. n. 1283 tab. 35.

1 Orchis alba bifolia, calicem longo Bauh. Pin. 83. Vaill. 8. 30 fig. 7
1744. Gron. Hab. 16. fig. 10

Habitat in
β. Orchis trifolia minor Bauh. Pin. 83.

γ. Orchis bifolia altera Bauh. Pin. 82.

Orchis bifolia latissima Bauh. Pin. 82.

Habitat in Europa paucis &

loco 3 pollicis lata obtusifolia
Bulbi oblongi. Folia duo elliptica inferne in caule. Caulis
nullo nisi squama lanceolata, obtuso glabra pollicares. Spica
sepe palmari et ultra. 13 flores distincti ^{albi} bracteis lanceolato
longitudine fere germinis. Petala patentissima ovato lanceolata
supra ^{latius erectum} duo internam angustiora supra columnam ^{stria extensa} pumiceam convergentia

cabum lineare indivisum. Calicem gemine duplo longior

Ornithus O nactaria labio subrotundo, cornu germine duplo longiori, petalis tribus
exterioribus conniventibus, reliquis patentissimis Jacq. fl. Austr. vol. 2.
Tab. 138. f. V. pag. 808.

Habitat.

margo labii, cornu feliiforme

flexuosa O. Medani labio imbricato: petalis duobus occultatis filiformibus
capo flexuoso hinc Am 6 pag. 100. n. 09. * P.V

et habitat in C. b. spei

Folia radicalia ovata. Scapus pedalis. Folia ad remota
vaginantia lanceolata parva. Flores parvi remoti. Petala 2
filiformia. Labellum imbricato-umbellatum l.

non vidi

Cata O. neitani labro castreo revolutis, cornu sublongo tenui
Walt. fl. Carol. pag. 220.
Habitat in Carolina

non vidi

Denticulatum Cynanchum foliis ^{flagittatis} cordatis oblongis, acuminato denticulatis, umbellis
pedunculis unifloris, petalis lanceolatis planis, caule hirsuto.

Habitat in Cayenna L. v. Robt.

Caule volubili, tereti, tenuis crassitie feli emporctii; ^{retorsum} hirsutus hirsutus.

Folia petiolata, opposita, sesquipollicaria, flagitata, cuneatis rotun
datis, oblonga, acuminata, ^{sub serrata} glabra ^{glaberrima} fere glabra, excepto costa et
subciliata. ^{venis} veno pilis raris adpressis, tenera, venosa subtus parum pal
lidiora. ^{subtus} subtus magni venosae ^{extrosae} extrosae ^{panum} panum dilatata.

Petiolus feliiformis, sesquipollicariis, glabra ^{paucis} paucis pilos.

Pedunculi axillares, unguiculares, pilosissimi, plerumque triflori.
Pedicelli umbellati, uniflori, Panicula longiora ^{parum} parum venosa.

Calyx lobis lanceolatis, acutis ^{retorsum} retorsum.

Corolla ante expansionem oblonga, ^{retorsum} ^{acuminata} retorsum villosa: laciniis flae lanceo
latis, ^{parvis} parvis ^{glaberrimis} glaberrimis, ^{adpressis} adpressis ciliatis.

ophioglossoides. *O. neitani* labio lanceolato integro, cornu brevi, flori-
bus paniculatis Walt. fl. Car. pag. 220
Habitat in Carolina

non ind.

Cynanchum denticulatum, foliis cordatis, oblongis acuminatis denticulatis, pedunculis trifloris, petalis lanceolatis planis, caule hirsuto.

Habitat in Guiana non Robt.

Caulis volubilis, teres, crassitie fili imperatice, reverse hirsutus.

Folia petiolata, opposita, sesquipollicaria, cordata: sinu aperto oblongo, ^{extensum parum} oblongo, ^{lanceolatis in parum} acuminata, denticulata, subciliata, glabris uscula excepto in costa et venis, venosa, subtus pallidiora, ~~et venis frequentioribus et magis longioribus et venis magis venosa~~

Petiolus filiformis, sesquipollicaris, raris pilosus.

Pedunculi axillares, unguiculares, pilosiusculi, plerumque triflori. Pedicelli umbellati, uniflori, pedunculo longiores, parum angustiores.

Calycis:

Cucullata O. Neotani labio trifido, petalis confluentibus, caule nudo Lin
S.V.

Onthi radice rotunda, cucullo tridentato Gmel. fib. 1. p. 16. t. 3. fig. 2.

Habitat in Sibiria et herb. Ventenati

Folia radicalia ovata bina, pallidana, acuta, petiolata, glabra.

Scapus nudus, teres, superne folio subulato. Flores secundi. Bractea
subulata, germine parum brevior. Neotani cornu recurvo, subulato

Lacinio limbi linear. Petala lanceolata

globosa O. nectaris labio reflexo trifido; medio emarginata: coran
lovi brevi, petalis apice subulatis L. v. Post. Max. v. 404. Facq. fl. Austr.
vol. 3. t. 265

Orchis rotundus Dalech. Hist. Lycop. p. 1556

Orchis radicibus subrotundis, spica densissima petalis exterioribus
angustatis Hall. hist. 1272. Tab. 27.

Habitat in Helvetia austriaca ?

Bulbi fusiformes. ~~Folia rotunda angusta, cuneata inferne plura 4 vel 5 in caule~~
~~et ultra~~ ~~folia lanceolata, acuta obtusa oblonga vix pollicari~~
inferne vaginantis ^{caulis pedalis} spica densissima brevis globosa. bractea longitudine
superne vaginis squalea ovata acuminata apice parum dilatata, duo breviora
posteriorum superum

Coniophota O. *Nectane* labio trifido reflexo crenato: cornu brevi, petalis conniventibus
Mant. 483. Faey-flor. Austr. sub. 2. 7. 122.

Orchis huius odore minor Bauh. Pin. 82. Vaill. Tab. 31. fig. 30. 31. 32. 37

Orchis radicibus subrotundis, galea connivente, Labello trifido reflexo

Hall. hist. 1284. Tab. 34

13. *Orchis batavica* N. Clus. p. 268 varietas purpurascens

Habitat in Europa australioris, ~~Orientis~~ ^{Orientis} ~~per~~ ^{per} Orientis partibus &

Folia radicalia rarius unam vel alteram inferne in caule,
Lanceolata an. vix semipollicem lata ^{saep. 3. pollicans} saepe angustiora.

Scapus pedalis interdum brevior vaginis 2. tribus. Spica

Cylindrica ^{bif. 3. pollicans} flores compressi. Bractea lanceolata subulata longi-
tudine germinis, cinnamomea. Petalum dorsale reliquis longior

Cornu marginibus conniventibus cordato ovatum acumina-

tum reliqua 4 or multo minorum. Laciniae lobis laterales
breviores truncato denticulata. Cornu germinibus brevior

Figura Hall. recedit quoad petalum dorsale

Cubitalis O nectari labio trifido acumina filiformi: intermedia ovata
Cornu geminibus breviora Linn. b. V. pag. 100 & Flor. Reyk. 320 +
Orchis caule cubitali spica parva longa rara Burm. Reyk. 176
^{Habitat in deserta}
Caulis sesquipedalis. Folia versus radicem quatuor aut quinque
alterna, vaginantis lanceolata: reliquum caulis nudum. Bra-
cteis vaginantibus circiter 10 acuminatis. Spica angustissima
nuda, fere pythamoa bracteis lanceolatis, longitudine florum
cornu geminibus breviora laciniis lateralibus labii filiformi
bushen.

non vid.

mono *Orchis neotani* labio quadrifido crenulato: cornu obtuso ascendente
petalis obtusis conniventibus Mant. 405. Fl. Dan. 253.

Orchis mono foemina Bauh. Pin. 22. Vaull. Tab. 3. fig. 13. 14. Segu. Tab.
15. fig. 7.

Orchis mono foemina, calcar extuberante, bifariamque diviso Segu.
Ver. p. 26. Tab. 15. fig. 8.

Orchis radicibus subrotundis, glabra petalis lineatis, labelli trifido
crenato, medio segmento emarginato Hall. hist. 1202. Tab. 33.

β. *Orchis mono* foemina procerior, majori flore Vaull. Tab. 3. fig.
33. 34
Ed. fl. Dan. 253.

Habitat in Europa prope arida &

Folia radicalia canaliculata obtusiuscula pollicaria cernuum
inferna in pappo, vaginans. Caput dorsalis in β. pedali
Spica pauci flora vix 12 stipula colorata oblonga acuta
longitudine germinis. Petala erecta ovata exteriora duo
multinervia. Cornu longitudine germinis subtruncatum
emarginatum.