

# Origanum

1. *egyptiacum* O. foliis carnosis tomentosis, spicis nudis
2. *dictamnus* O. foliis in senioribus tomentosis, spicis nudantibus glabri bracteis ovatis glabris
3. *Taurinense* O. spicis tetragonis, bracteis subrotundis maximis
4. *spigileum* O. foliis omnibus glabris, spicis nudantibus bracteis ovatis glabris
5. *coctium* O. spicis aggregatis longis pnis matris erectis glabris, bracteis membranaceis calycis duplo longioribus
6. *myrsinum* O. foliis ovatis acutis serratis, spicis congestis umbellatim fastigiatis  
anaphalense
7. *hemisphaerium* O. spicis longis pedunculatis aggregatis, bracteis longitudine calycium  
retosus  
caule hirsuto.
8. *vilgare* O. spicis subrotundis congestis foliis ovatis, spicis subrotundis paniculatis  
longioribus, bracteis calycis longioribus
9. *indigolum* O. foliis cordato-subrotundis, spicis subrotundis, bracteis longitudine  
calycis  
glabris
10. *onites* O. foliis cordatis tomentosis, spicis oblongis aggregatis

11. *Synadum* O. foliis ovatis villosis, spicis longis ternatis pedunculatis, villosis  
12. *manu* O. foliis ovatis tomentosis sessilibus, spicis hirsutis  
13. *majorana* O. foliis oblongis obtusis canis, spicis subrotundis compactis pubescentibus  
incanum

Hyssopus quercorum albus alp. ext. ) herb. mus.  
Origanum album Tabern. Ic. 344)

Dedit Fuchs

Majorana caerulea rotundifolia Lavandula odor capitulis minutis, incanis floribus  
per p. Tournef. Cor. herb. mus.

Dedit Fuchs

Origanum

Origanum majorana cithia tenuifolia Lavandula odore, capitulis minoribus  
incanis, flore purpureo fœnte Tournef. Cor. pur.

Habitat in Creta Herb. Desfont. 5

Caulis fruticosus, pedalis, ramosis: rami acute tetragoni, apice villosuli. Co-  
lia subsessile, semiuquinulana vel minora, cum ornemento ramuli n. axillis  
ovata, incano-tomentosa, crassa. Capitula var. unalica, varna, pedunc. ulata  
incano-tomentosa, ovata, obtusa, semiuquinulana. Bracteo subrotundo-  
intus glabra

*Origanum*

majorana cretica Lavandula odore, capitulis minoribus incanis, flore purpurea  
Kenta Tournesf. Cor.

Habitat in Creta herb. Turs.

Sorex ramosis: rami superne canescentes. Sola petiolata, unguiculata, juniora  
minuta, conferta in ramulis, oblonga, obtusa, basi acuta, supra lanis sine lineata,  
villosula, subtus puberula, incana. Pediculi axillares, longitudine foliorum.

Spica tres, <sup>subaequaliter</sup> sesquiter, <sup>loco axillari</sup> obtusa, imbricata, tetragona, unguicularis: squama rotundata,  
villosa, incana

affinis majori

melissofolium Origanum

Origanum africanum frutescens foliis lenter canescentibus crassioribus tomentosi  
ganini

Habitat herb. huj.

Caulis suffruticosus? superne villosus-canescens. Folia petiolata, saepe pollicaria, ovata  
et nunquam acuta, inaequaliter serrata, avenia, obsolete nervosa, supra glabra, subtus  
lota. Spica superne, axillares, compositae, tomentosae, uncinatae. Spicula <sup>hirsuta</sup> globosa,  
bracteis cordato-ovatis, acutis, alia interioribus lanceolatis, longitudine calycis. Calyx  
quinque dentatus, fusco punctatus

microcephala

Majorana cretica tenuifolia lavandulo odore capitulis minoribus nigris  
flora purpureo Tournef. Cor.

Habitat in Creta herb. Desfont

habes

*Oryzanthum*

*Oryzanthum Dittamni* erectum facie folio crasso nunc villosi nunc glabro ter-  
ref.

Habitat in Oriente Herb. Desf.

Caules spithamei, ramosi. Folio sessile, semipollicaria, subrotunda, integerrima,  
crasso, utrinque punctata, avenia, enervia. Spicae terminales solitariae, sesqui-  
pollicares, laeve imbricatae. Bractea ovata, acuta, venosa, unguiculata, corolla  
paucis brevior. Corolla glabra: labrum superius erectum

Unas rami folisque villosi vel glabri



Origanum

Origanum canadense capitulis tenuioribus Tournes.

Habitat in Canada herb. Desfont

Caulis herbaceus, villosus, obtuse tetragonus. Siles pedicelato, semipollicinari, ovato, dente uno alterove obtuso remoto, supra glabra, subnervosa, impunctata, subtus pallidiora, nervi villosi, punctata. Pedunculi axillares solitarii, ternales terni. Spicae tenues, parvae, laxae, imbricatae. Bractea oblonga, intus punctata. Calyx faucibus villosus.

Origanum

Origanum creticum Bauh. non onites C. Bauh.  
Majorana cretica comitis majoribus albis saturejo odore

Habitat in Creta herb. Desfont

Caulis ramosus, pilosus. Solum petiolato, semipollicaria, oblongo, nervis,  
villosa, integerrima, utrinque resinosa punctata. Spicae terminales, oblongae  
obtusae, tetragonae, subciliatae, semiunguiculatae, ternae, pedicellatae. Pedicelli  
foliosi. Bractea ovato-oblonga. Corolla ultra bracteam parum prominens.

*Ogyptiacum* O foliis carnosis tomentosis, spicis nudis Linn. l. v

*Origeno cognata* Zatarhendi Bauh pin 223. Monj hist. 3. p 360  
f. 11. t. 23. fig. 17.

Zatarhendi alpini Ogypt. 94. t. 95

*majorana rotundifolia fiutellata exotica* Tournef. G. R.  
H. 199.

Habitata in Ogypto 2

non vidi

*Putamnus* O foliis inferioribus tomentosis, spicis mutandibus An L. V.

*Putamnium coactense* Cam. epit. 472.

*Putamnium* Lob. ic. 502.

*Putamnium coactense* Bauh. pin. 222.

Habitat in Prelo monte Ida 5

Rami ~~terres~~<sup>stragones</sup> lanato-tomentosi ut folia. Folia petiolata, ramulis  
nimis sessilia glabra supra spinosa punctata, omnia ovata, obtusa  
integerrime nervosa. Spica ex apice <sup>pedunculata</sup> terminali, oblonga pollicia  
res imbricata bracteis ovatis obtusis nervosis glaberrimis supra  
spinosa punctatis, flos sessilibus singula. calyx brevis glaber Corolla  
bracteis longior

habes

Tournefortii O. spicis & Aragonis; bracteis subrotundis matremis. Hort. Vew. 2  
p. 311.

Origanum Putamni Cretici facie, foliis crasse nunc villosis, nunc  
glabris Tournef. d. 1. p. 240. fig.  
Habitat in Gafala Amorgos 25 herb. Linn. Mus.

non videtur

ded. & Desfont

relectum nominatum in  
altero manuscripto.

Sipyllum O foliis omnibus glabris, spicis nutantibus Linn. S. V.

Origanum montis Sipyli Herm. Leydb. 462. t. 463.

Dictamnus sipylius, majorana foliis Monf. hist. 3. p. 357. f. 11. t. 4. f. 2.

Habitat in Phrygia monte Sipylo.

Rami glabri superne obscure tetragoni. Folia <sup>cauda ovatis cordatis</sup> suppetiolato, glaberrime  
venis subnerviis integerima duplo minore quam in  
O. Dictamno, ramulosis minora fessilia. Spicis terminalibus parvis  
nutantibus imbricatis bracteis ovatis glabris coloratis, ~~et~~ <sup>at</sup>que im-  
punitatis.

Spicis saepe pollicares.

Orticum O species aggregatis longis pro matris rectis, bracteis membra  
natis calyce duplo longioribus Lin. t. V. pag.

Origanum Orticum Bauh. pin. 223. Monf. bot. 3. t. 3. pag. 15.

B. Origanum monspeliense pulchrum Cam. epit. 460.

Origanum folio subrotundo Bauh. pin. 223. Monf. bot. 3. t. 3.  
pag. 16.

Habitat in Europa australi, Palæstina &

Caulis semipedalis erectus ramosus rari subhispidi. Folia petiolo  
sa unguiculata acuta integerrima <sup>ut supra</sup> subtus repens punctata  
subtus nervos subulosa profertim margine et subtus in nervis

<sup>Pedunculati</sup> picea terminali vel est utillis supremis tero quia tero pappi  
glabra unguiculata bracteis ovatis pallide viridibus acutis supra

<sup>puncti</sup> punctis paucis adpressis integerrimis ad eandem ciliatis  
bracteis <sup>velis</sup> varietas? a h. humilis. Folis 3plo vel quadriplo majoribus  
specie a v. v. purpurascens

glabra

Benghalense *O. folis ovatis dentatis speciosimbriatis* Comynosi, bracteis ovatis  
Burm ind. 7. 3 P. fig. 3.  
Habitat in India orientali.

non vidi



Smynoum O foliis ovatis acutis serratis, pinnis congestis umbellatim fastigiatis  
Linn. L.V

majorano cretica, origani foliis, villosis, satureje odore, corymbis  
majoribus albis Tournef. corol. 13.

Origanum Smynoum Wheeler Ten. 250.

Habitat in Creta et Smyna. herb. mus.

Caulis uti tota planta villosa canescens. Folia inferiora petiolo  
+ ~~adler~~ herb. <sup>ca</sup> superiora sessilia vix pollicaria obscure serrata, obtusa  
rudimenta ramulorum in axillis. Pediculi terminalis et  
axillis supremis. <sup>uniculi</sup> Pediculi <sup>op</sup> pariales oppositi folium utraque  
ad basin squuli pinnis plerumque tres in singulis pedicellatis  
subglobosis embricatis bracteis ovatis intus glabris calyce parum  
congesto calyce glabris punctis parvis <sup>reflexis</sup> adpressis

villosa

videt fusc

vulgare O specis subrotundis paniculatis conglomeratis bracteis calyce longiori-  
bus ovatis Lin. l. v. fl. Dan. tab. 630.

Origanum sylvestre f. vulgare Tuck. hist. 5. 22.

Origanum sylvestre Bauh. pin. 223. Monf. hist. 3. V. 3. fig. 12.

Habitat in Europa, Canada ripis rivis inque f. putricis &  
caulis villosus verticillatus superne ramosis ramis floriferis  
folia petiolata ovata utraque pollicaria vel minor utraque  
punctata integerrima inferna subserrata subtus villo variorum  
prosertim in nervis. Pedunculi terminales cernuorum et  
paucis compositi fastigiati. Specio brevis laxis bracteis oblongis  
acutis glabris. calyce et ore peloso longitudine bractearum

~~Caulis villosus, semipedalis. Folia unguiculata, ovata, utrinque subacuta.  
villosa, punctata. Spica semi-peltata, tetragona, imbricata. Bractea ovata  
colorata glabra herb. Fus.~~

heracleoticum O species longi pedunculatis aggregati, bracteis longitudine  
calycum. Lin. Spec. pl. pag. 223

Orega, origanum heracleoticum, Cuneola lobel. u. 492.

Organum heracleoticum, f. cuneola gallicana plinii Bauh.  
pin. 223. Monf. hist. 3. t. 3. fig. 14.

Habitat in Europa australi graecia et hebrus.

Caules semipedales teretes purpurascentes, herti. Sol. superne in  
ramos flexuosos divisi. Folia petiolata, villosa, integer  
rima, villosa obtusa utrinque punctis conopsea et cavatis, ut  
unguiculata, rudimenta ramulorum ex omnibus axillis  
specie ex apice ramulorum et terminali. Caulis semipollicaris  
tenuis bracteis oblongis acutis longitudine calycis ut calycis  
repleto punctato meo cum figura Bauh. hist. 3. p. 230. con  
venit linae habet specie digitale, quod non in mea  
an mea potius Smyrnaeum

pedicellata

villosi

edit fuf

caule herti

organum heracleoticum matthioli Bauh. hist. 3. p. 237. v. 1

Caulis villosi semipedales vel ultra ramosi. Folia petiolata, semipollicaria  
oblonga vel ovata utraque subacuta villosa punctata. Spica ex axillis  
et apice. Spica ternis, pedicellata, pollicares. Tetragona, cylindrica in  
des.) imbricata bractea ovata colorata glabra. G. 1/2

rotundifolium *O. spicis* subrotundis, bracteis longitudo calycis, foliis cordato-subrotundis

Habitat

Caulis erectus purpurascens teris. Colli semunquiculata indigena  
nervosa, margine ad lentem ciliata. rudimenta ramorum et axilli  
pedunculati et alii superioribus. bractea linear-oblonga colorata.

Calyx ore villosus

facies *O. vulgari*

onites O fructu oblongo aggregati. hirsutis, foliis cordatis tomentosis. Lin  
Spei: pl. pug. 0244

Organum onites Bauh pin. 222. ? Monstus 1. 3. 8. 3. fig. 4.

Organum lignosum syriacum perenne, umbella amplissima  
brevis, lato et nervoso folio Boic. mus. 2. p. 45. 1. 30.

Habitat Syriae

Habitus majorano sed lignosus. Culi caulis pilis longis patulis  
folia parva cordata subsessilia acuta nervis serrata, utraque  
tomentosa; et alia videntur ramosa fructu congesto ut in Ma  
jorano sed oblonga, in singulis pedunculo tero intermedio sessili  
villosa; Flores albi Lin

non vid.

Synacium O specio longo terminali pedunculatis villosi, foliis ovatis villosi

Lin. Spec. pl. pag. 224

manum synacium lobel. ci. 444.

Majorana synaica vel celtica Bauh. pin. 224

Habitat in oriente. herb. mus.

Habitus majoranae. Folio subrotundo-ovata, acuta, pelis vasis  
adpressa. Rami, et axillis. Corymbus terminalis et rami  
Corymbis bracteatis. Spicae bipinnes ubique 3. Terminales  
longae, et 4-5 tetragone villosae lin.

videt fuscum



man. O. *Spicis hirsutis, foliis ovatis tomentosis sessilibus. Lin. Spei. pl. pag. 225*

man. creticum Alp. exot. 2. 29. 7. 280.

majorana cretica organifolia, villosa fetoreo odore, flore purpura  
scenta Tournef. corol. 13.

Habitat in Creta

Pauci majorana sed rigidior. Folia absque manifestis petioli,  
valde crassa, tomentosa ovata nec obovata albida. Caulis per  
parafeni adpressus villis raris. Capitula valde hirsuta  
Internata, ultima sessilia, caulem ramosque terminan  
tia lin.

non vidi

majorana O foliis ovatis obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus  
Linn. S. V.

Amaracui vulgarior Lob. ii. 490

Majorana vulgaris Bauh. pin. 224. Monf. hist. 3. t. 3. fig. 1.

β. majorana tenuifolia Bauh. pin. 224. Monf. hist. 3. t. 3. fig. 3.

+ Habitat

Rami vix pubescentes folia petiolata oblonga integerrima  
peltata villosa obtusissima. Peduncululi ex axillis supremis  
et terminales spicis plerumque ternis <sup>to</sup> ~~sepius~~ <sup>ternis</sup> subro-  
tundo villosis prope marginem albo.

β. Differt caule fruticuloso foliis spicis minoribus vix petiolatis  
spicis parvis longioribus pilosioribus. Spicis tetragonis an  
specie diversa Tournefortius distinguit

+ ~~majorana tenuis et longior Bauh. hist. 3. p. 241.~~

~~incana tomentosa incanosa tomentosa~~  
incanum O. spicis ternatis oblongis tetragonis folisque oblongis, caule fruticoso  
Majorana tenuior et lignosior Bauh. hist. 3 pag 241  
Majorana lutea odorata perennis Monf

Tournef.

Habitat

Paucis majorano differt foliis simplicibus minoribus brevissimis petiolata  
et spicis longioribus caule fruticoso

*Platycodon* O. Capitulis axillaribus, floribus papilionibus caule flexuoso,  
foliis sublineari Walt. fl. Car. p. 165  
Habitat in Carolina

non vidi

~~pilosum P spicis paniculatis alternis secundis, spiculis geminis, altero minore  
acuminatis lobatis; rachis compresso piloso, culmo divaricato genium~~

~~Cato. Sw. prodr. p. 22.~~

~~Milium jamaicense Polystachyon latifolium Lemne duplicato~~

~~Sloan hist. 1. p. 114~~

~~Habitat in Jamaica~~

mihi haud satis notum

*Clinopodioides* O. capitulis rotundatis verticillatis terminalibusque, floribus  
sessilibus, foliis cordato-ovatis subpetiolatis glabris Walt. fl. Carol. p. 165  
Habitat in Carolina

non vidi