

Onita

1. glabra O. foliis glabris, floribus aggregatis axillaribus.
2. racemosa O. foliis subtus villosis, racemis axillaribus.

japonica Othow Thunb. fl. jap. p. 61. t. I. v. p. 150

Habitat in Japonia

Caulis fruticifolius. Rami teretes striati, purpurei. Folia alterna, petiolata
ovata, integra, glabra, coriacea, patentia, sesquipollicina. Petioli semiteretes
glabri, lineam longi. Flores axillares aggregati, pedunculati. Pedunculi
semi lineam longi Thunb. l. c.

~~racemosa~~
glabra O. foliis glabri, floribus axillaribus aggregatis

japonica Orita Thunb. fl. jap. pag. 61. + l. v. p. 15 d

Habitat in Japonia

Caulis frutescens, flexuosus, glaber, erectus, ramifus, oxygalis. Rami alterni
glabri, ultimi villosi. Folia alternis, petiolata, ovata integra, supra
subtus pallide viridia, villosa imprimis juniora, persistentia semper
Cucaria. Flores racemosi; racemis alternis, pedicellatis. Bractea sub pedi-
cellis concava, oblonga, glabra. Pedunculi et pedicelli villosi. Thunb. l. c.

racemosa O. foliis subtus villosis, racemis axillaribus