

Ornithopus

1. perfoliatus O. foliis pinnatis, leguminibus incurvatis pediculis
2. compressus O. foliis pinnatis, leguminibus recurvatis compressis rugosis glabris,
bractea pinnata.
3. scorpioides O. foliis ternatis subsessilibus: impari maximo.
4. tetraphyllus O. foliis quaternis, floribus solitariis

biflora Ornithogori
retroflexum Hed.

Hedysarum procumbens

bupleurif.

attenuatum

recurvum

hispidum

lentissimum

neesii

angulosum

retroflexum

filiosum

bicolorum

pteroicarpum

transversum

Scorpiurus

molle

Lesban & caule herbaceo lavi, Leguminibus cylindricis squalibus; foliis
obtusis lin. Spec. pl. p. 106. Gaëqu. coll. 2. p. 203.

Emeni fleguis 2. longispermis Burm.

Galega Egyptiaca, siliquis articulatis Bauh. pin. 352

Rehed. Mat. 6. p. 49. t. 27.

Lesban Alp. Egypt. Pl. 782.

Habitat in Egypte sepibus

Genus Ornithopus

Cavanell.

Habitat

herb. le nev. le paur

Caules plures, struthamoi, filiformes, erecti, simplices, glabri. Bala juncta: fo-
licola crassa, cuneata, emarginata, parva. Stipulae similes foliis. Pedunculi
axillares et terminalis, triflori. Legumina pollicaria, Yersitipula, recurvata
nodosa: articuli lineares, semungueulares

pendulus, *Ornithopus*

Habitat in monte video Commerçon herb. Tuss.

Caulis herbaceus, procumbens. Rami florati, glabri. Folio pennato cum impari, bipinna: foliolo femina unguiculata, oblonga, terminale obovatum. Stipula ovata, obtusa. Pedunculi axillares, solitarii, unguiculares, squasleri. Legumina pendula unguiculata, bacciculata, glabra

breviflora Ornithopus pedunculis multifloris, leguminibus vestis, caule pro
cumbente.

Habitat in monte video Commerson Herb. Tuss.

Cauli glaber. Folia 8 x 1/2: foliola oblonga, glabra, vix unguiculata,
obtusissima intermedia majora, obtusissima, basi acuta. Stipulae
subrotundae, membranaceae. Pedunculi foliis breviores, 6 flori.

Flores parvi, lactei. Calyces glabri. Legumina pendula, 8 emipoll.
Cana 4 articolata: articulis subrotundis, ultimo acuminato

reticulatus Ornithopus

Ornithopodium flore flavescente Benth. hist. 2. pag. 350.

Ornithopodium siliquis reticulatis Vaill.

Habitat ex herb. Vaillan Musci

Caulis striatus. Foliole oblonga, glauca, glabra, basi acuta, apice obtusa.

Legumina terna, teretia. Stipula minuta, creta.

an eadem cum Ornith. recurvato

recurvatus Ornithopus

Ornithopus recurvatus Cavan.

Habitat in Hispania herb. Lus.

Caulis simplex, teres, glaber. Folia bipinna: foliola cuneata, glabra
fere unguiculata. Stipula foliacea, subrotunda. Pedunculi
elongati, triflori sive triflori. Legumina sesqui pollicaria, recurva,
articulata; articulis linearibus, angulatis, glabris, angustis.

nodosus Ornithopus

e monte Plat. herb. Desf.

Caules copiosi, diffusi, spithamei, pubescentes. Legumina 3-6.

reliqua e specimenie communicata referenda

pecta *Ophynomena* foliis pinnatis pennulis linearibus obtusis floribus racemosis
vestello postice pecto Cavan. in. vol. 4. pag. 7. tab. 314.
Habitat in Nova Hispania et G. b. spei ♂
Legumen annuum teres

Ornithopus

Habitus non est *Ophynomenis*

non vid.

vagnalis O. suffruticosus, foliis subundecis obovatis infimis a caule
emotis, stipulis oppositifoliis monophyllis emarg. unatis vaginam
subis

an Polygala etc: Barkl. 721.

Stat Cornella vagnalis La Mart

Habitat in Italia Vahl

fraxello magna nec parvo ut in minima cui simillima

Stipulari Ornith

globosus - O. umbellis globosis, leguminibus pendulis

Hedysarum argenteum alp. Ext. St. 314

Coronilla globosa herbacea umbellis globosis, leguminibus plerumque
pendulis teretibus articulatis Lamark

Habitat in Candia

Affinis cactica differt floribus majoribus, ^{numerofloribus} folioli ~~oblongis~~
lanceolatis 11-13. stipulis ovatis

Melch. cynotis

2 penica @ fruticosa, folioli quinatis ternatisque lineari lanceolatis sub
carnosi obtusi. Lin. S. V

Coronilla major masiliotica Bauh. pin. 344.

Polubea caule genuta fungosa Bauh. hist. 1. p. 383.

Dorycnium luteum hispanicum carnosum Barr. c. 133.

Habitat Masilia, Mospelii, Polaa remotissima

Caulis ^{glauco} ^{lignosus} ^{truncatus} ^{et} ^{laber} ^{ternis}. Foliole sessilia terminalia pollicaria
lateralia ~~minora~~ ^{crispifolia} ^{ad} ^{versum} ^{sensum} ^{parum} ^{latiora}. Stipula
oppositifolia membranacea decidua. Pedunculi laterales
et terminales 4-6 flori. Legumen

omnithoquis isti sequentes Coronilla

culta

3 valentina C. fruticosa, foliis subnovenis, stipulis suborbiculatis. Lex. Spei
pl. p. 1047.

Polygala valentina Clus. hist. 1. p. 90.

Polygala altera Bauh. pin. 349.

Coronilla fruticosa, Leguminibus Vestibus, pedunculis multifloris, cau-
le fruticoso Hort. Upf. 234. Mel. Cat. 107.

Habitat in Hispania, Italia &

Stem pedalis dichotome ramosis, articulatis, flexuosis, e capite
foliorum superulatus. folia quadrinerva vix unguiculata
brevissima petiolata externa parva majora glauco viridia colore
rute mucronata. Stipula ovata vel subrotunda mucronata
sub floescentia decidua umbellata 5-7 flora. unguis petalorum
calyce duplo longior. Legumen articulatum articulis oblongis gla-
bris 2-4 or

front

flores nocte graveolentes

9 glauca P. fruticosa, folioli septeni, obtusis pinnis, stipulis lanceolatis Lin. Am.
ai. 4. p. 205 t. V. p. 669 + Mill. in t. 2. p. 47. 1.

Colutea scorpioides maxima, glauco folio Bauh. prodr. 1577. p. 397.

Habitat in G. Narbonen. t.

rostrinodori ^{foliola} tota glabra. Folia trijuga obovata, mucronata polliciana
die fragrantissima. Stipulae parvae lanceolatae. Peduncululi axillares. Umbella
cincter novemflora. Legumen

Culta

5 Coronata Q fruticosa, folioli novem obovatis: inter nis c'auli appropinqua
40, stipula oppositifolia bipartita L. Spec. pl. p. 1047, aiqu. fl. austr.
1. t. 95.

Colutea scorpioides H. Clus. hist. 1. p. 90.

Colutea scorpioides minor coronata Bauh. pin. 397.

Habitat in Europa australi

Taxis minima sed frutescens cum altera vix suffrutescens Caulis purnata
scens frutescens. folia 7. 9. ^{foliolo} extensa majora cavenia opposita cune
sa. Peduncululi 5 flori.

Ornithop

6 minima C. suffruticosa prostrata; folioli novenis ovatis, stipula oppositi
folia emarginata leguminibus angulatis nodosi Lin. Mant. 444. t. v
p. 670. Am. ai: 4. p. 37. Jacq. fl. austr. 3. t. 171.

Cotus enneaphylos Dalech. hist. 510

Terrum equanum, siliquis in summitate Bauh. pin. 349.

Habitat in Gallia australi, Hispania, & Italia &

facies L. ^{ulata} ^{ulata} Ranta vix palmaris, caule terreo ascendente glabro, ramoso
rami filiformes pallide virides. foliola quadrijugis foliolis parvis
exterioribus majoribus, interiora duo caule approximata. Caeis stipula
num, micocotata. Stipula minuta lineari. Pedunculi foliis multo
longiores. ap. pedicelli 6 umbellati. Flores explicative vix sunt
Legumina

minima C. ^{caule} suffruticosa caulibus ascendente folioli novenis oppos. obovatis
stipula oppositifolia emarginata, leguminibus angulatis
nodosi

montanae

Dunes Ornithopus caule suffruticoso, foliis pennatis glaucis subternatis
pedunculo brevioribus Cas: co. 1 pag. 31. Tab. 41. fig. 2.
Habitata Hispania

affinis *Colletta minima*

† Argentea *C. fruticosa*, folioli cuneati sericeis: ^{obcordatis} extremis majore. Lin 1. V

Colubea scorpioides odorata Alp. ex Bot. 17.

Habitat in Creta

folia 4 vel 5 supra *legumina* terops articulata

an *Cornella fraxulani* ha Mart.

descriptio ex alpino desumpta

non vidi

10. *Creteia* P. herbaea leguminibus ^{sub}quinis erectis verticibus articulatis, foliis unda-
nis Lin. N. p. 10407 Mart. 445. Jacq. herb. T. 25.
Coronilla cretica herbaea, flore parvo purpurea sicca Tournef. cord.

441.
Habitat in Creta C.

Caulis vases erectus glaber striatus. Folia 6 vel 7 juga. foliola brevissima
reticulata opposita, glabra, arena semianquilana exteriora
minora. Stipulae vix ulla. Peduncululi ex axillis superioribus folio
longiores. Pedicelli umbellati brevissimi. Legumina

Creteia P. herbaea leguminibus subquinis erectis verticibus articulatis, folio
lis cuneatis cuneatis. caule ^{erectis}

9 rana C herbaea Leguminibus erectis teretibus torosis numerosis, folioli pluri
mis glabris Len. S. V. p. 670.

Secundaria 2. altera species Pluf. hist. 2. p. 237.

Secundaria Dumetorum major, flore varo, siliquis articulatis Bauh.

per. 344.

Habitat in Lusatia, Bohemia, ~~Dania~~, Gallia C

Caulis angulatus, tenerior quam in cretica ramofcis rami adpressi basi
stimuli minutis. folia 7-10 paja. foliola petiolata plerumque
opposita, hemisphaerica, glabra, mucronata, subtus glauca
ex tenera minor. Pedunculati axillares, stipulo parvo lineares. Pedun-
culi axillares et terminales folio longiores. Pedicelli umbellati
umbella hemisphaerica cincta cretica. involucrium minutum
Flores tripto vel quadruplo majores quam in cretica Legumen

rana C. herbaea Leguminibus erectis teretibus torosis numerosis: folioli
plurimis lineari-oblongis

Squamata Coronilla caule herbaceo erecto foliis undenis
ovatis subtomentosi leguminibus pendulis squamatis
Cavan. Ic. 2. p. 43. t. 155.

Habitat in Hispania

Caules plures esset pithamoi sulcati ramosi, subto-
mentosi. Folia in pari-pinnata pinnulis ovatis
subt. equalibus petiolatis. Stipula brevis ovata
si anosa basi petioli adnata. flores uniter 6-umbel-
lato sessili. Calyx campanulatus subtomentosus. Corolla
tutea. Legumina pendula, panna pinnata subt. squami-
lis fursurmicis Cavan.

non vid.

11 Scandens. C caule scandente flaccido Lx. S. S.

Coronilla scandens pentaphylla Plum. spec. ii. 107 fig. 3.

Habitat in America calidiorie.

Folia ^{in pari pinnata} bipuga, opposita foliola opposita oblonga, pollicaria, stipula ovata. Legumina linearia quadripollicaria, articolata. Ram. tenues pubescentes. Stipulae petiolatae quinque pinnatae vel ternatae: foliola petiolata, opposita ut simpliciteriana, ovata et emarginata, pubescentia, averna, subtus pallidiora. Stipulae ptericeae. Peduncululi axillares, unides b. pubescentia caerescentes, ungue ulares. Calycis locinae lineae colatae. Ungues petalorum calycis longioris. Legumina pedicula filiformia in circumini a stylo persistente subulata, pubescentia, tripollicaria herb. Provenit

descript. e Plum. figura ~~na ad~~

intermedius O. caulibus repentibus longissimis foliis pennatis, Leguminibus
bractea pennata brevioribus

Ornithopus intermedius caulibus repentibus longissimis, foliis
pennatis, bractea pennata ^{leguminibus} ~~inter~~ incurvatis majore
part.

Woth Tentam. fl. Germ. 2. pag. 215

Habitat in Germania

non vid. an modo varietas reperirelli ?

1. perpusillum *C. foliis pinnatis, Legumini bus incurvatis* ^{vulgo} Lin. S. V. pag. 678 x

Pl. Dan t. 730

Ornithopodium perpusillum Dalech. hist. 407.

Ornithopodium minus Bauh. pin 350.

β. *Ornithopodium majus* Bauh. pin 350

γ. *Ornithopodium radice tuberculis nodosa* Bauh. pin 350.

Habitat in Anglia, Belgii, Gallia, Hispania arenosis *C.*
procumbens diffusa caules plures basi ramosi digitales vel
ultra, villosi. Folia 7-13 juga minuta oblonga villosa, opposita
interiora minoria caule approximata. Pedunculi terminales
et axillares. Stipula minuta ovata acuminata apice fusca. Flor.
geminis basi stipati folio pinnato. Legumina unguiculata pilosa

a compressis foliis pennatis, leguminibus recurvatis compressis rugosis, bractea ^{glabris}
pinnata Lin. S. V. pag. 670x

Scorpioides leguminosa Dalech. hist. 493.

Ornithopodis affinis hesperis, scorpioides Bauh. pin. 350.

Habitat in Italia, Sicilia C. thamesi

~~Stem~~ prostrati subramosi, ^{multis} glabri. Stipulae 6. 9 supra folioli sequi
pelticariae foliola opposita, ~~in culta~~ ⁱⁿ ~~sepe~~ ^{sepe} altera parva, oblonga
acutiuspula villosa duo infra caule approximata ut fere seplea
apparent. Nipula setacea petiolo adnato (~~an nullo petiolo?~~)

Pedunculi axillares solitarii folio longiores filiformes apice sub
calycis foliorum tripugum. flores 1. 3. legumina compressa linearia
attenuata rugosa glabra

Culta Gronov.

3 Scorpioides C foliis ternatis subsessilibus: impari maximo. Cen. 1. V

Scorpioides Mathioli Dod. pempt. 71.

Scorpioides portulacae foliis Bauh. pin. 207.

Telephium diopisoides. Scorpioides Bauh. pin. 207.

Habitat inter segetes Europa Australis O

Caulis bifidus vel adnatis erectus semipedalis uti tota planta
glabra. folia lateralibus subtota vix unguicularia intermedium
sesqui pollicare ovale. omnia glaberrima glauco viridia
aeterna nervosa - venosa. stipulae oppositifoliae membranaceae
ovatae caule arcte adpressae. Pedunculi axillares et terminales
foliariis foliis longiores aphylli, biflori. Legumina fere
in pollicariis angustissima torosa subrepanda parum re
curvata

Montana

4 Tetraphyllus O foliis quaternis, floribus solitariis Len. Am. acad 4. p. 402
quadrifolium erectum, flore luteo Sloan hist. 1. p. 106 t. 116
fig. 3.

Habitat in Tamaica
an lupus generis?

Caulis herbaceus erectus, nudus, ad presens pilis vix manifestis. Folia
alterna petiolata remota: foliola obovata, oblongiuscula
emarginata, integerrima, laevia, subaequalia. Petiolus communis
brevis canaliculatus. Pedunculi axillares uniflori, nudi petiolis
longioris, terminati bracteis 2. ovali oblongis deciduis. Legu-
men retum teris bracteis quadruplo longioris articulatum ar-
ticulis subtortis 10 vel pluribus. a reliquis omnibus facie
diversa Len. l.

repandus 0. foliis ternatis snatisque impari major, stipulis subreai
formibus Port. N. 2. p. 215
Habitat in Barbana

non ord.