

Orobis

1. lathyroides O. foliis conjugatis subsessilibus, stipulis dentatis
2. hesperis O. foliis conjugatis petiolatis, stipulis integris
3. pyrenaeus O. foliis bipinnatis lanceolatis nervosis, stipulis subsessilibus, caule ramoso
4. pallida O. foliis bipinnatis ovatis acuminatis, stipulis lanceolatis, caule ramoso
5. angustifolius O. foliis bipinnatis ensiformibus subsessilibus, stipulis subulatis, caule simplici
6. albus O. foliis bipinnatis ensiformibus petiolatis, stipulis caule simplici
7. canescens O. foliis bipinnatis linearibus, stipulis semisagittatis subulatis, caule ramoso
8. vernus O. foliis pennatis ovatis acuminatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici
9. luteus O. foliis pennatis oblongis, stipulis rotundato-lunatis dentatis
10. niger O. foliis sexjugiis oblongis, stipulis subulatis, caule ramoso
11. sylvaticus O. foliis 7-12. jugis, stipulis dentatis lanceolatis sagittatis, caule ramoso
12. tuberosus O. foliis pennatis lanceolatis stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici

Orobus Aphodeloidei Gouan illust. 48 maxime affinis *Suberoso*

Denuifolius Orobus foliis conjugatis bijugis que linearibus, stipulis subulatis, caule
ramoso.

Orobus orientalis foliis angustissimis, costa brevissima innaescentibus.

Habitat in Oriente herb. ¹⁸¹⁵ Darford 7

Planta palmaris. Caulis ope lentis villosulus, basi ramosus, angulatus. Rami
subsimplices. Folia ramorum juniorum conjugata, glabra; adultiorum bi
juga, brevissime petiolata: foliola angusta, acuta, striata, semipollicaria
ramorum juniorum minorum. Setae in apice petioli. Stipula semisagitta
ta, ope lentis vix ciliata. Pedunculi axillares, filiformes, elongati, tri
flori. Differet magnitudine Orobi tuberosi

nuscifolius *Orobis*

Orobis nuscifolius Villars

Habitat. herb. Desfont

Totus glaber, Caulis Ingueter, ramosus, sulcatus. Folia ^{in proa} quadripartita: foliola lanceolata, attenuata, acuta, sesqui pollicaria, extrorsum minoru, subnervosa. Stipulae fere pollicares, semiovatae, acutae, hastatae: auriculo lanceolato. Pedunculi axillares, solitarii, folio duplo longiores, angulati, sulcati, quinque flori. Legumina recta, teretia, retrorsa, bipollicaria.

Resputus Orobus

Habitat in monte Olympo herb. La Revellere Le Paux
velloso-subhispidus. Caulis striatus. Folia petiolata, conjugata: foliola oblonga
semipollicaria, mucronata terminata, venis pinnatis nervosa. Petioli acuminati
pubulato terminati. Stipula ovata, hastata, nervosa, magnitudine et
latitudine foliolorum, petiolo longior, nervosa. Racemi axillares, foliis
longioribus, 5 flori. Pedicelli alterni. Calyces hispidi
affinis verno

pisciformis Osobus

Habitat in alpebus altaicis Herb. mus

Caules crassius, striatus, crassitie pennis anserinis, glaber. Folia 5-juga,
oppo foliola opposita, ovata, bipollicaria, glabra, acuta. Petiolu-
feta loco cimi terminatur. Stipula pollicares, ovata, attenuata,
basi dentata. Pediculi axillares, folio breviores, 8 flori. Flores remoti,
magni. Calycis dentes lanceolata.

Atropurpureus Orobus

Habitat Alynis ad Desfontaine
Caulis sesquipedalis, erectus, simplex, striatus, angulatus. Folia conjugata,
superiora pennata, 3-juga. Racemi axillares, secundi multiflori

Vicia angustifolia frutescente recta purpurea tetra et distichostylis
Papani hort. Cath.

Crucica purpurea Catananica foliis et facie hort. Cath. suppl. alter
23.

quod inflores Crotus foliis conjugatis bipuzis que? sessilibus, lineari-ensiformibus
Pipulis hastatis, pedunculis subquod inflores
Habitat ex Mus. herb.

descriptio secundum specimen conficienda

Asphodeloides Orbis

Orbis Asphodeloides Jonon

Habitat. herb. fus.

Glaber. Caulis angulatus. Solia inferna tri-4 juxta
foliola lineari alterna vel opposita, angusta, sesqui pollicaria
Stipula lanceolata fuscata, basi interdum dentata. Pedun-
culi 3-4 flori.

1 Lathyroides O. foliis conjugatis subsessilibus, stipulis dentatis Lin. l. V

Lathyroides erecta, foliis ovato acuminato, conulis viciis floribus et
fleguis, sibirica Amm. n. h. 151. Tab. 7. fig. 2.

Habitat in Sibiria

(Cultus)

Caulis terrequer glaber. Petiolus brevis. foliolo pollicari ^{utrinque} acuta
mucro nata, acuta, ad denticuli minuti margine scabra, glabra
venosa. Stipula longitudine petiolorum semisagittata rigidiuscula
basi denticulo uno altero minuto Pedunculi folio duplo longiores
axillares et terminales solitarii multi flori. Flores penduli
violacei Calyx glaber denticulo s' quinque. Legumen lanis
laxum glabrum.

2. *Resputus* O-folius conjugatis petiolatis, stipulis integris. Hort. Cliff. 366^{n. 4}
Lindl. v

Orobis sylvaticus, foliis circa caulem auriculatis Buxb. cent. 3 p. 22.

v. 41.

Habitat in Thracia. v

Caulis spithameus angulosus alternatim inflexus. foliola ovata acuta
nervosa. petioli longitudine foliorum. Stipula foliacea ovata
acuminata sagittata magnitudine fere foliorum. Pedunculi axillares
resolitarii petiolo saepe quintuplo longior erecti 4. 5. floris. Lea
l. c.

Orobis creticus latifolius incanus Tournef. Cor. p. herb. Me.

Caulis tetragonus pilosus. folia conjugata, oblongo-ovata, nervosa
villosa, pollicaria, acuta, cuspidata. Stipula magnitudine fere folio-
rum, ovata subtristata, auriculis integerrimis interdum vix de-
tatis, nervosa. Pedunculi axillares 2-3. 4. 5 flori, elongati. Calycis la-
cimè subulato. Legumen sesquipollicare, villosam, acuminata
tum herb. Mus.

β. glaber

Orobis orientalis latifolius ferme glaber Tournef. Cor.
~~non vidi~~ Caules decumbentes. Legumina hispida folia glabra coctani pumili
et six nisi varietas herb. Mus.

3. pyrenaeus ⁰ caule ramoso, foliis bipugis lanceolatis nervosis, stipulis sub
synopsi Lin. S. V

Orobis pyrenaeus foliis nervosis Tournef. F. R. 4. 293.

Orobis pyrenaeus latifolius nervosis Plukn. Tab. 210. fig. 2.

Habitat in Pyrenaeis

Caulis sulcatus. Siliola proposita ovata acuminata bipollucica
nisi. Petiolus ^{siliolae armato rarisimo} pilis margine copiosioribus adpressis
4-5 flori. facies orobi veni. flores flavi
mea cum Plukn. figura non convenit an igitur Lin. d. vesp.
melius dicenda est

caule ramoso, foliis bipugis acuminatis stipulis lanceolatis
forte mea varietas lutea, certe non est pyrenaeus Lin. Synon. insequen-
tia, ad luteam amandantur ab Hall. All. quo omnino ad meam ser-
vatur Orobis pannonicus 4. plantarum Clus. hist. 2. p. 231. plantam

descriptio igitur
huius remota
planta a lutea diversa
forte quod alterius
causam
cultura
pallidiflora dicenda

notam bene exprimit

Orobis sylvaticus pallido flore Bauh. pin. 351.

Arachis latifolia Dod. p. 243. Galeza montana Dalechampi
Bauh. hist. Galezas montana Dalech. hist. 1139.

subquadrijugis lanceolato oblongis

Caulis interdum pedalis, erectus, tetragonus, angulis acutis, scaberrimus. e margine an-
gusto stipularum decurrente. Folia pedicelata pennata cum pari vel impari, uni-
cum terminata, interdum quadripartita, sexpartita. foliola subsessilia, alternata, rarius oppo-
sita, citraque acuta, saepe sesquipollicaria, mucronata, nervosa, venosa, glabra. Petio-
lus planus. Stipula ovata, acuta, semisagittata, transversa lata, ut eximie
semipollicares, glabra sursum inferius minores, suprema subulata. Pediculi
axillares foliis longiores multiflori. Legumina pollicaria glabra herb. Triof
et maj. (Stipulae sponose hinc quid?)

9 angustifolius O foliis binigi ensiformibus ^{sub} pinnatis, stipulis subulatis
caule simpliciter Gmel. p. 4. 744 ^{sub} fig 5. Lin. pei. pl. Aug. 10284.

V. p.

Habitat in Libria 4

Caule sesquipedalis triquetris glaber. Folia breviter petiolata nervosa
bi inferiora 2 superiora trijuga. foliola nervosa opposita sub pinnata
Petiolus ut unguiculari racione subulato terminatus. Stipula
subulato hastata semunguiculari. Pedunculi axillares foliis
3-5 folio longiores 17. 9 flori. Flores flavi ^{costa brevissimo unguiculis}

Orobis orientalis foliis angustis Tournef. Corpedales. interdum

Tetraglatis

deiformes decum
bentis

acris orobi tuberosi. Caules glabri angulati. Foliola sesqui
pollicaria, basi angustata glabra, striata. Stipula semipinnata
one lentis ciliata, linear lanceolata. Pedunculi 4 flori herb

mus.

Foliola 2-4 juxta foliola vix petiolata, striata, inferna inter
dum one lentis rare villosa fixata orobi lutei. Stipula ungui
culari. Pedunculi axillares elongati. flores remoti nudantibus
Calycis lacini lanceolata herb. mus.

Montane

B. la Manthi ex cluso synonym. Bauh.

Caulis glaber triquetris angulatis duobus acutis foliis bi / 3 juxta ;

vesta

foliola linear-lanceolata, sessilia sesquipedalium, ac utraque subalternantia petio-
li alati stipula lanceolata, fugitativa semipollinaria. Pedunculis
elongatis multifloris. Specie forte differt herbis quod tamen ultimum inquiri
rendum. a La Martini cum canescens haec confunditur

pallidus
albus

O. foliis ~~hygri~~ folioli ovatis attenuatis venosis, ~~perpetua~~
sagittati ~~caule semper~~

Orobis pannonicus 4tus Plin. hist. 2. p. 231.

Arachis latifolia Dod. pempt.

Galega montana Dalechampi Bauh. hist. 1139

Galega montana Dalech. hist. 1139

Orobis sylvaticus pallido flore Bauh. pin. 351.

~~Orobis albus foliis hygri ensiformibus petiolo~~

Palatis angulatus glaber. foliolo opposita bipollicium

Stipula parva lanceolata. Facies orbi veris ~~et~~ flori

sub nomine Orobis pyrenaea accipi nullo modo convenit
cum figura Plin. nec cum different. ⁱⁿ eius specifica
in n. stipulo subpyrenese

Syn: hoc omnia in Mantuffini 2. secund. Jovardum
ad luteum emanatur sed testetofe

10 albus *O. folios bipezis* ensiformibus petiolatis, stipulis simplicibus, caule
simplici: det. Suppl. p. 327. & S. V. pag. 661.

Orobus pannonicus Gayen. fl. austr. 1. p. 25. & 39.

Habitat in Austria &

Radices tuberosae, sesquipedales. Similis ^{O.} angustifolia sed folia petiolata nec
subsessilia; flores albi nec lutei; racemi absque filo terminati
quod in *O. angustifolia*

11 Canescens - O caule ramoso foliis bijnis linearibus, Stipulis semisagittatis
subulatis Lin. Suppl. p. 327. * L. V

amē. f. apicis leguminoso species to Sans Carolo Bauh. hist.
2. p. 326.

Orobus caule ramoso, foliis quaternis pennatis linearibus,
Stipulis semisagittatis subulatis Ger. prov. 493.

Orobus angustifolius ^{25 17.} B. Lin. LV p. 550.

Habitat in Gallia. 4

Folia bis. 3 jura foliola alterna angustiora quam in reliquis
nervosa. Peduncululi cincter octoflori differt ab angustifolio
caule ramoso folio floribusque albo-candenti

Orobum angustifolium italicum flore varis Tournef. inst.
r. h.

tenui foliis

O. foliis subtriquetris lineantibus: stipulis semipagittatis, cauli
inferne ramis quadrangulis, superiore alato Roth. beytr. 1 p. 20

michi ignota

vespicolor O. foliis quadrangulis: stipulis lanceolatis semisagittatis
caulis in pedunculis axillaribus angulatis ~~sof~~ ~~supra~~
pl. Ehrh. p. l. t. 107 fig. 2

non vidi

4 vernus ^{acuminatis} foliis pennatis ovatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplicis

Leg. l. V. - pannonicus 1. Clus. pann. p. 736

Orobis sylvaticus purpureus vernus Bauh. pin. 351. Thal. herb. 80. 4. 6.

Habetat in curvis borealis nemoribus 2

Tota glabra caulis striatus simplicis fimus. Folia trijug vel 4 juga
folioli acuminatis subtineris pollicantur in inferora oppositi
in superioribus alternis. Stipula lata fere semicordata acuta
Pedunculi axillares solitarii 2. vel 3 in caule 4. 5 flori folia brevis
res; ^{flor} penduli comblei

β. ? Constanti popul. lectus

Caulis angulatus pubescens. Folia 3-5 juga bi-3 pollicantur lata,
glabra, acuta. Stipula lanceolata, semisagittata. Pedunculi
axillares, longitudine foliorum, interdum 16 flori, uti calyces
pubescentes. Calycis lacinae flosae fonsa speciem ducunt hest
Desfont

5 luteus O. foliis pinnatis ovato-oblongis, stipulis rotundato-lunatis dentatis
L. S. V. pag. 661. Mart 442. Spec. pl. pag. 1020. 4

Orobus foliis ovato-lanceolatis, stipulis triangulari, caule ramis herbaceo
Gmel. hb. 4. p. 13. 4.

Orobus alpinus latifolius Bauh. prodr. 151. pa. 351.

Habitat in Sibiria, Veneta, pyrenaeorum alpibus 4

Mont. Ital

Habitat orbi veni, sed altior crasior major. Caulis striatus punctis
minutissimis adpressis super an angulatus. Folio 3-5 puga foliolis oppo
sitis p. pollicibus venosis subtus puberulis, mucronatis. Stipula
lato nervoso venoso ^{summo lanceolato} unguiculata. ^{Pedunculis} ~~racemi~~ axillares elongati
longitudine fere foliorum, multiflori flores secundis, magni Calyx
pilosus scilicet

folia 4 puga: foliola alterna, sesquipollicaria, oblonga. Peti
li pubescentes. Stipula semipollicares herb. mus.

hinc adwersa

E. niger L. caule ramoso, foliis serratis ovato-oblongis ^{supulis fistulatis} L. S. V

Orob. pannonicus Clus. hist. 2. p. 230.

Orob. sylvaticus, raris foliis Bauh. pin. 357.

Habitat in Europa boreali montibus

Caulis angulatus glaber uti tota planta. folia 5-6 serrata foliolo
alternata vel glabra opposita unguiculata mucronata. ^{supulis}
fistulata integerrima. Pedunculi folio longiores triflori.
exsiccatione nigra evadit

mon

7 Sylvaticus O. caule ramis hirsuto decumbente, ^{Stipulis dentatis} foliis ~~subseptemjugis~~ ^{lin. s. v}
pag. ^{legit. fl. Scot. 1. pag. 390 Feb. 16.}

Orobis Sylvaticus nostras Ray. angl. 3. p. 324. Act. panf. 170 b. 190

Habitat in Anglia Gellia 4

varia foliis 12 jugis.

facies viciae cap. Caulis ^{stipulis} ~~angulatus~~ ^{stipulis} hirsutus folia 7-12 jugis. Follicula albem-
bricia ad cithus ^{membranata} vel subopposita ovata lanceolata angusta, unguicularia, hirsuta
nullus vel glabripila. Petiolus mucrone terminatus. Stipula
inferiori semiovali sagittata membranacea latiore, superiori
angustiore basi denticulata. Pedunculus folio longior sub
12 floris arcuatus deorsum. Calycis pilosissimi

8 Tuberosus O. foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simpliciter Can. L. V. Th. San. Tab. 701.

Astragalus sylvaticus Thal. her. 7. 4. 1.

Astragalus sylvaticus; foliis oblongis glabris Bauh. pin. 351.

Lathyrus angustifolius, radice tuberosa Loef. prof. 130. 737.

13. latifolius ^{foliis latioribus}
Habitat in Europa boreali praevalens.

Caulis simplicis sive triangularis a membranis Venus sive dei amantibus;

uti tota planta glabra folia bis triplex opposita mucronata

Stipulae unguiculares. Pedunculi 1 vel 2 in caule longitudi-
ne foliorum 3-4 flori.

orobus tenuifolius Roth. beytr.
versicolor Ehrh.