

Osteethia

1. Chianensis O. foliis sepelevis, pedunculis terminalibus ternis bracteatis
2. zeylanica O. foliis petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris nudis

2 Zeylanica *Officinalis* foliis petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris nudis Lin. Suppl. pag
215. l. V. p 357.

Habitat in Zeylona

Planta palmarum vel parum ultra, erecta caule simplicissimo & teretissimo
Folia secundum angulum pilosa. Folia opposita petiolata, remotis ^{utrinque} ~~petiolis~~ ^{petiolis} ~~ad presens~~
paucis, oblongis, trinerviis, ~~nervis~~ ^{hispidis}, margine subulnata. Petiolus
basi setis nonnullis Pedunculi breves calycis campanulati setis stella
tis hispidi.

caule herbarico

calycibus hispidis

Shenerpis *Ophecia* foliis sessilibus, pedunculis ^{terminalibus ternis} ~~stillas~~ ^{inflasi} bracteatis lin
S.V. pag. 357. Off. A. 213. t. 24. Rec. pl. p. 490 *

Echinophora maderapontana, fidentis non serratis nervosis foliis, fructu
capfulari caucalidis Smulo Pluh. alm. 132. t. 173. fig. 4.

Madali maderapontanum minus, capfuli pelosi Poir. suppl. app. 236.

Habitat in India

Habitus melastomo caulis erectus bracteatus tetragonus, pilis adpressis

hu
♀ margine ^{sub} nervis
et costa ^{sub} fatis
adpressis ^{sub} ceterum
♀ fatis plures ad
proculum ad
culm
♀ apice ^{sub} serrata
ter minati

adpressis ^{annota} foliis lanceolata ^{trinnaria} [♀] nervi et margine ^{sub} scabra
subsessilia ^{sub} pollicana. Flores in apice ^{sub} ramorum ^{sub} terminales

terni, sessiles, bracteis foliis & cincti flore longioribus. Calyx
quinquefidius laciniis lanceolatis margine ^{sub} serratis ^{sub} spiculosis, disci

duo fructi ^{sub} ferus ^{sub} stratus ^{sub} truncatus

foliis calycibusque subglabri caule fructuoso