

Osmites

1. bellidiflorum O. foliis linearibus carnosissimis tomentosis, calycibus solitariis
2. camphorina O. foliis lanceolatis cuneiformibus dentato serratis. inferioribus oppositis superioribus alternis
3. asperifloris O. foliis lanceolatis tomentosis nervosis integerrimis serratis, calycibus solitariis aequalibus
4. calycina O. foliis lanceolatis subtus nervosis, calycibus lanosis imbricatis

Osmunda?

Habitat in Cap. b. p. 4

fructu osu. Rami aggregati, uniflori.

Bellidiastrum O. foliis lineari-bus ^{carneis} ~~enerviis~~ tomentosi ~~triquetris~~, Calycibus ^{sub} ~~triquetris~~ solita

^{nis}
Bellidiastrum puberulum Linifolium Vaell. in Act. Par. 5 88.

Anthemis fruticosa: suffruticosa, foliis lineari-bus triquetris tomentosis
in divisi floribus sesplibus Lin. Am. 4. p. 330. *

Smilax bellidiastrum: foliis lineari-bus carneis, calycibus planis
Lin. S. V. p. 703.

Habitat in Cap. 6. spec. 5

Patulis a foliis deciduis fiabet. Folia subulata-linearia, conferta
superiora magis tomentosa. Flores terminalis solitarii sesplis.
Calyx ~~triquetris~~ embriatus folioli: apice membrana sublanicolata,
concaeva aucta. Pediculus albus Lin.

non vidi.

affensoides O. Folis lanceolatis tomentosi nervis integerrimis serratis ve
calycibus ^{soliois} equalibus

Bellis frutescens africana camphorata Raj suppl. 221.

Bellis aquatica camphorata umbellata frutescens Seb. mus:
-17.16 fig. 4.

Leucanthemum fruticosum, folis crassis. Burm. afr. 161. t. 58. fig. 1.

ofmites affensoides folis lanceolatis punctatis, caulis folis
fr. ten. Lin. An. afr. 6. p. 105. n. 79. t. V. pag 703. Berg

Cap. 477

Habitat in Cap. b. p. 477

Rami teretes tomentosi, uti folia et calycis. Folia alterna se
suptia
quentia. Pedunculi vespis apicem, axillares alterni fastigia
ti. Pedus albus calycis longior

Calyculina O. foliis lanceolatis ^{subtus} nervosis, Calycibus paucis imbricatis.
Synonyma calyculina: foliis lanceolatis nudis, Calycibus paucis ^{linea} ~~linea~~ ^{scissa}
No. 3004 P.V. 1783. L. Kentus
Habitat in C. b. p. 17

Caulis prolixi rami ^{frequentia erecta} teretes pubescenti. Folia alternasessilia lineari lanceolata, ^{subtus}
^{opposita} ^{nervosa} villosa supra nudiuscula. ^{strobiliformi} ^{terminali} solitarii
^{lobis} Calycis foliola oblonga imbricata interiora ^{interiora} ^{interiora}
duo longitudine dista corolla. Corolla lutea

— integerrimus trinervis.

acaulis L.

^{carex formosa}
~~dentata~~
camphorina O foliis lanceolatis ^{superne} serratis basi dentatis ^{inferioribus quorundam spec. uterque} ~~lin. am. Acad. 6. p. 105 n. 78~~ ^{Am. Acad. 6. p. 104 n. 75}
Bellis camphorina africana aquatica flore albo Seb. mus. 1. p. 143. t. 90.

fig. 2.

~~Opuntia camphorina foliis lanceolatis serratis basi dentatis~~ ~~lin. am. Acad. 6. p. 105 n. 78~~
13. Anthemis leucanthema spec. pl. 1261. Am. Acad. 6. p. 104 n. 75

Habitat in C. bono p. 15

Caules plures caespitosi basi lignosi lignosi simplicissimi pedalis glabri
uti tota planta. Folia infima basi coalita ^{proleptana} ~~superne~~ serrata
minoru glabra aeterna, profunde remote dentata serrata ^{superne}
ma linearia integerrima Pedunculis ternatis adpressis foliis linearibus
integerrimis glabris. Anifloris. Follicula calycina oblonga inaequalia