

Osmonda

Osmunda cervina frondibus sterilibus pennatis: pinnis ovato-ensiformibus integerrimis, fertilibus bipinnatis: pinnis linearibus.
Osmunda lingua cervina folio Plum. filic: pag. 132. tab 154.

Osmunda lingua cervina scapo radicato, fronde pinnata: pinnis integerrimis. Lin. Syst. veget. pag. 987.

In Montserrat legit Ryan.

Stipites plures, inferne fere crassitie penne anserinae, pedales, altero latere convexiusculi, altero striati, pallidi, glabri: frondium fertiliu[m] parum crassiores, purpurascens.

Frondes steriles tripedales, pinnatae cum impari. Pinna breviter petiolata, alterna, sex vel octo pollicares, ~~infera~~ et pollicari duos lato, inferior et extrema minores, ovato-sub-ensiformes, attenuatae, ad insertionem petioli et apice acuta; latere superiore bases oblique, inferior ^{saep} angustiores et saepe
verte

parum breviores, integerrime, submarginata, utrinque glabra, confestim
subtilissima nervoso-substriata: nervi simplicissimi. ~~Bope~~ bi- sive tripar
viti. ~~Fraxinea~~

Frons fertile bipinnata. Pinna quindecim jago, alterna, petiolata, cir-
cumscriptione lanceolata, attenuata, quinque vel sex pollicares;
inferiores et superiores breviores; ~~intermediae triginta sex jago~~ Pinna
la ~~intermediae~~ ^{in pinnis intermediis,} triginta sex jago, pauciores in ~~pinnis~~ ^{pinnis} superioribus et
inferioribus, alterna, lineares, angustae, unguiculares, acutiuscu-
lae, extrorsum versus sensim decrescentes, interiores remotiores
extrema subdistincta

Rachis furca, glabra

biterata Opunda

Habitat herb. Desfont.

^{frigidum} Stipites ⁴⁻tripollicares. Solia petiolata, unguiculata, ovata, terminata
magis prostratum, saepe tri-loba. Scapus folio longior: piceo & ramoso pmi-
tis Op. lunana.

urticoides *Osundo*

Habitat in Philippinis herb. fusca, 4 pollicaria

(4 in 4 pollicaria)

Folia radicalia, subtripinnata: foliola petiolata, vix pollicaria, lanceolata: pinnu-
la inferior distincta, oblonga, pinnatura una altera subinverso, exteriora confluen-
tia, integerrima obtusa: petioli villosi. Scapus pedalis, aphyllus, inferne ad presus-
satis subulatis, paleaceis, raris. Racemi terminalis, compositi. Pedunculi particu-
laris alterni, pollicares, filiferi. Flores in glomerulis magnitudine formae saepe
ori alternis, distantibus, infimo pedicellato

punctata Opunda

Habitata in insula Bourbonia Commespa ex herb. Thouni

Stipite basi paleis longis setaceis, femineis pollicibus verti eque ac ra
chis, ^{folymis frenticum} superne glabris, triquetris. Frons pennata: stamini pedalis: foliola
populea, alterna, bi-³ pollicaria, interna et externa ^{caniccolata} ^{minora}, ob
tusissima, glabra, coria, ^{nervosa} subrotunda supra nitidissima, terminale lon
gior basi lato subrotundo, ^{vee} subtus pallidiora, margine confertim impresso
punctata. Fertiles altiores: pinna petiolata, alterna, lineares, interne
dic. ² quadripollicares, membrana utriusque fructificationem tegens utraque sur
se aperens, demum patens, margine laeviss
prope Op. Fruth: ponenda

Opuntia

Habitat in Carolina herb. Vent

Cactaceae indurpi vel bipartiti raro tripartiti

Stipites glabri, striati. Troncus verrucosus, subpinnato. pinnis lanceolatis
pinnatifido vel oblonga, serrulata, glabra, avanis, enerve; terminali pollicari major.
Scapus fructiferus foliatus, et tenore foliolo pinnato reliqua simplicia.

Suaecolens Opunda

Habitat in monte vides Commerf. herb. Guss.
Stipites teretes, hispiti, superne angulati, 5que pollicares. Folium unicum
bipennatum: pennula adnata, ovato sublinata, semiunguiculari, hispiti
scapi gemini terminaliter, erecti, longitudine stipitis. Fructificationes
bipennatae.
Odor aromaticus Commerf. ab hispito Diversum

Thunifera Opunda

Habitat in Insula Bourbonia Comnespa herb. Aus.

Stipites plures, spithamoi villosuli. Eomis pennata: pinna ovata,
sepias alterna, unguiculari, inciso; lobi crenulati, fructificantes superne
pinnato cuspa.

Thunifera insularis

Opuntia

Opuntia canadensis myrtilifolia Hort. Monspel. 207 cum fructu

Habitat in Canada herb. Mus.

Radices fasciculati, longi, teretes. Scapi teretes, glabri. Folia terna, subtri-
pinnata: pinnae lineares, decurrentes, subserratae, glabrae. Scapus solitari-
us, pedalis. Spica racemosa, compacta, alterna

Stenota Osmunda

Habitat ad Rio Janeiro Dombey herb. Guss.

Stipites semiteretes, scabriusculi. Rhizis solitarius, pennatus, leaflets: pinnis lanceolato, infimo subretolato, obtuse, lobis oblongis, oculo armato villosulis, integerrimo obtusissimo, nervis striatis supra nitidis. Scapi floriferi gemini terminalis, uti costa foliorum villosi, scabri, 3-4 pollicares. Spica & scapodromide longioris racemose, compacte

Opunda interrupta Richard

Habitat in Virginia Richard

Stipes glaber, dorso planus, altero latere falcatus, lani. Troni pennata: pennis
pennatifida: calinis oblongis, unguiculatis, extus brevioribus, obtusis,
integerrimis, glabra, utroque oculo armato punctato. Truncus
infra apicem.

prope Claytonianam

Cunila nuda Opunda

Habitat in Carolina. Herb. Richard.

Folia Scapi terna, bipinnata inferna: pinna ovata, serrata, semunquiu
lata, sessilis, extenuis decurrentes, terminalis panem major. Scapus
palmaris vel ultra - Spica ter, ramosa, rami semipollicari

Stenifera Opuscula

Habitat Commerçon herb. musci

habes

Zeylanica C. Scapo caulino solitario, frondibus verticillatis lanceolatis
indurvis

OphioGLOSSUM laciniatum Rumph amb. 6. p. 153. t. 60. fig. 3.

Opnunda frondibus lanceolatis indurvis verticillatis terminali-
bus lin. fl. zeyl. 373.

Habitat in Zeylona, amboina

Scapus pedalis, erectus, simplicis. Folia terne, subretolata bipartita vel
unicum ^{vel omnes} tripartitum raro ternata, vel cum tripartitum album bi-
partitum, tertium bipartitum lacina altera trifida. Lacina
lanceolata, acuta tripollicaris, integerrima vel serrata, nervis trans-
versis bipartitis. Scapus floriferus terminalis, tripollicaris. Spica
pollicaris herb. 4us. f.

Lunana O. sicapo cauleno solitario, fronde pennata solitaria
fl. Dan. tab. 10.

Lunana minor Cam. epit. 643.

Lunana racemosa minor et vulgari Bauh. pin. 354.

13. Lunana raris species Cam. epit. 644.

Lunana racemosa ramosa major Bauh. pin. 355.

V. Lunana racemosa minor, adianthi folio Bryn. cent. 103.

d. 93

A Lunana minor, vitaceo folio Bauh. pin. 355.

Habitat in Europa &

Lunana racemosa multifida folio Bauh. Bryn. cent. 104. tab

95
Folia ternata, bipinnata: pinnae bipinnatifidae: lacinae lineae
res apice serratae. Scapus floriferus pedalis, Vermenalis. Spica
in medio composito habet fus.

virginica. O Scapo caulino solitario, fronde supra composita. Lin. S-V
puz.

Opuntia affodeti radice Plum. fol. 136. v. 154. Pet. fol. 160.

Tab. 9. fig. 2.

Habitat in America.

Scapus pedalis glaber. Folia ternata, petiolata, tripinnata, palma-
ria et ultra: pinna alterna, semiconiularis, lineares, deorsum
tenuissime serrata, glabra. Scapi florum terminales, 4 polli-
cines. Specimen a ramosa pollicari herb. Tus.

Ternata O. f. capo caulino solitario, fronde tripartita supra decompilata

Thunb. fl. Cap. p. 1. V. pag. 927.

Habitat in Caponia

phylloidis O. scapi caulini geminis, fronde pennato, caule lori
Len. 1. V.

Osunda lanceolata et subtiliter fenata Plum. fol. 133. t. 156.

Osunda racemifera, phylloidis folio vix crenato Pet. fol. 163.
t. 8. fig. 15.

Habitat in America meridionali

herba O scapis caulinis geminis, fronda pennata, caule herbo Lin. S. V
pag.

Osmunda herpeta, *Lonchitidis folio* Plum. fol. 114. T. 157.

Lonchitidis herpeta florida Plum. am. 10. T. 26

Osmunda specis geminis Pet. fol. 164. T. 14. pag. 5.

Habitat in Martinea.

hirsuta *O. Scapis caulibus geminis, fronde bipinnata hirsuta* Lin.
L. V.

Lonchitis hirsuta flonda Plum amer. 20. 7. 26.

Osmonda molliter hirsuta et profunde laciniata Plum. fil.
130. 7. 162.

Osmonda, species geminis, villosa Pet. fil. 165. 7. 0. fig. 16.

Lunana elatior, matricaria folio, fructu duplici Sloan. hist.
1. p. 71. 7. 25. fig. 6.

Habitat in America meridionali nyctibus.

Adianthifolia O scapi caulinis geminis, fronde supradecomposita Lin.

L.V.

Opmunda, filicula folio, major Plum. fol. 135. t. 150.

Adiantum fatofum floridum Plum. amer. 29. t. 43.

Opmunda adianti nigri facie Pet. fol. 167. t. 9. fig. 1.

Lunaria elatior, *Adianthi albi folio*, duplici specie Sloan.

hist. 1. p. 71.

Habitat in Dominica & Jamaica rupibus

Cervina O. fronda pennata: pennis integerrimis Lin. S. V.

Ofmunda lingua cervina folio Plum. fol. 132. V. 154.

Ofmunda racemifera, phyllidis folio Petw. fol. 162. V. O. pag. 3.

Habitata America meridionali

bipennata O. scapo radiato, fronde pennata: pinnis pennatifidis Lin
p.v.

Opuntia latifolia (Lam.) DC. Plum. fil. 133. t. 155.

Habitat in America meridionali

Filiculisfolia O. scapo nudato paniculato, fronde supra decompofita. L.

Osunda, foliulo folio, altera Plum. fil. 130. v. 161.

Osunda, cicutis folio Pet. fil. 170. v. 9. fig. 3.

Habitat in America meridionali.

Cancea O fronde bipinnata: pinnis lanceolatis serratis Thunb.

fl. jap. pag. 9 Pl. 920.

Habitat in Japonia.

japonica O. fronde bipinnata: pinnis cordato-lanceolatis Thunb. fl.

Jap. p. LV. noz. 920

Habitat in Japonia

Enispa O. frondibus supra decompositis: pennis alternis subrotundis incisio
fl. Dan. tab. 496 Sw. in act. Holm. 1709. p. 1294

Adcañthum foliis minutim in oblongum scissis Monf. herb. 3. p. 505.
f. 14. t. 5. fig. 25.

Adcañthum foliis minutim in oblongum scissis, pediculo vix
Bauh. pin. 755.

Adcañthum album tenuifolium, raris murano accedens Bauh. herb.
3. p. 743.

Adcañthum album floridum s. feliciula pedosa crispata Plukh.
alm. 9. t. 3. fig. 2.

Habitat in Europa alpibus &

Spicant O. frondibus lanceolatis pennatifidis: Calicibus confluentibus
integerrimis parallelis fl. Dan. Tab. 99. Luc. in
Act. Holm. 1709. p. 1294

Conchitis aspera minor Cam. epit. 665.

Conchitis minor Gaertn. pen. 359.

Habitat in Europa boreali, Hispania Pyrenaeis &

regalis *O. frondibus bipennatis: apice racemiferis*

fl. Dan.

Tab. 217.

Filix palustris Dod. pempt. 473.

Filix ramosa non dentata florida Bauh. pin. 357.

Opuntia regalis f. *Filix florida* Plum. fol. 35. t. 13. fig. 4.

β. *Filix non dentata florida, foliis alternis et in summo caule
femenibus occultatis* Plukh. alm. 156. t. 101. fig. 4.

Habitata Europa, Virginia ad fluvios

Laytoniana O. frondibus pennatis: pennis pennatis fidis apice 2o angulato fructi-
ficantibus

Osmunda manana, *Dryopteris* folio, in medio caulis florifera

Pet. mus. 36

Osmunda non ramosa, *Aspid. floriferis* uno folio scapo infra
foliosos - ad nascentibus *Frax. suppl. p. 36.*

Habitat in Virginia

capensis O. frondibus pinnatis: pinnis cordato-lanceolatis crenula-
tis Len. Mant. 306. & L.V. p. 927.
Habitat inter montes Cap. b. spici

Cinnamomea O fronde pennata: pinnis pennatifidis; scapis hirsutis, racemi
oppositis compositis.

Habitat in malacandra.

Frondes steriles pennatae: pinnae lanceolatae pennatifidae bipollicari
res: lacinae ovatae obtusae. Stipites subpaleasici supra folios extra
vati: elongati lana ferruginea tecti. Racemi disci oppositi bini 4-5

Det. Richard

Struthiopteri O. Cordibus pennatis, pennis pinnatifidis, scapo fructifican
te disticho. fl. Dan. tab. 69.

Lilix palustris altera, sup. pulvere hirsuta Bauh. pin. 358
Lilia strum septentrionale ad paludre Am. rith. 175. act. petrop.

10. 8. 10.
Habitat in Europa boreali, Helvetia &