

Othonna

1. *calcarata* O. ^{tubere denudato digitato lobato plantigeno, spaxis unifloris, foliis obovato}
~~calcarata~~ ^{carinosa nuda} ~~terre, palmari,~~ foliis fasciculatis obovatis sessilibus,
pedunculis unifloris
2. *bulbosa* O. foliis oblongis nudis petiolatis, caule herbaceo, pedunculis unifloris con-
gymis.
3. *dentata* O. foliis oblongis denticulatis glabris basi attenuatis amplexicau-
lebus, floribus paniculatis.
4. *lingua* O. foliis ovato-lanceolatis integerrimis glabris, floribus corymbois, caule
herbaceo
5. *cheimifolia* O. foliis lanceolato-cuneiformibus coriaceis integerrimis, caule basi
procumbente trigono.
6. *crassifolia* O. foliis lanceolatis integerrimis subcarinatis, caule erecto
7. *arborescens* O. foliis oblongis integerrimis, caule adulescente carnosus cicatricibus
lanatis
8. *frutescens* O. foliis ovalibus subdentatis, caule frutescente
9. *paniculata* O. foliis lanceolatis crassis petiolatis subdenticulatis, floribus pani-
culatis
10. *ursifolia* O. foliis cordato-lanceolatis undulatis glabris amplexicaulebus
inferioribus nervatis

11. parviflora O. foliis lanceolatis glabris amplexicaulis, floribus paniculatis
12. heterophylla O. foliis radicalibus ovatis angulato-dentatis, caulinis lanceolatis
integerrimis
13. cuneata O. foliis lanceolato-cuneiformibus profunde dentato-serratis, pedun-
culis unifloris
14. lateriflora O. foliis lanceolatis, floribus lateralibus, pedunculis longitudine folii
15. tenuissima O. foliis filiformibus carnosissimis, caule fruticoso.
16. lini folia O. herbacea, foliis linearibus marginatis gramineis
17. encordes O. caule dichotomo imbricato, foliolis acerosis, pedunculis longissimis ex di-
versitate foliorum
18. digitata O. foliis oblongis indivisis f. digitato-dentatis, pedunculis unifloris
19. coronopifolia O. foliis oppositis lanceolatis integerrimis: superioribus sinuato-dentatis
20. trifida O. foliis trifidis linearibus carnosissimis, floribus lateralibus pedunculatis
21. trifurcata O. foliis trifido-pinnatis fide: pinnis linearibus, pedunculis latera-
libus fastigiatis
22. virginica O. foliis cuneatis indivisis
23. ciliata O. foliis pennatis fide: pinnis ovatis ciliatis, pedunculis
terminalibus elongatis unifloris
24. capillaris O. foliis lyotis, ramis capillaribus

25. *minata* O. foliis pinnatifidis imbricatis incurvis: pinnis triquetris subulatis,
 caule dichotomo, pedunculis exdivinatis.
26. *pinnata* O. foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis integerrimis decurrentibus.
27. *pectinata* O. foliis pinnatifidis linearibus pectinatis tomentosis.
28. *athanasia* O. foliis pinnatifidiformibus calyce hemisphaerico quodecim
 dentato.
29. *argentea* O. foliis pinnatis linearibus subdentatis nudis, caule herbaeo.
30. *abrotanifolia* O. foliis pinnatis filiformibus, pedunculis elongatis unifloris.

nuda caulis Othonna

Habitat in Cap. b. p. Atab. Boya. O.

Caules herbacei, filiformes, aphylli, nisi folio minuto sub pedunculis, simpliciter, spitha-
mici. Folia petiolata sinuata, semi-pollicaria: lobi obtusi, integerrimi, inferne respu-
sissimi minores, glabra. Pedunculi superne 3-4 flori. Flores parvi. Calyx quinque-
partitus.

confer una Othonna capellani

Virgata Othonna

Habitat in Cup. b. spec.

Caulis herbaceus; strictus, uti tota planta glabra, superne in ramis floriferis divaricatis, suban-
gularibus a canna et marginibus foliorum decurrentibus. Folia lanceolata ad angu-
los, coccinea, acuta, basi in petiolum attenuata, bipollicina superius saepe minor
Rami floriferi elongati, erecti. Pedunculi pauci, singuli 1-2 flori. Flores Ballidis
Duplo minoris. Calyx simplex foliolis 6, glabris margine vix membranaceo. Radus
5-florus. Receptaculum parvum.

an Cineraria?

umbriata Othonna foliis cuneatis umbriatis, pedunculis lateralibus unifloris.

Habitatio cap. b. sp. herb. Provençæ &

Ordet. Ramis glabris, & caulis foliorum denticulatis. Folia frequentissima, ^{ramis teretibus} sessilia, cuneata-subpinnatifida, unguiculata, glabra, ramis pedunculi axillares, pollicari. Calyx bipartitus.

confer cum Othonna umbriata

vestita Othonna foliis oblongo hastatis amplexicaulis dentatis glabris, floribus
corymbosis

Habitat in Cap. b. spec. herb. Royeni

Caulis (on ramis) suffruticosus, striatus, crassa pernis anserina. Sola bipollicari,
asencia, frequentia, acuta, enervia, inferne v. c. angustata, basi dilatata ha-
statis, ramorum floriferorum cordato-lanceolata. Rami floriferi fastigiat-
i ramuli alterni, globosus, 2-3 floris. foliolum lineare sub pedicellis. Calyx
et corollae. Flores curvi

Sinecis

Canizensis? Murmanni

Caulis foliis 2-3 instructus; pedalis et ultra, & illoso striatus; superne in pedunculatos
divisus; pedunculi plerumque simplices, raro inferne bifidi

Aster

polifolius

var. Lin: Caulis fruticosus. Ramis tomentosis, inanis. Pedunculi elongati unistri. Folia
linearia

Orithmiofolia Othonna

Habitat in Cap. b. p. h. b. Royeni 5

Caulis frut. copiosus; rami erecti, glabri, crassitie pennis asperis. Folia pennata,
tri-polluciana: foliola filiformia, byllicana, opposita, acuta, glabra. Pedunculus
terminalis, erectus, elongatus. Flor. magnus. Calyx hemisphaericus multidentatus

Othonna

~~Habitat in Cap. b. frei~~
Tolia pennata

habes

rigida Othonna

Habitat in Cap. 1 spec. herb. Royani 5

Rami glabri, ciliati, aggregati, verticillati, rigidi. Folia frequentia, septem
sempollucaria, integerrima, lanceolata, glabra, avenae, enervi, acuta, sub
umbriata. Pedunculi superne, axillares; longitudine foliorum, filiformes, uniflo
ri, Cal. 8 partibus

a latiflora Lin forte non diversa

Athanasia Othonna

Habitat in Cap-6. per Herb. Royani 3

Rami subdichotomi, glabri, erecti. Folia 3-fida vel pennata, bi vel tri-pollia
na, glabra, tri-4-jeva. foliola distantia, subopposita, subtartia. Pedunculi e
dichotomus ultimus et apice, elongati, erecti, uniflori, vertes, striati, gla
bri, Calyx glaber radii flosculi longi

hastata *Othonna* foliis ovatis hastatis integerrimis, corymbis terminalibus compositis

Habitat in cap. b. p. her. Proymii

Caulis herbaceus, erectus, tenuis fere striatus, glaber, ut tota planta. Folia caulina (inferiora non vidi), remotissima, crassiuscula, alterna, avenia, enervia, acuta, pollicaria. Pedunculi superne, alterni, fastigati. Flores in corymbis composito, parvi. Calyx simplex, octopartitus. Radius ophiurus. Receptaculum fere punctatum.

, caicalioides Othonna Carnosa nuda lavis, palmatis, foliis fasciculatis obovatis
sessilibus, pedunculis unifloris Lin. Suppl. 3 & Bot. V. p. 794.

Habitat in Cap. bono spei.

Differt. in primo caule carnosus, glabro, caicaliorum et flore Othonnae. Cuius
caespitium rotundo, tomentoso Lin. l. c.

Alia caicalioides tubera denudato digitato lobato plantigeno, scapis unifloris,
foliis obovatis digitatis Hort. Vind. T. 3. p. 276

~~non vid.~~

bulbosa Othonna foliis oblongis nudis petiolatis, caule herbacea, pedunculis unifloris longissimis
2 Lin. Spec. pl. pag. 1309. v. p. 793.

Gaioboa affinis planta Tuberosa capitis b. spec. Bryn. Cent. t. 66. Monf. h. 3. p. 111. f. 9.
t. 10. fig. 33.

β. Solidago foliis oblongis dentatis glabris floribus magnis Burm. afr. 164. t. 59.

Othonna dentata, foliis ovato cuneiformibus dentatis Lin. Spec. pl. 1. p. 926.

Othonna dentata Burm. prodr.

Habitat in Othiopia 4.

planta polymorpha. Folia floralia ad pedunculos saepe opposita. Racemi
saepe bini. Calycis quinque partiti.

Varia a herbacea, foliis ovatis integerrimis.

β. herbacea, foliis lanceolatis integerrimis

γ. herbacea, foliis lanceolatis dentatis

δ. herbacea, foliis lanceolato subellipticis

ε. herbacea, foliis sublanceolatis tridentatis

ζ. fruticosa, foliis apicis lanceolatis subsessilibus

η. fruticosa, foliis alternis lanceolatis, dentatis Lin. Spec. 1.

3 *Dentata* *Othonna* foliis ovatis amplexi caulis denticulatis basi angustatis, floribus
paniculatis corymbosis

Habitat in Cap. bono spei

Caulis herbarius est, ramosus, striatus, crassitie penna cygnea. Folia

crassiuscula ~~late~~^{ob}ovata tripollitana, rarsa et majora glauca
omnes inaequaliter denticulata. Pedunculi ramosi terminales
ramosi flores parvi subsessile. Calyx octopartitus

Othonna denticulata foliis oblongis denticulatis glabris basi attenuatis amplexi
caulibus floribus paniculatis Hort. kew. 3. p. 276

4 *Lingua Othorona* foliis ovato-lanceolatis integerrimis glanis, floribus corymbois
caule herbaceo

Othorona lingua foliis ovato-lanceolatis semiamplexicaulis Lin. Suppl.
p. 387.

Habitat in Cap. b. spec.

Caulis crassus, penno cygneos, simplex glaber uti tota planta, striatus. Folia amplexicaulia, extropium latera, concava avenia mucronata, inferne approximata, superne remotiora sensim majora summa floralia cordato lanceolata. Pedunculi superne laterales et terminales solitarii 3-2. pollicares. Pedicelli corymbis compositis, pedicelli feti formis basi foliola la subulata. Flores parvi. Calycis profunde octodentati

4 cheirifolia Oth. foliis lanceolatis cuneiformibus coriaceis integerrimis caule basi
procumbente lignoso.

Officinalis quae opus africanus luteus, foliis thymelae Raj suppl. 167.?

Thonnia cheirifolia foliis lanceolatis trinerviis integerrimis, caule suffru-
tioso repente Lin. S. V. pag. 794. Mull. L. 245. fig. 1. Duham. arb.
2. p. 94. t. 17

Habitat Morspelia, Barbana & procumbens

Caulis basi ^{subter} suffruticosus, pedalis ramis, pedalis rami pedales, villosi,
et exsertit e pinnis antheras, herbacei subramosi. Folia copiosa
remotiuscula, tripollicaria & minora, coriacea, arena
obscura ^{tri nervia} acuta in fiula, frequentia, glabra. Pedunculus
terminalis pollicaris. Florae magnitudine juglandis. Calyx
12partitus laciniis lanceolatis

6 *Crassifolia* *Obkonna* foliis lanceolatis integerrimis subcarnosis, caule erecto Lin. M. 110. S. V. p.
794. Hort. Cliff. 419. Mill. Dict. 163. t. 245. f. 2.

Jacobaea africana frutescens, crassis et succulentis foliis Comm. hort. 2. p. 147. t. 74
Raii suppl. 174.

Habitat ad C. b. p. e. t. y.

Similis *O. Cheiri* folio, sed erecta, quadripedalis.

Folia superne approximata basi in petiolum attenuata mucronata, areolaria
prollisaria glabra. Peduncululi terminales solitarii uniflori
tri-polllicari adpressi foliolis aliquot lanceolatis. Calyx 5 dentatus
dentibus ovatis, acutis flos magnitudine nucis congl.

7 aborescens Othonna foliis oblongis integerrimis, caule abrosciente carnosio cicutricibus lanatis
L. S. V. 795.

Doni africana abroscens, floribus singularibus Dill. Elth. 123. V. 103. f. 123.

Habitat in Othopia h.

Calyx 5 fidus; radius quinque floris

noni vidi

frutescens *Othonna* foliis ovalibus subdentatis, caule frutescente Mart. 2884 & L. VI. p. 796
Gacoba africana frutescens, crassis et succulentis foliis Com. Hort. 2. p. 147. t.
76. Paj. suppl. p. 174.

Cineraria othonnoides L. Spec. pl. pag. 1244.

Habitat in Cap. b. freit

Caulis erectus, glaber, teres, lavis. Folia alterna subpetiolata, obovata
(suprema lanceolata) avenae, oleracea, glauco vespertina (Brassica
viridis) mucrone minuto; inferiora integerrima, media basi bidentata,
summa lateribus dentata; omnia dorso subdecurrentia. Et singulis
alio foliola ramorum rudimenta. Pedunculi e summitate caulis
palmares, uni flori, alterni, pauci, filiformes, erecti, foliolis
aliquot minutis. Calyx cyathineus, obtusus, aequalis, octofidus.
Radius octopetalus, luteus, lanceolatus subtridentatus, calycis duplo
longior. Semina radii brevissima Pappo capillari, copioso, calycis
longitudine. ab *Arbores* differt foliis remotis dentatis, nec confertis
subintegerrimis. Caule absque cicatricibus pelosis. Radio 5 petalo
nec 5 petalo. Caule tereti, ramis glabris. Pedunculis subramosis lavis.

9 paniculata *Othonna* foliis lanceolatis crassis petiolatis subdentatis, floribus panicu-

latis

Habitat in Cap. bona spei &

affinis *crassifolia*. Ramis remote mucronatis glabris. Folia polluciana obtusa basi valde attenuata in petiolum longitudine fere dimidii folii, integerrime vel deinde uno alterove in medio. Pedunculis elongatis pedalis, adpressis foliis remotis lanceolatis ^{ca} lanceolatis basi mucronatis apice superne ^{ca} reflexis in ramis nonnullis, foliolum lanceolatum ad basin pedicellorum. Pedicelli filiformes. Flores parvi octopetali laciniis ovatis acutis

10 *perfoliata*. *Stemna* foliis cordato-lanceolatis undulatis glabris amplexicaulis.
(superioribus perfoliatis?)

Habitat in Cap. b. spici

Caulis herbaeus, simplex, striatus glaber. Folia pollicaria, glaberrima,
arsenica subcoriacea. Pedunculi laterales ternariaeque solitarii
uniflori, calyx bipollicares. Calyx octopartitus. laciniis lanceolatis

11 *parviflora* *Othonna* foliis lanceolatis glabris amplexi caulibus, floribus paniculatis Berg. Cap.
335. Mant. Lin. 209. * F. V. pag. 794.

Senecio nigra L. Spec. p. 1224

Jacobaea africana frutescens, foliis longiore et glauco Com. hort. 2. p. 143. t. 72.

Habitat in P. b. sui locis aquosiss.

Caulis bipedalis teris. Folia alterna, lato-lanceolata. suprema deltoides, utrinque unidentata, glabra. Pedunculi brevissimi, laxes striati. Folia aliquot minimis, remotissimis, lanceolatis, utrinque unidentatis. Panicula parva: floribus parvis, luteis: Calyce simplicis, teris, offido. L. L. C.

Jacobaea ramosa, foliis rigido glauco per limbum affuso Raii suppl. 176. n. 35.

Jacobaea africana perennis, integro oblongo folio glauco Volk. nonb. 226. t. 226. Raii suppl. 179.

Senecio nigra corollis radiatis, foliis amplexi caulibus oblongis induratis dentatis latius medii, caule frutescente Lin. Spec. pl. p. 1224.

Caulis tener, glaber. Folia lanceolata, integerrima, semi amplexi caulium inferne attenuata, basi dilatata, avenia teris. Flores composito paniculati herb. Beyen

12 heterophylla Othona foliis radicalibus ovatis angulato-dentatis, caulinis lanceolatis
integriusculis Lin-Suppt. p. 307. Lin IV. p. 794.

Habitat in Cap. b. frei

Radix bulbosa Lin

13 ^{ata} Cuneifolia Othonna foliis lanceolato cuneiformibus profunde dentatis ^{truncatis} pedunculatis
unifloris

Habitat in Cap. bono spici

Tota glabra ramosa. Folia approximata, unguicularia cuneata,
exteriorum profunde dentata dentibus subulatis ^{fr. ovata} subpinnatis, super-
iora interdum margine crassiora: summa lanceolata. Pedunculus
terminalis uniflorus ^{ovata} bis tripollicularis. Calyx ^{ovata} 12-fidus laciniis
cuneolatis. Radius calycis parum longior

14 Cateniflora Othonna foliis lanceolatis, floribus lateralibus, pedunculis longitudine foliorum
Lac. Suppl. pag. 307* L.V. pag. 794.

Habitat in Cap. bono sp. 7.

Index caule eraspe perno cyzaco, erectus. Folia sparsa, lanceolata, sessilia, in
tergamina, glabra. Pedunculi laterales, solitarii, uniflori, longitudine folio-
rum: ovos subrotundus. Calyx subrotundus. Corolla lutea. Pedunculi et
receptacula prioris anni remanent exserta in caule - h. n. l. c.

non vidi

14 - tenuisima Othonna foliis filiformibus carnos, caule fruticoso Lin. Mant. 1187
L. V. p. 794.

Pluch. phyt. 319 fig. 5

Crasula fruticosa, foliis longis teretibus alternis, caule fruticoso ramoso
Müll. Dict. 8.

Habitat in Cap. bonopriet

Caulis lavis. Folia alterna, filiformia, lavis, patentia, parum declinata
basi angustiora. cellis ad basi foliorum. Flores lavis ignoti, an igitur
sunt generis

16 *Cinifolia* Oth. herbacea foliis lineantibus marginatis gramineis Lin. Suppl. p. 388. * R. V. p. 794.

Habitat in Cap. bono spei.

Othonna bulbosa V. Lin. Spec. pl. pag. 1309

Habitat in Cap. bono spei.

- Caulis prostratus, filiformis, teris: ramo uno alterove unifloro. Folio ra
dicalia linearia, filiformia, longitudine fere caulis, basi lanata.
Caulina tardum tria s. quatuor similia. Flores terminales, solitarii,
magnitudine pisi, lutei. Calyx suboctophyllus. Lin. l. c.

non vidi

17. *ericoides* Oth. caule dichotomo imbricato, foliis aciculis, pedunculo longissimo et divarica-
tuno solitario Lin. suppl. pag. 300 * S. V. pag. 795

Habitat in Cap. bono spei,

Trux ex *Erico* facie, erectus, foliis dichotomis. Folia *Erico*, sparsa, confertim
scula, subulata, brevia, latere distantia, incurva, laeva. Pedunculi axil-
lares longissimi, recti, laeves, uniflori. Et los subrotundus non magnus Lin. l. c.

non vidi

19 Coronopifolia Othonna foliis infimis lanceolatis integerrimis: superioribus sinuato-dentatis
Linn. S. V. p. 1794

Jacoboa africana Fritschens, coronopifolia Com. hort. 2. p. 139. t. 70. Raj. Suppl.
175.

Habitat in Othojuia

Rami teretes striati glabri uti reliqua. Sola sessilia lanceolata acuminata
inferne dentato sinuati: dentibus setaceis. Pedunculi superne ex alis supre-
mi et apice ramorum palmares aphylli; erecti, uniflori. Calyx profun-
de octofidus

100 *Digitata* *Okh.* foliis oblongis indivisis f. *Digitato-dentatis*, pedunculis unifloris *Lin.*
Suppl. pag 326. l. v. p. 794.
Habitat in Cap. b. Jpei.
Similis *O. ciliato*. Radix bulbosa *Lin.*

non vidi

angulata Oth. foliis ^{cuneatis} indivisi basi, auriculis extorsum dentato

angulatis

Habitat in Cay. b. Speitz

Stem aggregata crassa glabra arena

20 *Trifida* Othonna foliis trifidis linearibus carinis, ^{floribus} pedunculatis lateralibus unifloris
pedunculatis Lin. Suppl. pag. 307*. S.V. pag. 793.

Habitat in Cap. b. Speitz.

Trifida glaber, proliferus. Ramis e basi foliorum mucronati. Folia par-
sa unguiculata, laciniis squalebus; Lana alba in axillis superiorum.
Pedunculi ^{areolati} versus apicem ramorum axillares solitarii uniflori, sub flore
Craspedis. Calyx trifidus partibus laciniis latis oblongis acutis. Lamiis
magna Lana alba, densa, vestita.

21. *trifurcata* Okonno foliis trifido pennatifidis: pinnis linearibus; pedunculis lateralibus; fastigiatis. Gn. Suppl. p. 307. S. V. p. 794
Habitat in Cap. bono Spei

non vido

22 *virginea* Othonna foliis cuneatis incis. Lin. Suppl. pag. 389. * L. V. p. 795.

Habitat in Cap. bono spei

glaber Rami annotiniini simplicis semi teretes, prostratis et prostratis foliis
si ab ipso capite foliorum. Folia conferta sparsa, parva sessilibus erectis
sacula, plana lacinia: apice dentibus quinque vel 7. lineariibus obtu-
sifidulis: inferioribus brevioribus. Flores ex superiora parte in-
ternodiis, laterales, sparsa, solitarii parvi, cotyled. Pedunculati
uni flori foliis longioribus. Calyx simplicis 7 partibus laciniis acutis, persi-
stens. Discus latus, convexus: floriculis quinquefidis. Pappus simplicis
sessilibus Lin. l. c.

23 ciliata *Obhonna* foliis pennatis-fidis pappilibus: pennis ovatis ciliatis, pedunculatis
terminalibus elongatis unifloris *Lin. Suppl. p. 386. l. v. p. 794.*
Habitat in Cap. bono spei.

non vidi

24 Capullan^o Oth. foliis lyratis, ramis capullanibus in Suppl. 300* S.V. pag 795.

Habitat in Cap. bono spei O

Radix fibrosa tenuissima. Folia radicialia et unum alterumve caulium, lyrata, pollicana, lora. Caulis erecti, palmari, liliiformes, ramosi: ramis tan dem setaceis et capullaceis, loricibus. Flores terminalis, magnitudine in seminis Cannabis. Calyx pentaphyllus, ovatus, acutus. Len. l. c.

25-munita *Othonna* foliis pennatis-fidis imbricatis incurvis: pennis iniquis subulatis; caule
dichotomo, pedunculis et divaricatis Lin. suppl. pag. 300. *P. A.* p. 794.
Habitat in Cap. bono spei
Similem *O. Encoides* ad differt tantummodo foliis pennatis-fidis hinc l. c.

non vidi

26 pennata *Othonna foliis pinnatifidis, pinnis lanceolatis integerrimis decurrenti-*
bis. Lin. Suppl. pag. 307. S. V. pag. 794.

Othonna bulbosa. B. dea. spec. pag. 1309

Habitat in Cap. bono spec.

Caulis herbaceus, fructus simplex folia radicalia pennata, caulina
pinnatifida remota amplexicaulia, laciniis linearibus lanceolatis
summa integra lanceolata. Pedunculus caulem terminat
elongatus, aphyllus, uniflorus.

27 pectinata Othonna foliis pennatifidis lineari-bus pectinatis tomentosis.

Jacobaea africana frutescens, foliis abanthii umbelliferi incanis Com. hort.
2. p. 137. t. 69. Raj. suppl.

Othonna pectinata foliis pennatifidis. laciniis linearibus parallelis. Lin.

N. pag. 193. Mill. Dict. t. 194. fig. 2.

B. Jacobaea abanthites, tomentosis cineris foliis, othionica, calyce integro
summi oris dentato Plur. alm. 106.

Habitat in Cap. b. Spey.

Caulis e caepe foliosum cicutinatus Ramis uti foliis tomentosis incanis.

Folia conferta sequi pollicaria; pinna lineari subopposita, integra
obtusis. Pedunculis terminalibus, erectis palmatis aphyllis. Calyx
profunde quoadaeque dentatus

20 Athanasia *Athanasia* foliis pennatis pili ferocibus, calycis hemisphaerico ^{uodem} ~~dentato~~

Habitata Cap. bono spec. 7.

Caulis fruticosus *Athanasia*, proli ferus, lavis. Folia alterna, remota, pennata, pili
formia, trijuga cum impari, nuda. Stos majus scelus terminalis e dicto
tomia: pedunculo unifloro, foliis duplo longiore, tereti. Calyx monophyllus
hemisphaericus, margine superioris 12 dentatus, lavis. Corolla lutea, radio
et disco. Radius calycis duplo longior. Semina papposa. Lenl.

quomodo differt ab *oth. abrotanifolia* an calycis monophyllis diversa? ^{non vidi}

abrotanifolia Othonna foliis pennatis filiformibus, pedunculis elongatis unifloris
Asteroplatycarpus africana frutescens, cithmi mantimifolius Commel herb.
2. p. 63. t. 32.

Jacobaea africana frutescens, foliis abrotani s. cithmi major et minor Plur. Clus.
Alm. p. 144. t. 323. fig. 4. 2. Ray. Suppl. 179. Volk. nov. 225. t. 225. Seb.
mus. 2. t. 23. fig. 6.

Othonna abrotanifolia foliis ^{pennatis} multijugis, caulis geniculis villosis.
Lin. S. V. pag. pag. 1793.

Cineraria abrotanifolia frutescens foliis densè approximatis pennatis: pennis
filiformibus pedunculis unifloris Berg. Cap. pag. 292.

Habitat in Cap. bono sicut ^{adapicis ramorum congesta} marginati
Rami dichotomi glabri folia approximata, sparsa, pollicaria, glabra
pennis utrinque binis vel tres. Pedunculi ex dichotomia spithamoi. Vertices
aphylli basi striati, basi lana densa alba, uniflori. Calyx monophyllus
glaber, striatus 12-13 fediis

an hoc Othonna Athanasia Suppl. an abrotanifolia differet calyce polyphyllis

29 Tagetes Othonna foliis pennatis lineariibus subdentatis q' nudis ^{caule herbaceo} des. L. V. pag. 793. Murr. Com
Gott. 1780. p. 17. t. 5.

Chrysanthemum africanum parvulum ramosum, foliis tenuissimis Rej. Suppl. 212.

Tagetes minimus tenuiter discip. folio Breyer. prod. 2. p. 99.

Habitat in Cap. b. spec. O

Planta pedalis glabra, Caule simplicissimo. foliis remotis; penna exteiores
maiores exteiorum latiores dentatae una alterave profundo. Pedunculi termi-
nales et ex axillis supremis, rari, uniflori, squamis aliquot adpressis apice
inermis. Calyx glaberrimus 12-14 dentatus.