

Orieda

1. pumosa O. foliis ovalebus dentatis
2. mitis O. foliis lanceolatis subrepandis

mitis D. v. e. d. a.

Spinosa O foliis ovalibus dentatis den. 5. V
Valde cordatifolio, fructu subindeo Plum gen. 14. ii. 256.
Habitat in america meridionali oblonga dentata
Inter folia opposita, petiolata, lanceolata, subrepanda, glabra
Corymbi dichotomi flores corymbosi
Rami cortice griseo, oppositi, superne punctati, villosi, alternatim con
pressi sub foliis dilatati. Folia petiolata, oblonga, vel elliptica bip.
In pollicaria ducta, basi interdum subovata, spinosa-dentata, supra
glabra, nitida, cuscula scabiuscula, acuta, subtus venoso reticulata
villosa. Petiolus semunquivalaris. Fasciculi florum terminaliter
bracteae lanceolatae in cuspidate flexili desinentes, uti lacinis caly
cis, villosi. Corolla tubus villosus luteus
Flori secund. manuscript. Plumieri plerumque trifidi. Germina
superius nec inferius

mitis O. foliis lanceolatis subrepandis Burm. ind. 7. 40. Spec. pl. p. 889 +
F. V. p.

Habitat in Java

Folia opposita, fruticosa utraque glabra venosa, subtus
pallidiora obscure repanda. Corymbi axillares. Calicis
calycis coriacis ovata acuta duobus minoribus. Tubus
corolla palmari

forte eadem planta ac
Siphonanthus