

Oxalis

* foliis simplicibus

1. monophylla O. foliis ovatis induratis

** foliis ternatis

a. caulis scapi uniflori

2. minuta O. folioli oblongi glabri

3. punctata O. folioli obcordati punctatis glabris

4. natans O. folioli obcordatis glaucis

5. acetosella O. folioli obcordatis pilosis

6. lanata O. folioli obcordatis hispidi

7. compressa O. folioli obcordati ciliatis, petiolis compressis

8. purpurea O. folioli subrotundi ciliatis

9. longiflora O. folioli semibifidis

b. scapi umbelliferi

10. violacea O. folioli obcordati calycibus glabris

11. pes caprae O. ^{obcordati} foliolis glabris bifidis, floribus erectis
 12. cernua O. foliolis obcordatis glabris emibridis, floribus plerumque clausis cernuis
 13. uniflora O. foliolis obcordatis tomentosis, calycibus obtusis, filamentis hirsutis
 14. seneca O. foliolis obcordatis tomentosis, calycibus laciniis subulatis filamentis glabris

*** caule terete
 pedunculis unifloris

15. procumbens O. foliolis obcordatis hirsutis
 16. micarnata O. foliolis obcordatis glabris, caule bulbifero
 17. bifida O. foliolis cuneiformibus semibifidis, caule filiformi diffuso glabro
 18. glabra O. foliolis oblongis emarginatis glabris, caule erecto glabro
 19. hirta O. foliis subsessilibus, foliolis oblongis emarginatis glabris, caule erecto hirsuto
 20. versicolor O. foliolis linearibus callofis, caule erecto

pedunculis umbelliferis

21. repens O. foliolis obcordatis bilobis pifosis, caule repente, pedunculis subinfloris
 22. corniculata O. caule ramoso decumbente herbaceo, foliolis obcordatis glabris
 23. stricta O. foliolis obcordatis glabris, caule erecto herbaceo
 24. frutescens O. foliolis ovatis, caule erecto fruticoso
 pedunculis racemiferis
 25. Barnebyi O. pedunculis bifidis, caule erecto ramoso

*** foliis digitatis

26. flava O. foliolis tripartitis glabris, scapis unifloris

27. tomentosa O. foliolis multipartitis hirsutis, scapis unifloris

**** foliis pennatis

28. sensitiva O. foliis pennatis

triflora Otalis

procumbens Oxalis

Corniculata Otalis varietas?

Montferat in Nijan.

Caulis filiformis, basi repens, villosus: rami inferne, procumbentes.

Foliola obcordata, villosa. Stipulae ~~paucae~~ setaceae.

Pedunculis bis. tri flori

magellanica Oxalis *Bapni* uniflora, foliis ternatis. foliolo subrotundo emarginato car-
nosius Forst. in Bon. Gort. 1789. p. 33.

Habitat fretum magellanicum.

Folia petiolata. foliolo subsessile, crispum quam in congenitibus, nate
yerrima, loricis, medio sulco excavato, subtus glauca. Petioli petio-
li basi vaginulis brevissimis latis membranaceis diaphanis, divaricatis
proditis. Scapi teretes, pediculi caeterum articulati, versus apicem
bracteis oppositis linearibus, acutis, semipollicares.
Corolla ut in *acetosella*

Dodecandra Oxalis

Habitat in monte video Comnes. herb. Gusf.

Caulis plures, brevissimi, inferne aphylli, apice foliosi et flomferi. Folia petio
lata, ternata; foliola sessilia, vix unguiculata, biloba. Lobi subovati; villosi,
integerrimi, canescentes. Petioli, uti ^{scapi} villosi, pollicares vel parum ultra.
Scapi folio longiores, uniflori. Calyces lineari oblonga, villosa. Corolla fla
va. Bractea duo lineares in medio scapi. Filamenta pilosa, stylis longioribus;
6 brevioribus, 6 longioribus.

Barbeleni Oculis

Habitat herb. Tusf. O.

Caulis erectus, simplex, semipedalis, apice pilis raris adpressis. Solia petio
lata, alterna, ternata: lateralia minora, inter medio semipollicare vel parum
ultra, oblongo-ovata, ternata, glauco viridia, avenia, glabra, obtusiuscula,
petiolata. Petioli filiformes, bipollicares, glabri. Peduncululi longitudine folii,
apice villosi, bifidi: flores penduli, seiundi

*Tetropheula Otalis fœpis umbelliferis, foliis ternatis quaternatis
que foliolis obcordatis supra glaucis Casan. t. 3.
pag. 19. Tab. 237.
Habitat in Mexico. 7*

monophylla *Oxalis* foliis ovatis indivisis Hunt. Desf. pag. 8 * Lin. ~~Syl.~~ pag. 432.

Oxalis monophylla Rapa unifloro foliis simplicibus Lin. Mant. 241. * ~~Syl.~~ pag. 432

Habitat in P. bono spici 2

Folia radicalia, ovalia, longe petiolata, ^{margini} glaberrima, ^{marginem} integra emarginata, in qua
lia subpollidiana. ^{petiolo} ^{subulato} bipollidaria. Scapus erectus petiolo triplo
longior filiformis ^{simplex} ^{subulatus} uniflorus. Corolla calycis aplo longior rotata
eius purpurascens tubo glaucescente

oblongi

minuta
notans

Otali scapis unifloris folioli oblongi glabris Thunb. Desf. pag. 10. Tab 2. *

Habitat in cap. bonopei

Foliola integra glabra. Petioli glabri scapo breviores. Scapus filiformis erectus unguiculatus
- Corolla calycis multo longior. Tubus flavescens limbus albus

punctata Otalis scapis uniflori folioli ^{glabri subtus} obcordati punctatis ~~glabris~~ glaucis

Otalis punctata scapis uniflori foliis ternatis folioli obcordati punctati
Thunb. des. pag. C. V. V. pag. 432.

Habitat in Cap. b. sp. 24

Radix bulbosa. Planta ^{Digitalis} Digitalis vel primum ultra, tota glabra. Folia petio-
lata, subrotunda, plurima. Foliola obcordata supra glabra viridia, subtus
glaucis, punctato-punctata parva. petioli filiformes, pollicares.
Scapi plures erecti filiformes petiolo duplo longiores medio bracteata seta
vix apparenti. Foliola calycina lanceolata. Corolla purpurea fundo
flavescente

~~corniculata Oxalis caule decumbente herbaeae, pedunculis umbelliferis Thunb. diss. pag. 127~~

~~S. V. p. 434~~

~~Oxyflavore flore Clus. hist. 2. p. 249.~~

~~Trifolium acetosum corniculatum Bauh. Pin. 330.~~

~~Trifolium luteum minus repens, etiam procumbens Monf. hist. 2. p. 103. f. 2. v. 17.~~

~~fig. 2.~~

~~Oxalis caule ramoso diffuso, pedunculis umbelliferis Lea. spec. pl. p. 623.~~

~~Habitat in Italia, Sicilia O~~

~~Differt ab insequente fere tantummodo caule decumbente diffuso~~

natans *Oxalis spargis* unifloris, foliis ternatis foliolis obcordatis glaucis Thunb. disp. pag. 97
tab. 7. Lin. s. v. pag. 432

Habitat in cap. bono pui

Radix filiformis simplex. Folioia in superficie aquae umbellata. foliola curva
et emarginata, glabra, supra viridia subtus glauca, natula natantia.
Petioli foliorum breviores. Peduncululi 1-3. flori vix pollicares, corolla alba
Thunb. l. c.

munida Ctalis

acetosella. Oxalis scapi uniflori, foliolis obtusatis pilosis

Trifolium acetosum Brunfels. Lud. pempt. 570.

Trifolium acetosum vulgare Bauh. Pin. 330.

acetosella scapo uniflori, foliis ternatis radice squamato-articulata. Lin. Sp.

pur. 620 — Oxalis ^{acetosella} scapi uniflori foliis ternatis: foliolis obtusatis pilosis Thunb. Desf.
Lin. S. V. pag. 432.

β. Oxys flore subisuleo Tournef. Inst. 80.

γ. Oxys flore purpurea fiente Tournef. Inst. R. 4. 80.

Habitat in Europa boreali, sylvis &

Planta palmaris radice squamosa. Stipes petiolata ternata: foliolis obtusatis saepe pollicibus pilis paucis dispersis praesertim subtus; tenera petioli bi s. tri pollicares. Scapus erectus longitudine petiolorum glaber. Corolla alba, tenera, staminibus rolaceis

Canata Oxalis Scapis uniflora, foliis obcordatis hirsutis Thunb. disp. pag.

S. V. pag. 432

Habitat in Cap. b. plei

Folia ad plura ^{per} hirsutia mollia. Petioli pollicaris. Scapi erecti hirsuti super
medium bracteati. Calyx ^{5 partibus} ~~foliata~~ lanceolatus obtusifidus ^{obtusifidus}

af varietas limbo albo folioli ^{purpureo} omnibus pubescentibus, Corolla tubi flavus; Antheris

^{purpureis}
β. folioli majoribus villosis tomentosi. Corolla tota albo

compressa Oxalis scapis unifloris, foliolis obcordatis ciliatis, petiolis compressis Thunb. d. s. pag
L. v. pag. 432.

Habitat in cap. b. sui yfando

Similis cernua, a qua differt pedunculis unifloris, minori magnitudine, petiolis
compressis

Folia supra glabra viridia, subtus hispida albida. Corolla lutea Thunb.

purpurea *Oxalis* *scapo unifloris*: foliis subrotundis unifloris ciliatis
Oxys bulbosa africana rotundifolia, caulibus et floribus purpureis amplis Com.
hort. l. p. 41. t. 21.

Oxalidis affinis planta bulbosa africana, flore purpureo magno B. Reyn. cent. 102.
t. 46.

Oxys bulbosa trifolia hispida, flore albo Burm. afr. 67. t. 27. fig. 3.

Oxys africana bulbosa trifolia, flore luteo magno Seb. Thes. 1. p. 37. t. 22. f. 10

Oxalis purpurea scapo unifloris, foliis ternatis: foliolis subrotundis ^{marginatis ciliatis} len. spec.
pl. p. 621. Mart. 389. *

Oxalis purpurea scapo unifloris foliis ternatis: foliolis subrotundis ciliatis Thunb.
Desf. fig. L. V. pag. 432 *

Habitat in cap. l. spec

Folia radice laevia, subrotunda vel obovata, laevissime emarginata, supra glabra
subtus pilosa, ^{marginibus ciliatis} semiconvoluta. Cetera laevia minima. Petioli hirti
nulli ares et ultra. Scapi plures erecti petiolo breviores filiformes her-
suti. Calycis hirti foliolis lanceolatis

Longiflora *Oxalis* scapis unifloris, foliis ternatis: foliolis semibifidis. Thunb. Disf. Gen. Ox.
n. g. 4 R. V. p. 432

Oxalis longiflora, foliis ternatis semibifidis: lobis lanceolatis Lin. Spec. p. 621*

Habitat in Virginia

Caulis nūdus, simplex, squamis aliquod adpressis, e radice per terram exit termi-
natus umbella ex foliis novem et flore unico. Folia petiolato, ternata:
foliolis sessilibus, plus quam semibifidis: lobis lanceolatis: Pedunculus
uniflorus, in medio stipularum pari notatus. Flores unus longus hinc
Spec. l. c.

vergoza O. foliis ovatis, floribus verticillatis. Molen. hist. nat. Chil. p. 110
Habitat Chili.

non vid.

violacea Oxalis scapis umbelliferis, foliis ternatis obcordatis glabris, calycibus apice
callofis Lin. Spec. pl. pag. 6214

Oxys purpurea virginiana, radice lili modo ~~ita~~ nucata. Pluk. alm. 274
t. 102. fig. 4.

Oxalis caule aphyllis, flore purpureo, radice tuberosa rotunda Gron. Virg. 161.

Oxalis violacea scapis umbelliferis, foliis ternatis glabris, calycibus glabris
Thunb. Desf. J. V. pag. 433.

Habitat in Virginia, Canada &

Scapis (in culta) semipedalis erecta tenuissime pilosa, striata. Folia radicalia,
petiolata obcordata, nervosa emarginata lobis saepe plusquam pollicaria
petiolis tenuis sine pilosis. Umbella terminalis tridecim radiatis basi
saepe involucentis in volucrio deciduo. pedicelli sesquipollicares
glabri. calycis folia lanceolata apice fusco callofis. Corolla violacea

caulis
obcordato sub rotundo

Cernua Oxalis scapis umbelliferis, foliis glabris, floribus plerisque clausis cernuis
Theinb. Desf. pag. 14. t. 2. S. V. pag. 433.

Oxalis bulbosa pentaphylla et hexaphylla, floribus magnis luteis et copiosis
Burm. afr. 74. t. 29. et 1. 20. fig. 3.

Habitat in Cap. b. p. 4

Differt ab Ox. per capro scapo pedali et ultero, cotillis flavis

folia subtri in frontanea glauca poroso punctata

calycibus apice ^{prohaerentibus} subtrifidis lacinis oblongis

triflora Oxalis scapis umbelliferis, foliis orbiculatis tomentosis, calycibus obtusis, filamentis hispidis
Habitat in monte vireo?

Radix bulbosa. Folia plura a capite bulbi petiolata, foliis bilobis pilosis-tomentosis
subsericeis. Petioli tomentosi. Scapi ^{caespitales} erecti apice pedunculis tribus, basi filiformes
tomentosi sub calyce crassiores unguiculares, basi bracteas minutis inaequalibus
Calyx 5fidus villosus, laciniis linearibus obtusis. Corolla purpurea.
at Ox. sericea differt. Umbellis trifloris, calycis laciniis obtusis nec subulatis, filamentis
hispidis, ~~non~~ radice in hac bulbosa in alia sericea non sic videtur flores
violacei nec flavu

Senecio Otalio Scapis umbelliferis foliolis obcordatis tomentosis calycis laciniis subulatis fila-
mentis ^{habitis}
Otalis senecio Scapis umbelliferis, foliolis ternatis tomentosis Thunb. desf. pag. 16. t. 4
^{Habitat in Cap. b. p. m.}
Solia radicalia petiolo ^{tu} subtus tomentosa incana (juniora pubescentibus) supra
viridia pilosa, lobis unguiculatis lobis divaricatis. Petioli tri-pollicares
saepe pendentes pilosi. Scapus foliis longior saepe saepe spithameus et ultra
pilosa. Umbella 5-8 flom. Involucro polyphyllis minuto. Pedicelli pollicia
res tomentosi. Calycis foliola tomentosa, lanceolata, interdum apice sa-
pientia. Corolla flava calycis multoties major

pes capro Oxalis scapis umbelliferis, foliis glabris, floribus erectis Thunb. Desf. pag. 83
L.V. pag. 433.

Oxalis pes capro scapo umbellifero, foliis ternatis subtripartitis apice subtus
callofis Lin. Spei: pl. pag. 622. Mill. ci. 195. fig. 1.

Habitat in Cap. b. Spei 4

Folia plura ad radicem aggregata. Foliola oblongata, f. fimbriata, venosa. Petioli
filiformes, bi-pollicares. Scapus erectus palmari filiformi. Apice pedicell^{um}
culis tribus sequi pollicaribus erectis unifloris. Calyx apice flavo calloso
Corolla purpurea

Calyx apice ^{calloso} subfidi lacinus oblongi divaricati

procumbens Orali caule procumbente, ~~pedunculis~~ ⁴ uniffis, folioli obcordati hispido sermo
Habitat.

Caulis, uti tota planta ⁴ hispido sermo, ramosis, procumbens, folia alterna ^{vel in aqua} petiolata
ramorum aggregata, petiolata, levissime emarginati, pediculis longis hispido ciliato
Corolla flava

incarnata Oxalis caule bulbifero, pedunculis unifloris, folioli obcordatis glabris
Kunab. Desf. p. 10. N. p. 433.

Oxys bulbosa aethiopica minor, folio cordato, flore ex albo & purpurascens
Com. hort. 1. p. 435 t. 22.

Oxalis caule subramoso bulbifero, pedunculis unifloris, foliis passim verticillatis
Sic. folioli obcordatis Lin. spec. pl. p. 622.

Habitat in Aethiopia &

caulis ^{gaber} erectus teres, debilibus ramosis striatus. ^{vel pedalis} folia ad apicem ramorum
aggregata, petiolata. foliola intra marginem purpureo callosa, reflexa
petioli longitudine inaequalia pollicum uno et ultra. Bulbi axillares
plures. Pedunculi filiformes medio bibracteati, bracteis lanceolatis. Calyx
5partitus laciniis linearibus obtusis

bifida Oxalis caule filiformi ^{glabro} diffuso, pedunculis unifloris, foliis semibifidis

Oxalis biflora Burm. afr. prodr. Afr.

Oxalis bifida caule erecto glabro, pedunculis unifloris, foliis ternatis, foliis semibifidis Thunb. des. pag. 104 tab. 1.

Habitat in cap. b. p. ad latera fossarum 4

Caulis ramosus, filiformis, debilis, diffusus, glaber. Folia petiolata, in apicibus ramorum aggregata. Folia cuneiformia, lobis lanceolatis divaricatis acutiusculis. Petioli capillares sesqui-pollicares, interdum nonnulli breviores, squamula minuto fusca subulata ad basin pedicelli petiolorum. Pedunculus folii duplo longior, filiformis sesqui apicem, squamis binis setaceis.

glabra Otalis caule erecto glabro, pedunculis unifloris, folioli oblongis emarginatis glabris
Thunb. diss. pag 19. t. 2. * S. V. p. 433.

Habitat in Cap. bona pae 24 herb 4usf

Differt ab Ot. hirta quod foliis petiolatis, emarginatis, tota glabra. ab Ot. vesiculosa
foliis absque callo emarginatis, obovatis nec linearibus Thunb. l. l.

Planta digitata, simplex, glabra. Folia ternata: foliola pappi linearia
apice transversa vel emarginata unguiculata. Pedunculi solitarii, aut
res uniflori

~~no~~ di

herba Oxalis caule erecto hirsuto, pedunculis unifloris, foliis subsessilibus, foliolis oblongis emarginatis glabris. Desf. pery 20. L. V. p. 433

Oxys africana bulbosa, dorycnii mens petiolesum parvis foliis, floribus purpureis amplis Pluk. amalth. 164. t. 434. fig. 7.

Oxalis bulbosa, flore purpureo foliis angustis ternis hirs, flore purpureo Burm. afr. 70. t. 20. fig. 1.

Oxalis sessili folia, pedunculis unifloris, caule simplicissimo, foliis ternatis pite fructibus: foliolis indivisis Lin. mant. 241. *

β. Oxys africana, hirsutis latioribus foliis, flore magno purpureo Pluk. Am. 164

Oxys bulbosa africana, flore purpureo, foliis peltatis, pedunculis brevibus Seb. mus. 1. p. 73. t. 22. fig. 11.

Oxalis radice longa fibrosa, caulibus ramosis, foliis ternis angustis, florum petiolis longis peltatis Burm. afr. 71. t. 20. fig. 2.

Oxalis herba caule simplicissimo, pedunculis unifloris, foliis supremis compositis foliolis trilobis divaricatis Lin. mant. pery. 384

Habitat in cap. b. p. ei

Caulis sythamios, striatus purpureo-roseis inferne squamis alternis, ovatis rem-
is, medio ramo uno altiore, pilosus. Folia sessilea superne conferta
et basal foliola obovata supra glabra, subtus pilosissima, lacinis pime
emarginatis, in 3 lobata. peduncululi axillares ^{colliculares} patentes, pinnati
vellosi, sursum incrassati bibracteati, bracteis setaceis. Calyx 5-
partitus, laciniis subulatis vellosis

- versicolor Otalis caule erecto, pedunculis unifloris foliis linearibus callofis
- Oxys africana, foliis tenuissimis infummitate caulis Ray. suppl. p. 548.
- Otalis bulbosa trifolia, foliis linearibus obtuso, flore rubro, intus albo Burm. afr. 66. t. 27. fig. 1.
- Otalis ^{versicolor} caule ramoso, pedunculis unifloris, foliis passim verticillatis linearibus emarginatis, apice subtus callofis Ken. spec. pl. pag. 622.
- β. Oxalis versicolor caule erecto hirsuto, pedunculis unifloris, foliis ternatis: foliolis linearibus callofis Thunb. def.
- β. Oxalis bulbosa africana angustifolia, flore rubro obsolete amplo Ray. suppl. 570.
- Oxys africana, foliis tenuissimis, flore amplo versicolore Pluk. Amalth. 169. t. 434. fig. 5.
- Otalis bulbosa angustifolia, caule foliis flore rubro Burm. afr. 66. t. 27. fig. 2.
- Habitat in collebus et Campis Cap. b. spec. 4.

Bulbus
oblongus

Planta digitalis vel ultra, supra Terram ramo uno vel altero simplicissimo. folia in apice ramorum congesta petiolata ^{tenuis, sine angustis} ^{glabra} ^{hirsuta} linearia, unguiculata apice emarginata callofa. Petiolus longitudine foliolorum, pilosus. Pedunculi ~~et~~ plures erecti, pilosi, ses foliis longiores, versus florem uniflori versus florem bracteis binis linearibus. lacina calycis linearis apice callofa, variat foliis brevioribus longioribus

variat floribus purpureis, floribus tubo flavo margine limbi purpurei, tubo flavo super
Congitudo ~~na~~ ^{ter} flavo et rubro foliis latioribus hirsutioribus

repens Oxalis caule repente, foliis ^{subbifloris} obcordatis bilobis pilosis, pedunculis unifloris
Oxyscutea, indica, Saun. asper, Vitisyl. Rumph. Amb. lib. 5. cap. 64. pag. 277.
Umbellulobilya zeylanica Burm. Herm. Mus. zeyl. pag. 60.

Oxys zeylanica Burm. Zeyl. pag. 129

Oxalis corniculata Burm. flor. Ind. pag. 107.

Oxalis repens caule repente, pedunculis unifloris, foliis ternatis: foliolis
obcordatis herbis Thunb. Voy. pag. 1. S. V. pag. 433.

Habitat in India orientali & basi subpilosae filiformes

Caules purpurascens, ramosi, glabri. Colia petiolata, ternata, glauca,
inque montana^{is} profunde biloba, pili adpressi: lobi rotundati. Petioli filiformes, subvillosi,
pedunculi axillares solitarii, petiolo longiores floribus 3. vel plus

tuberosa O. caule ramoso, rad. ic. tuberosa, pedicell. pedunculi umbel
Liferi Mol. hist. nat. ch. p. 109
Habitat Chili

non vidi

Corniculata Oxalis caule decumbente herbaceo, pedunculis umbelliferis Thunb. diss. pag.

S. V. pag. 434.

Oxys flavo flore Clus. hist. 2 p. 249.

Trifolium acetosum corniculatum Bauh. Pin. 330

Trifolium luteum minus repens, etiam procumbens Monf. hist. 2. p. 183. f. 2. v. 17.

Fig. 2.

Oxalis caule ramofo, diffuso, pedunculis umbelliferis Lin. spec. pl. p. 623.

Habitat in Italia, Sicilia &

Differt ab insequente tantummodo caule decumbente.

Fricta Oxalis caule erecto herbaceo pedunculis umbelliferis Thunb. *Def. p.* L. V. p. 430

trifolium acetosum corniculatum luteum majus rectum indicum f. virginicum.
Monf. *hist.* 2. p. 104. f. 2. v. 17. fig. 3.

Oxysamencana erectior Tournes. *Inst. R. H.* p. 80.

Oxalis fricta caule ramoso erecto, pedunculis umbelliferis L. *Spec. pl.* pag. 624
Habitat in Virginia.

Caulis erectus, palmans vel ^{strata} ~~ultra~~, saepe ramosus, glaber. Folia ^{petiolata,} inferna alterna,
summa plura aggregata. petioli pilosi. folia obcordata glabra. Pedunculi
terminales vel laterales filiformes foliis longiores 3 vel quadriflori bracteis striatis
ad basem

Pidii umbello subdivisi unde differt a corniculata villosa L. conformis
cum figura Monf. *Ruch.*

Specimen ex America boreali vidi in herb. *Ruch.* foliis obcordatis uti caulibus
villosis

frutescens Oxalis caule erecto fruticoso, pedunculis umbelliferis Thunb. Diff. p. 7.

L. V. 1794 34

Oxalis frutescens caule fruticoso erecto, pedunculis umbelliferis, foliis ternatis ovatis: intermedio petiolato. Lin. Spec. p. 624

Oxyb. lutea frutescens, trifolii bituminosi Jacq. Plum. Spec. 2. Ic. 213. fig. 1.

Oxalis caule erecto fruticoso, foliis ternatis impari maximo Mill. Dict. 7.

Habitat in America meridionali herb. Surin.

— foliis oblongis

Caulis fruticosus, ramosus, teres, glaber. rami apice villosi. Folia frequenter, sparsa ternata: foliola vix pollicaria, lateralia minor, basilibus integerrima, apice interdum emarginato, avenia, supra ovato emarginato villosa, subtus villosa, canescentia. Petioli foliis duplo longiores, filiformes villosi. Pedunculi axillares, longitudine petioli. Umbello trifloro

non vidi

Barbeleni Oxalis caule erecto, pedunculis racemiferis Thunb. Diss. n. 23. t. V. p. 434

Trifolium acutifolium americanum, rubro flore Boell. mus. 2. p. 63. t. 51. Barret.
t. 1139.

Oxalis roseo flore erectior Tewel. penw. 2. p. 173. t. 23.

Oxalis caule ramoso erecto, pedunculis bifidis racemiferis Lin. Spec. p. 624.
Habitat in America

non vidi

flava ^{capo unifloro} Oxalis ^{ternatis} foliis ^{ternatis} glabris Thunb. Diss. pag. S. V. pag. 432.

Oxys africana bulbosa, angustis digitatis foliis, flore solitario luteo *h. Juss. pl. 544*

Oxys bulbosa, angustis digitatis foliis, flore solitario luteo *Burm. afr. 68. t. 27. f. 4*

Oxalis africana bulbosa, foliis simpliciter decaphyllis flore flavo *Burm. afr. 69.*

t. 27. fig. 5.
Oxalis bulbosa, simpliciter caule ad summum folios flore luteo *Burm. afr. 75.*

t. 30. fig. 6.
Oxalis flava ^{capo unifloro} foliis ternatis bipartitis *Lin. Spec. pl. 621.*

Habitat in Cap. b. p. 4

Planta digitalis tota glabra basi squamis imbricatis fipsis. Foliola tripartita laciniis laciniolatis, conduplicatis extrorsum incurvatis apice, sub unguiculatis. ^{non repugnans} Petiolus foliis duplo longior. Stipulus exsertus longitudine petioli feliiformis superne bractea ^{crucis} duas f. l. petiolo foliola calycina oblonga apice rotundata. Corolla flavo extus macula linearis basi non attingens purpurea

Tomentosa Oxalis foliis ^{vili} multipartitis hirsutis scapis unifloris
Oxy parva agricana, flore magno candicante, lupini foliis argenteo-fenceis
Pluk. amalth. p. 164. t. 350. 3.

Oxalis tomentosa foliis multifidis hirtis Thunb. Diss. pag. 24 + L. V. pag.

Habitat in Cap. bono frei

Folia ^{radicalia} plura, radicalia, petiolata pygmaea, 12-20 partita; ^{lanceiformi} laciniis lanceolatis
supra glabris, subtus hirsutis subaequalibus. Petioli hirti, filiformes.
Scapae erecti, plures longitudine petiolorum persisti. Lacinae calycis lanceo-
latae hirsutae. Corolla alba

Sensitiva Oxalis foliis pinnatis Thunb. *desf. pag. 42* ^{Len.} *V. p. 434*
Herba viva foliis polypodii Bauh. *Pin. 259.*

Toddavaddi Rheed. *mal. g. p. 33. t. 19*

Herba senteni Rumph. *Amb. 5. p. 301. t. 104. fig. 2.*

Oxyoides malabaria sensitiva, caule viridi glabro, flore luteo major

Garc. *act. angl. 1730. p. 379. t. 2.*

Oxalis sensitiva Jacq. *umbellifera*, foliis pinnatis *Len. fl. exl. 100**

Habitat in India

folia inferne aggregata, patentia digitalia, pinnata cum pari, plura
obovatum, oblonga, extensa sensim majora, altero latere angustiora
sessile glabra, nervosa, subtus pallidiora. Pedunculi vel stipiti, plures, striati
hirsuti foliis ^{consistit} ~~constituit~~ erecti umbel flore in umbella simpliciter plures pedicelli
breves hirsuti