

# Poonia

1. officinalis P. foliis decompositis nudis, folioli lobatis: lobi lato-lanceolati, capsulis  
tuberculatis tomentosissimis
2. corallina P. foliis biterminalibus: foliolis ovatis integris nudis, capsulis recurva-  
tis tomentosissimis
3. humilis P. foliis tripartitis laciniatis subtus subvillosis, capsulis erectis tuberculatis  
pubescentibus
4. anomala P. foliis tripartitis laciniatis: laciniis lanceolatis utrinque glabris,  
capsulis nudis depressis
5. tenuifolia P. foliis linearibus multipartitis  
~~tripartitis~~

2 corallina P. foliis bibernatis folioli ovatis integris nudis, capsulis  
sicuti uti tomentosis. Peti. obt. 3. p. 34. +  
Paeonia macroflore humilis Best. East. vern. Ed. VI. fig. 10  
Paeonia simplex latifolia trifida Mont. bot. 3. p. 354  
p. 72. tab. 1. fig. 1.

Habitat.

foliola petiolata, raro triloba. Calyx hexaphyllus  
folioli tribus <sup>in</sup> majoribus planis tribus minoribus con  
cavis. foliola subtus <sup>in</sup> pallide <sup>in</sup> virentia

1 officinalis Paeonia foliis oblongis Lin. Spec. pl. p. 747

a Paeonia folium Tuck. bot. 202. Lobel. ic. 602.

Paeonia communis folium Bauh. pin. 323.

β. Paeonia mas folis nigricanti splendido, quae mas Bauh. pin. 323.

Paeonia mas Lobel. ic. 684.

Habitata nemoribus montium Do, Helvetia &

Folia bitermata. foliola oblonga vel ovata <sup>interris</sup>

officinales foliis decompositis nudis, foliolis lobatis lobis lato-lan-  
colatis, capsulis retusatis Fomen. Topi Petri off. 3.

p. 38. x

Caulis simplex glaber

Dependentis in herbano et differentia Petrii uti fore in omnibus  
non placet vult

herb. 4. / 1 *Paeonia foemina* Lob. G. 603

*Paeonia minus laciniata* subpubescens flore purpureo Bauh.

Folia biternata: foliola 3-4 fida: lacinae lanceolatae oblongae subtus villosae.

2 *Paeonia foemina* Casp. Bauh.

*Paeonia promiscua* fruticosa folio 4 Bauh. p. 493.

Laciniae angustiores quam in precedente: folium terminale tripeditum.

3 *Paeonia flore saturata* purpureo Bauh. p. 324.

*Paeonia byzantina* L. Oler. hist. 279.

Petala plura raris: lobi foliolorum lanceolato oblongi, glabri. Flores intese purpurei.

33 humilis P. foliis ~~biter~~ tripartito-lacinatis subtus subvillosis,  
capsulis erectis pilis ~~sub~~ pilosis Retz. obs. 3. p. 35.  
Poonia comuna lacinata subtus pubescens flore purpureo  
Monif. hist. p. 3. p. 355. fol. 8.  
41 aliter.

Caulis sesquipedalis, simplex glaber. Folia biternata  
petiolo omnibus trifido. Solum terminale tripar-  
tatum laciniis sublinearibus trifido incis: latera  
lia bipartita iterumque incisa: laciniis omnibus cin-  
tri supra copia subtus albidiora pubescentia Retz.

integra - P foliis biternatis: folioli integri ovatis, corolla  
regulari integerrima Mann. in Com. Goll. 1704. Ps.  
pag. 92

Habitat

an eadem ac corallina mihi ignota

4 anomala P. calyce folioso, capsulis glabris depressis Lin. Mant. 247.4 f. v. p. 502

Paeonia fructibus quinque glabris patentibus Gmel. Feb 4. p. 184. v. 72.

Habitat in omni Sibiria <sup>Yuziflora</sup> <sup>rustica</sup> <sup>terrata</sup>

Caulis <sup>sternatus</sup> glaber. Folia petiolata <sup>puberula</sup> foliola  
fistilia profunde <sup>pl. bis</sup> <sup>pluribus</sup> <sup>super</sup> <sup>laciniis</sup> <sup>lanceolatis</sup>  
attenuata. Calycis foliola <sup>apice</sup> <sup>lanceolatae</sup> <sup>longitudo</sup>

ovae corollae vel ultra. <sup>tripartita</sup> <sup>germina</sup> plerumque quinque.

anomala P. foliis tripartito-laciniatis, laciniis lanceolatis utrinque  
glabris, capsulis nudis depressis Retz. Off. 3. p. 364

5 *Tenuifolia* P. folioli oblongi linearibus multipartitis Lin. Dec. 9. 7. 5.  
L. v. p. 502. \* Gmel. spec. pl. pag. 748 \* Gmel. pl. 4 tab. 23  
*Paeonia laciniis foliorum linearibus* Zinn. Gall. 127.

Habitat in Ucraina &

Caulis glaber folia bipinnata foliolis multipartitis  
petala obovata atropurpurea