

Palunisi

Palurus α aculeis geminatis: inferiore reflexo, floribus trigynis Linn. L. V

Palurus God. pempt.

Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso Bauh. pin 447.

Habitat in Europa australi

Rami teretes glabri, ubi ramuli apice ad solum flexuosi.

Folia petiolata ovata, pollicaria Inervi tenuissime venosa
glabra, ⁱⁿ ~~sub~~ altero latere parum angustiora. Saepe aculeus rectus
inferne unguiculatus, curvus dimidio minor. Pedunculi axillares petio-
lo dimidio breviores. Pedicelli longioris corymbosi.

glabris aculeis

corymbosis foliis ovatis serrulatis

Spina Christi Rhamnus aculeis geminatis rectis Lin. Hort. Cliff. 63. * S. V. p. 235

Rabica, paliurus Athenaei. Eredita Alpin. 16. 8. 19

Oenoplea spinosa Clus. hist. 2. p. 313. Bauh. pin. 477

Fuzube fr. zizyphus africana, mucronatis foliis, spina gemella Pluk. alm. 199.
t. 997. fig. 3.

Habitat in Aethiopia, Palaeina

a - Ramis teretibus glabris cortice cinereo flectuosis folia petiolata ovalia
q^{ue} vix pollicaria glabra, venis p^{rimariis} serrulata trinerviis vix venis
la aculeis geminis altere semiconvulsis & citius alter brevior
Cavus basi globoso magnitudine p^{er}si
convenit nostra cum figura alpini differt vero a figura Pluk.
aliam foliis majoribus ^{costatis} ramis ^{laevibus} laevibus leviter villosis calycibus
glabris

v^{er}o subinermis ramis superne folia subtus ~~conjugata~~ axillaris foliis
ovato oblongis obtusis ^{trius} quae duplo majoribus subtus pube
scento subvillosis. Conjugata axillaris pulverulento tomentosi
niani a specie diversa conjugit de La Mark

glabris

altero recurvo, foliis oblongis serrulatis