

# Panax

1. quinquefolium P. foliis ternis quinatis
2. trifolium P. foliis ternis ternatis
4. aculeatum P. foliis ternatis: summa parte flores compositi simplicibus, petalis ramulesque aculeatis, caule fruticoso
3. attenuata P. foliis ternatis quinatis, folioli ovatis attenuatis crenatis, caudice arborescente.
5. pumosa. P. foliis quinatis, primis infra ramos solitariis umbellis lateribus
6. arborea P. foliis quinatis, dentato-sinatis, umbellis compositis
7. fruticosum P. foliis supra decompositis dentato-ciliatis, caule fruticoso.

simplex P. foliis alternis lanceolatis serratis umbellati compositis Forst  
se. austr. p. 75

bipinnata M. foliis pinnatis bipinnatis, leguminibus dilatatis. Burm. Amer.  
p. 7. t. 12.

purgens *Statice* Scapo ramoso flexuoso, spicis secundis <sup>multifloris</sup> floribus <sup>curvatis</sup> distantibus; foliis lineari-  
lanceolatis

Habitat ad littora maris Barbatio

~~Stola radicalis, pollicina scabriscula angusta basi attenuata sessilis. scapus  
erectus rigidus, scabrisculus, ab ca. a ramo ad ramum flexuosus. Rami  
alberni teretes cū ramulis nonnullis dichotome divisi: ramuli septi, subula-  
ti mucrone terminati vix purgati. Flores superne in spicam pinn-  
dam, alterni distantes ~~recti~~ <sup>curvati</sup> semunquiculares <sup>quemo extenores</sup>  
osato fusco, interiori fusca vel glauca labe farnoso <sup>superiore</sup> flori. Calyx tuba-  
lofus 5-garonus, glaber. fuscus: limbo albo fusco radiato~~

~~avoyata differt foliis in petiolum longum <sup>na</sup> petiolis latis hinc sessilibus  
Scapo minus ramoso, magis flexuoso, rigidior, spicis 3s que pollicariibus  
nec secundis nec floribus basi vel quatuor cruris distis, floribus majoribus  
Curvatis non vero ~~rectis~~ <sup>angulato</sup> natis. Calyx glabro ~~tereti~~ <sup>angulato</sup> nec ~~tereti~~ <sup>angulato</sup> peloso~~

[Litr. J. pag. 33.]

Panax

Panax chrysophyllum, foliis septenatis novemnatisque: foliolis lanceolatis integerrimis subtus  
tomentosi, umbellis paniculatis.

Facaranda arbor, polyphylla, maxime procera. Barrer. Franc. Equen. 61.

Panax mortotoni: foliis digitatis, foliolis lanceolatis undulatis, subtus ferrugineis,  
floribus paniculatis Aubl. fl. Guian pag. 949. Tab. 360.

Habitat in insula Trinitatis Ryan 7.

Arbor excelsa. Rami apice crassiti pollicis, uti folia subtus, petioli juniores, rami  
panicula, calyces et petala exsert, tecti tomento aureo subtilissimo.

Folia petiolata, alterna, <sup>composita</sup> foliola umbellata, petiolata, septem vel novem; juniora  
tri ad septem pollicaria, lateralibus sensim minoribus, lanceolata, utrinque adteme-  
ta, procerum extorsum, acuta, plana, integerrima, <sup>prima, obscure venosa,</sup> subtus aureo nitida ut  
Chrysophylli caineti, ~~forma, obscure venosa~~ supra glabra levia: adultio-  
ra pedalia, basi ovata, nervosa, obscure venosa, subconacea, levia, subtus ver-  
sus marginem glaucescentia, marginem subinoquali subrepanda, valde adte-  
nuata.

Petioli torques, com munes foliorum adultiorum pedales, basi dilatati: partia  
les tri pollicares, uti com munes glabri: Foliorum juniorum breviora

Panicula terminalis, magna, diffusa. Rami duo inferi oppositi, reliqui uti ramuli  
et pedunculi umbellam alternam, tereder. Bractea concavo: ramorum infimo

Semipollicares: laciniis lateralibus brevioribus, lanceolatis, intermediis subulatis, elongatis:  
ramorum infrequentium ovatis, parvis, subtridentatis: ramulorum ovatis, minutis, acutis,  
integris. Flores umbellati parvi

Umbello pedunculato: radii plerumque octo, rarius novem ad tredecim, semicirculi  
lores, patentissimi. Involucrum: squamula ~~rad~~ basin singuli radii, minutis, ova  
ta. Flores parvi

Calyx margo superior brevissimus, obscure quinque-dentatus.

Corolla pentapetala. Petala, ovata, acuta, margine parum crassiora, supra in  
medio laseo et nervo longitudinali elevato, apice patula.

Nectarium margo brevissimus, ~~sub~~ inter petala et basin stylorum, brevissimus, sub  
carnosus.

Filamenta vix ulla nisi processus brevissimus a margine nectarii. Anthere ovata  
petali dimidio breviores, dorso convexa, intus curvata, apice ope latis mucro  
ne brevi terminata.

Germe subrotundum, basi compressiusculum. Styli duo, rarsissima terri, lineares  
crassiusculi, erecta, conniventia, longitudine antherarum, <sup>persistenter</sup> Stigma acutum

Bacca compressa, subrotunda, latior quam longa, basi vix cordata, umbilicata,  
bifurcata, stylis reflexis, plerumque biloculari, rarsissima triloculari trianguli  
cani.

39  
Semen unicum in singulis loculis axi adherentia, compressa subsemiovalata. Testa  
cartilaginea.

Panax

Panax chrysophyllum, foliis septenatis novem natisque. foliolis lanceolatis integerrimis, subtus tomentosis, umbelli paniculatis

Jacquinia arbor, polyphylla, maxime proceras Barrer. Fran. Equinoct. 61.

Panax morototoni: foliis digitatis, foliolis lanceolatis integerrimis, subtus ferrugineis; floribus paniculatis. Aubl. Bot. Flor. Guian. pag 949. Tab. 360

Habitat in insula Trinitatis Rybn. 5

Arbor ex celsa. Rami apicem versus crassitie pollicis, aureo tomentosi.

Folia digitata, septem vel novem, alterna.

*Trifolium P. foliis Ternii Ternatis* Lin. Spec. pl. pag. 1512. +  
Rapistrum mananum, anemonei sylvatici foliis, enneaphyllum,  
floribus exiguis Plut. mant. 135. + 435. fig. 7.  
Habitat in Virginia +  
maxime affinis quinquefolio et forte varietas s. mai. minoris sed  
longe minus cu



quinquefolium P. foliis ternis quinatis spec. pl. pag. 15/12.

Aureliana canadensis L'epit. genf. 5. t. 1. 1. Cat. esp. Par. 3. p. 16.

9. 16

Habitat in Canada, Pennsylvania, Virginia &

Radicis nodosa crassius perno anserino. Caulis erectus simplicis  
fimus pedalis, glaber striatus teris inferne aphyllis <sup>apice</sup> superne  
foliis tribus petiolatis. foliola quinque petiolata, lanceolata  
elliptica, acuminata, glabra terena serrata serraturis  
et venis majoribus tripolliciana latera memora.  
Pedunculus ex apice caulis longitudine petiolorum umbel  
la simplex

aculeatum P. foliis ternatis; summis juxta flores confertis simplicibus;  
petiolis ramulisque aculeatis, caule fruticoso Hort. kew. 3. p.

448.

Xanthoxylum trifoliatum foliis ternatis Lin. Spei: pl. pag 1455x

P. V

Habitat in China

michi ignota

23 attenuata Panax foliis ternatis quinatisve, foliolis ovatis attenuatis crenatis,  
caudice arborescente Sw. prodr. pag. 154  
Habitat in India occidentali

~~novi~~ Descript. vide inter ameni

*Spunosa P.* foliis quinatis alternis, spinis infra ramis solitariis, um-  
bellis lateralibus Lin. Suppl. p. 441. + S. V. pag. 920

# Habitat in Japonia.

Spina robusta retroflexa, patentes, loco folii infra propagines abbreviatus  
ramulorum. Propagines constant ex tribus / quatuor foliis absque ramu-  
lo et inter haec folia est pedunculus filiformis cum simplici umbella.  
floribus parvis albis. Folio cuneiformia apice producta, serrata: in  
seno breviora Lin.

*Aralia pentaphylla* arborca aculeata, foliis quinatis Thunb. fl. jap.  
p. 1204

arboresc. P. foliis quinatis serratis, <sup>dentatis</sup> umbellis compositis ~~Lin. Suppl. pag.~~

~~Panax arborescens~~ foliis quinatis obovatis serratis dentatis, umbellis compositis  
~~Forst. Prodr. pag. 45.~~

Panax arborescens foliis quinatis umbellis compositis Lin. Suppl. p.  
441. t. V. pag. 920.

Habitat in nova Zelandia t

Folia petiolata, digitata vano magnitudinis lanceolata-oblonga, gla  
berrima subconcaeva, nervosa arena nitida remote grosse serrata  
umbella magna radiis elongatis.

*Fruticofum* P. foliis supra decompositis dentato-ciliatis, caule fruticoso

Lin. Spec. pl. pag. 15134

*Scutellaria verticillata* Rumph. Amb. 4. p. 70. t. 33.

Habitat in Ternateis

arbutifera. folia bipinnata s. tripinnata: foliolis lanceolatis, inaequalibus, serrato-ciliatis, lobatis. Pedunculus inordinate ramosus, s. dichotomus: s. bracteatus. Umbella subnuda. Bacca digyna, 2-sperma. Semina nonnihil compressa, falcata. Lin.

non vidi

Cusquam ad hoc genus revocat Solander