

Pandanus

1. odoratissimus P.

Sanguineus Paddanus foliis linearibus ex piformibus, aculeis costisque sanguineis
Habitat in Insula Guancia Commenpon herb. Guaf.

Folia pedalia et ultra, angustiora quam in odoratissimo, maris, uti aculei san-
guinei. Flores non aderant.

Doratispermus Pandanus Kun. Herpl. pag. 4247

Vaيدا Rheid. Mal. 2. p. 1. t. rad. P.

Pandanus Rumph. amb. 4. p. 139. t. 74 ad P1

Bromelia foliis margine dorsoque ciliatis, caule sulcato
spinoso & Le Deyl. p. 54.

Neura Forst. Deser. p. 172.

Actinodactylus spinosa Forst. gen. n. 75.

Habitat in Arabia, Zeylona &

Planta tenera aculis, simillima *Brom. Ananus*, dulcor infero Palma arbore
sic. Folia in apice ramorum confluentia, trifariam imbricata,
complexi caulia, basi canaliculata, ca. n. aliculata exita, apice longissi-
mo dependente. In s. quædripedalia, nervosa, glabra, cania mar-
ginebus spinoso-serratis, s. que perperu
mas tacem compositi; thyrsiformes, in apice ramorum inter supremas
folia, axi clares, foliola sic, sessile brevia, densi in amento
impleti, approximata brevissima, hinc in dente breviores
pedentes, anthera lutea terminato.

foemina: In d. terminalis inter inter quatuor folia brevior,
globosa. (in mea) capitula globosa alterna appropiata mag
nitudine nuclei congl. bractea structura foliorum at brevior
sub lingulo capitulo

herpetum M. foliis lanceolato-ovatis villosis

Lorri Pandanus foliis longis feniis dorso lobatis, fructu solitans Lour. fl. Coch. pag
604.

Pandanus morphatus seu Lorri Rumph. amb. Lib. 6. Cap. 25. pag 147.

Habitat in India orientali.

Caulis crispus sparsim aculeatus. Folia bipedalia ⁱⁿ pinnulata canaliculata
tenacissima. Flores terminali. Masculi nuncius composito oblongo binites
lutescentibus. foeminei aggregati. Fructus ovatus parvus solitarius.
nubes, tuberculosis

humilis Pandanus foliis margine dorso aculeatis, fructu racemoso radice repente
Rour. fl. Coch. pag 603.

Habitat Pandanus humilis Rumph. Amb. Lib. 6. Cap. 8. 2. Tab 26.

Kada taddi Rheed. Mal. Tom. 2. Tab 6.

Habitat in India orientali

Caulis fruticosus 3 pedalis suberectus. Scola subulata fructu curva sesquipedalia
et alia ad apicem caulis congesta. Stipites masculis oblongis. bractea
patrales alba subulata spinose. foemineus indivisis globulos aggregati
fructus 6-8 pollicares ovati tuberculati rubri

non vid.

et ovatus primis differt fructu solitario