

Panicum

Coloratum ^p panicula patente, staminibus pistillisque coloratis, Culmo ramoso
Linn. Mant. 30. Fl. pag. 106. Gaïqu. mesq. 2. p. 365

Dichotomium

2

Hordeodes Panicum

Habitat herba Martii

Culmus ramosus. Spica tenuis

nitidum Panicum

Habitat herb. la. Martini
Panicula filiformis

habes

Dipspermum Panicum

Habitat herb. Co. Mantini

Calmi erecti. Vagina glabra. Sclia lato-lanceolata, spithamea & ultra,
glabra, multinervia, apicem versus margine fimbria. Panicula diffusa,
capillacea. Semina locia, obtusa, parva, gemina. Hylula membranacea
lacera

Stratum Panicum

Habitat herb. Lu. Mantua Carolina Crisp.
Vagina striata, glabra. Edia lineari, scabripula. Panicula spithamea,
contracta (Pan. racemo composito) pedicelli gemini, uni flori. Gloruli oblongi
sulcati, superne margini et apice fuso purpurei

cespitosum Panicum

Habitat herb. la Martini

Folia subulata. Panicula cespitosa

Cayanense Panicum

Habitat Cayenne herb. La Martini

Culmi ramosi. Ligula hispida, uti folia basi. Panicula pedalis expansa

flexuosum Panicum

Habitat herb. La Martini

Palma ramosi. Folia lineari lanceolata, pollicaria, glabra. Vaginae
pubes. Panicula simplicis. Glomeruliglobosi. Valvula exterior. margine ciliata.

Costatum Panicum

Habitat herb. La Martii

habeo

pyramidale Panicum

Herb. la Martini ha

babeo

Cepitium Panicum

Habitat herba maritima
Culmi erecti ramosi

myosuroid Panicum

Habitat

herb- La Manhu

similem d ed d de d m

agrostidi-forme Panicum

Habitat herba Manhu
Glavali minuti obtusi

polygonoides Panurum

Habitat herb. h. Manthii

Panicula depauperata. Culmus humilis.

Lectarium Panicum

Habitat Herb. La Martini

Calmus repens

Distichum Panicum

Habitat herb. La Martini

Spicae frequentes, alternae. Glomuli secundis, parvis, flavescens. Lata
parva in rachide

herb

hospidulum Panicum

Habitat

herb la Manthie

caudatum Panicum

Habitat herb. La Martini

Spica alterna, patulo. Seto ad bapn flosculorum

Habitat

caudatum Panicum

dimidiatum
integrum

P. spica dimidiata rachis flosculis glumis bifloris secundis geminis in
foveola rachidis, rachis indeyo. corpo convexo.

Habitat in Cap. b. pra. et Ind. occid.

Culmi ^{compressi} ramosi ^{resplentes} rami triquetri glabri. vagina amplo faucibus
barbato compressa. folia unguiculata vagina triplo breviora
conduplicata glabra. Spica tripollucari. rachis flexuosa
corpo striata dentibus nullis ad marginem. flosculi gemini sessi
eius alter parum altior ad marginem extus lanceolatus extus
plani intus convexi. valvula aestivationis minima membranacea

Sente *Protollia dimidiata*

haud bene cum *Charad.*
Prot. b. convenit

^{glumis bifloris}
Dimidiatum Spica secunda rachide ^{glumis bifloris} flosculis satundis quatuor in excavatione alterius
lateris rachidis, foliis lanceolatis culmo repente
Panicum dimidiatum. Linn.

Habitat in India orientali

Culmus repens, ramosus compressus folia plana bifloria
acuta. Spica terminalis solitaria. rachis altero latere plano
dentibus subulatis alternis exstantibus altero latere excavato
to flosculi quatuor & flosculi alteri in cavitate alteri indentulo
marginibus rachidis duo breviter pedunculata flosculi ovati acuti
convexi valvula aciciformis minuta plana dentibus rachidis villosula

a dimidiato ex dimidiato

polytachyon Panicum ^{Panicum} spicis terribus, involuellis unifloris, fasciculato
setosis, culmis erectis superiore ramoso Lin. l. V. p. 105.
Phalaris setacea; Polytachyon spicata; spiculis solitariis involuellis
setaceis floribusque longioribus Cosson. de ser. pag. 17.

obtusifolium *P. frica* ^{diata} *secunda*, rachis integra altero latere ad Javata
contactus subquaquefloris foliis obtusis
Habitat in Ile de Janio ^{et} mozo insendi
similis ~~p~~ *P. diata* ^{est} folia linearia obtusa. Geniculi
superi, folia semiunquam lata margine vix habet vagina
on velopula. Flosculi 4. 5 in papulo coartate. Calyx
biflori flosculus hermaphroditus interior dorso convexo masculo
complexo valvula lateri.

^{extrorsum planum}
insum P. spica dimidiato secunda rachi linearis alternatim incisae extrorsum
flosculis tenuis rachi excavata adpressis

Panicum dimidiatum spica dimidiato secunda, spiculi 5 floris rachi ex-
cavata alberrime appressis Retzi^{Druto} obs. f. 6. pag 23

Habita in India orientali

Calami inferne gemmuli radicanibus ramis compressis subtilibus
sime fructu nitidi. Folia ad basin ramorum opposita vel disti-
super disticha ^{vel alternis} ^{superne} ^{172.} glabra glaucis undia margini-
ris scabra obtuse pinnata cum acumine minuto. Spica terminale solida
in tripollicariis rachis dilatata dorso plana articolata ad articu-
lorum ad medium usque usque ^{alternatim} lacina lacinata attenuata
per subulata, rigida subpungens articulis alternatim
excavata spicula 3. (Retzius) in singulis cavitate nichil
unica sessili reliqui pediculi ^{icellati}. Calyx bifloris valvula accessi-
va parva membranacea truncata duo lanceolata exterior striata
cathelaginea interior tenuis cyrtiformis apice ciliata

in rachi integra
a Panicum dimidiato Lin. ornano driesum cum Rothbollii
est conungi potest

hippidulum Pan. sp. s. bracteis ternatis que exitis, calycibus hippidis
bianthatis Petr. obs. 5. p. 10.
Habitat in Anora orientali

non vidi

D. Stachyon *Spicae subgeminae* ^{sub} ~~*Paniculae simplicis digitatae*~~ *Spicae alterius secundae*
radicans Pan. ~~*paniculae simplicis digitatae*~~

Habitat in India occidentali

Culmi ramosi, repentes tenues teretes, striati, ad genicula nodosi, articulis
sive pollicantibus ad genicula raduantibus. rami exiti palma
na flexuosa vaginis foliorum vixi vaginò brevis unguiculari superior
na sive longior, margine subulata. folia lanceolata pallida
vel ovata lanceolata pallida vixi longitudine vaginam
pedunculata siliiformis longitudine rami superius 2-3 alter
na remota breviter pedunculata pollicares. flosculi secundigeni
ad singulum dentem alter pauciter pedicellatis sive valvula tres oblon
ga aetespora ovata, glabra

Panicum Stachyon spicae geminae secundae Corbus Lin - Mant 1837
p. V. pag. 106
Gramen panicum Desf

et *Panicum Stachyon* *Panicum Stachyon* *Panicum Stachyon* *Panicum Stachyon*
bui uno versu constante Plukin mant 94

Conyzaeflorum P. spica gemina, flosculis ovali-oblongis Retz. obs. 4. p. 15.
Habitat ad margines agrorum Malabarica

non vid.

ciliare P. specie subdigitatis approximatis erectis lineamentis rachi flexuosa
dentibus bifloris, calycibus ciliatis Retz. Obs. 4. p. 16.
Habitat in Java & China
quam maxime similes P. feliiformi

michi ignotus.

Dactylon P. species digitatis patentibus: basi interne villosi, floribus solita
ris, fermenti repentibus Ken. L. V.

Gramen legitimum Clus. hist. 2. p. 217.

Panicum dactylon folio arundinaceo majus aculeatum Bauh. pin. 7.

Panicum dactylon radice repente f. officinarum Scheuch. Gron. 104.

Habitat in Europa australi oriente &

Culmi decumbentes ramosi glabri. Folia conduplicata glauco
viridia margine scabra. Spica 5 que seple umbellata bi
polli cavi linearis rachis ~~in~~ dorso convexa. Valvula calyis
no lanceolata cinnata patulo ore Centi carina subulata
valvula corollina cavi nec strata

compressum P. speciosum digitatis secundis compressis puerilis solitarius biflorus umbellatus
biflorus flocculosus altero masculo Torr. fl. Ant. p. 18

michi cognatum

Panquevale

Panicum

Panicum

spicis digitatis basi interiore nodosis, flosculis geminis
multis, vaginis foliorum punctatis Lin. S. V. pag 106. P. A. Sebyran. 1197/16
pl. Dan. 700.
~~Phalaris velutina, spicis alternis, feteformibus; Culmo foliisque
villosis panis & orbi. De Fourn. pag. 77. no 55~~

gramen dactylon, folio latiore Bauh. pin. C. Theat. 114
Scheuchz. gram. 101.

gramen dactylon majus repens foliis hirsutis, fimois Bauh.
unt. 5. p. 34. tab 65.

Habitat in Europa praesertim, Asia

Culmi basi repentes diffusi simpliciter pedales
vel breviores vaginis et foliis saepe glabris. Ligula
brevis membranacea. Spicae 3-6 vel 6-8 alternis
brevibus.

altera pedicellata bipollicari lineari. flosculi oblongi, pappi
altera simpliciter
compressi
valvula alicuon nulla valvula altera plana
strigata

Lineare ^P speciei digitatis subquaternis lineariibus, flosculis solitariis secundis
muticis Lin Spoa plant. p. 89 + ~~Burm. ind. t. 10. fig. 2.~~
Græm. Dactylon, panicula longa, specis plurimis gracilibus et longis
Roan hist. 1. t. 70. fig. 3
Habitat in Indiis
Similis Pan. ægyptiaco ut ex limitibus generis non convenio
unio differentia fere consistit in valvulis omnino glabris

Roan pom. 1. p. 113. t. 70. fig. 3

Egyptiacum *Paspalis* filiformis alternis flosculis geminatis lanicolatis ~~fructu~~
margine pubescenti
Pan: aegypti Retz obs. 3. p. D.
Phalaris velutina Retz 8

Tor Jh.
Habitat in Aegypto et Arabia

Culmi repenti inferne pubescenti. Folia angusta graminea
inferne undulata apiculata utraque pilosa basi utraque
macula flavescenti. Vagina longa striata. Spica 5 que vel sex
pallidiores filiformes inferne opposita vel ³⁻⁴ verticillata
superiores 3-4 alternis flosculis utraque ³⁻⁴ verticillata
margine ope latis pubescente. Staminibus prima saepe ad basin flosculi
et sespeli

filiforme ^P spicis subdyctatis approximatis erectis lineamentis rachi flexuosa:
dentibus bifloris: altero sessili Lin Spec. pl. pag. 854 L. V. pag
Faequ. obj. 3. p. 18. 7. 70.
Habitat in America septentrionali

Spontaneum spicis pelosis, cultum glabris Richard

~~Richard lat. n. l.~~

Cladium Pan. culmo folioso, spiculis remotis sessilibus appressis secundis paucifloris
e Reylora mes. Picti obs 4. p. 151x
Habitat in India orientali

Spiculis fluctante et Brizoides raris acumine brevi rigido terminata
Spiculis initer 20 semipollucari inferos panum longiores
remotiores superiores interstitiis dimidio fere longiores 24 flosculis
a P. fluctante ^{in panula mltis} ~~in panula mltis~~ panum differt nisi spiculis brevioribus flosculis convexis
ovatis nec ^{tubulosis} ~~ovatis~~ ~~conspicuis~~ ~~macro~~ ~~mutis~~ ~~in~~ ~~ter~~ ~~minis~~.

Spicis alter flosculis alternis secundis, glumis unifloris con
ovatis convexis valvulis duobus brevissimis
bifloris infusis

9-10 flebilans Panicum spicis alternis sesilibus secundis. Retz. obs. pag. 8. 12.
Panicum geminatum, spicis linearibus alternis, appressis, spiculis
 solitariis bifariam imbricatis Torrh. Desf. pag. 18. no 59.
Proximum panicum polytachyon panicum, vna granorum ordinibus
Pluk. Amalth. pag. 110. Tab. 417. fig. 7. ex Lide Herb. horti Pluk.

Habitat etiam in India ^{netu} ~~pluk.~~ ^{at} ~~indica~~ ^{differ} ~~mag~~ ^{itudinis} ~~specimine~~ ^{Torrh.} ~~en~~ ^{gna}
 gajica ~~ant~~ ^{quam} ~~ad~~ ^{ita.} ~~omnino~~ ^{diversa} ~~a~~ ^{p.} ~~brizoide~~ ^{lens} ~~ut~~ ^{vidi} ~~ex~~

Herbar. Linnæani
Manosua vagus indicus ventricosus, &
valvula accessoria truncata

Leto C.
 pag. 17.

gluma biflora. Los masculus univalvis; valvula tanus, pel hui
da. Los hermaphroditus bivalvis; valvula crassioribus: Exta
nior convexa; Intenor minor, plana, lateribus valvula exteri
nis intellisa.

Specimina Torrhaëli minor sunt, quam Indica. Omnino diversa
 a p. brizoide Linnæi ut ex specimine herbarii Linnæani vidi
 proximum indicum saxe bipedale basi radicans. Culm
 us compressus, glaber uti folia et vagua. folia elon
gata striata glabra.

Spicae pinnatae conferta, dein remotissima s. p. unguiculata
^{ante} ⁱⁿ ^{pallo} ^{ble} ^{ca}
antra breviori et validiori veronata quam in bracte
caulis glabra flexuosa, flori unicus ad pagulum dentem, calice
circiter duodecim globoso, valvulae duo aequales. Vertice
minorae apice rubrae ut nec vosa

fluctant. Spicis alternis ^{inter} ^{se} ⁱⁿ ^{pediculis} ^{que} ^{ovate} ^{sub} ^{glo} ^{bosi} ^{secundis}
glumis bifloris, valvulae duobus aequalibus

Habitat in Arabia, Isla de Francia, India orientali.

1809

birzoides P. ^{ulsi} species alterius ~~sepalibus~~ secundis muticis ovatis scabris rachis dextera
 scula. Lin Mant. p. 1044? Petrii obs. 5. pag. 18.
 Gramen panicum, multiplici specie, maderaspetara Plukn. alm. 174. v. 191.

^{leg. 4.} Paspalum ad pres. f. m. la. Mant. f. d. herb. Ruth.
 Habitat in India

Culmi basi repente sub aqua crescit fere pedum ^{sepius glabris} cymosa
 ramosi ^{teretes} articuli la. s. tripollicantibus ^{adscendentes} bipedo
 les, ^{articuli} ^{quasi} ^{cap.} ^{supio} purpurascens, Vagino ampliato lato
 glabro absque ciliis marginem ^{superiori} ^{longo} usque ad
^{inferiorem} ^{solia} ^{semunquam} ^{lata} ^{5-pollucina}

la. Mant. birzoides
 dedit Thonni. Spec.
 alterius 2-4 diversum
 a henni
 nonne birzoides Lin
 n. u. s. I. column
 indicium

glabra margine scabra. Rachis communis ^{seque} ^{pedalis} ^{emita}
 recta superne angulata glabra ^{superi} ^{inferiori} ^{bipollican}
 sursum sursum ^{inferior} ^{retro} ^{inferior} ^{interstitis} ^{brevis}
 sic sequentes ^{interstitis} ^{equantes} ^{superior} ^{longior} ^{curter}
 13. Rachis ^{flexuosa} ^{alt} ^{dorso} ^{plano} ^{albido} ^{latere} ^{caro} ^{profla}
 scula in antem ^{semunquicula} ^{depresso} ^{florescili} ^{alterna}
 sessiles unicus ad singulum ^{dentem} ^{rachidis} ^{ovata} ^{acuta} ^{compressa}
 valvula ^{dua} ^{minuta} ^{recta} ^{longitudine} ^{femina} ^{femen} ^{ad} ^{altero}
 latere ^{compressa} ^{plano} ^{altero} ^{convexo} ^{lore} ^{glabrum} ^{valvula}
 la ^{secunda} ^{ovata} ^{obtus}

birzoides P. species alterius ^{secundi} ^{ovatis} ^{anistat} ^{florescili} ^{ovatis} ^{compressis} ^{alter}
 ni ^{sub} ^{nomine} ^{notante} ^{musum} ^a ^{Bronquio}

Quercus P. caud. pedis hirsuta: spiculis geminatis, scapulis, culmo ramosissi-
mo dichotomo Torr. Desf: pag. 20

michi haud notum

Cynosuroides Poa ^{Poa} panicula ~~stricta~~ pyramidalis, pedunculis patentissimis, spi-
culis dependentibus diffinis Retz. obs. 4. p. 20.
panicula spicata: panicula subspicata, racemis pennatis subtus
umbriatis Lin. S. V. pag. 116

anomalous *P. spica* composita spiculi secundis horizontalibus utroque de
cumbente Walt fl. carol. pag. 72.
Habitat in Carolina

non vid.

menandra Retzbollii celano, floribus distinctis ppicatis Cav. var. 1. pag. 27
Tab. 39. fig. 1.
Habitat matuti ☉

Differenciae peshmia an ~~spes~~ ~~Madus~~ gangetis vel anistatis

Setigerum

septens *P. panicula* ramis simplicibus, flospulis secundis geminatis basi setigeris
culmi ramosi repentibus

Panicum repens panic. Burm. fl. ind. pag. 26. Tab. 11. fig. 1.

Habitat in India orientali hinc specimen quoque communis dicitur
Burman filiforme articulis hinc nonnullis per medium ramosi tectis
Culmi repentes geminulis infero radicantibus nodosi. Solea lanicula
sa attenuata, bipollicaria glauca undia undulata, margine
fiabra, laeva glabra, basi denticulata ciliata. Vagina colore
foliorum praeter marginem ciliata. Pedunculus elongatus, spica
si ad 8 alterna sequipollicares rachis fiabra. Setae 3-5 parvae
in apice paguli pedicelli pedicelli gemini alter brevissimus flospu-
li oblongi. Salvola ciliifera parva truncata, duo majores res-
vata.

Panicum setigerum spica remoti flospuli secundis, rachis denti-
bus setigeris Retz. obs. fasc. 4. pag. 15

molle P. spicis paniculatis alternis secundis patentibus; spiculis approxi-
matis pedicellatis secundis muticis Sw. prodr. pag. 22.

Panicum 2 Brown. jam. 133.

Habitat in India occidentali.

femina rickideque villosa

non vidi.

~~pelosum~~
~~gaspuloides~~ ^{lesplibus} P. Spiis alternis flosculis secundis geminatis, rachide pilosa,
culmo simpliciter exserto.

Habitat in Andra occidentali.

Culmus pedalis 3-nodi geniculis valde pilosis. Vagina pilis
variformis dispersa folia 5 pollicaria supra raris pilosa
plana Spiis unites 14. alternis inferiori remotiores
peltivariis sursum minores, patentissimis linearibus angustis
rachis compressa, ad glauculos pilis ipsi longioribus. flosculus
alter brevis pedicellatus glabri ~~unifl~~
valvula altera calycis ore lenticis subquadratis femina glabra longiss.
~~affinis P. piloso Sw. in eadem~~

2 Panicula aliosum fructu paniculati alternis secundis parvis geminis
alteris minoribus autem rebus combus, rachis compressa pilosa, culmo divisi
culo geniculato Sw. prodr. pag. 22.

1 Milium paniculatum polytachyon latifolium semine duplicato Beauv. hist. 1.

p-114.

guianensis ~~Reubaria~~
Pouteni guianensis Aubletii fl. gu. tab 37

alba Pinum caule simpliciter, floribus sesquialteris pinnatis verticillato
quadernis.
~~Contoubea alba Aubl. fl. Gu. pag. 8. 27.~~
Habitat in Guiana

prostratum Pan: fructi subracemosi lincantibus alternis culmo prolon-
go subramosis repente La Mart. T. Enc: pag 171.

Habitatio
β. racheis dentibus setigeris
Habitatio α in Cambis β. in China

in cambis dicitur cent pour cent vobis optimum pabulum Richard

muticum ^{alternis}
P. spicis flokulisque secundis, glumis oblongis unispinis acuti rachis
glabro

Panicum muticum spicis alternis secundis, spiculis remotis geminatis
muticis altera pedicellata: rachis trigona flexuosa Forsk. Desf.
per 21.

Habitat in Aegypto Torkhal in India orientali Hongk
vagans margine villosa. Colica angusta remota spica 6
pollinaris vel parum ultra remota. Flokulis glumis vix
tra valvula. Anthera ovata purpurascens. Semina ovulo
armato transversim undulata. Squama rectangula infra calycem
et corollam

granulose P. spicis alternis muticis erectis simplicibus; glumis coracibus ^{sub} globosis; cal-
mo ramoso La Mart. T. Enc. pag. 176.

Habitat in Inf. Francie Dedit Thourin

Culmi ramosi, spithamei et ultra. Sacces P. fluitanti; spicis Depau-
peratis et var. diversim secundum specimina herb. Mus.

Lespedeza
tenuiflorum P. spicis alternis secundis flosculis geminis secundis rachis filiformi.
glabris.

Habitat in India orientali

Culmibus filiformibus. Vaginae superne parte villosa prope distichum marginem. Folia
lanceolata supra glabra interdum ad axillum armatura raris
velosa. Spicae remotae ^{vere} pollicari, supremi biflori. flosculi oblongi
acuti subultra alcespora ovata connata.