

Panicum

Panicum floribundum inde a radice flondum Richard  
amplexicaule de dit le Dou  
tenellum la mariti de dit la marit

agrostoides Panicum<sup>?</sup> panicula supraeacomposita, ramis erectis, fasciculis compressis firmis, foliis  
linearis lanceolatis pluribus

Habitat in America meridionali Dr. W. Roth.

Gramen bipedale, debile. Culmus teres, glaber, striatus, vaginatus.

Folia linearis-lanceolata, spithamea, plana, glabra, margine scabra.

Vagina striata, glabra.

Panicula erecta, pedalis rarisissima: rami erecti, remoti, alterni, caeterum  
gemini, compressi fasciculi, altero latere subcinerati. Flores compressi  
conferti, parvi, absque involucrio, vixides, oblongi.

Calycis nervosi, glabri

(facies agrostidis)

Semilactum  
~~Coloana~~

Panicum spiculi alternis secundis villosi; ~~in involuelli~~ ~~stofi~~ ~~rethede~~ an-  
gulata, folii margine scaberrimi subundulati

~~Græm panicum minimum humifratum, spica divisa multica, foliis  
variegatis Sloan. hort. pag. 107. tab. 64. fig. 3.~~

~~Panicum coloanum: spiculi alterni secundis ~~multica~~ ~~bracteis~~ ~~bracteis~~  
natis & ciliifera L. S. & pag. 105.~~

In mont. semat legit Dr. Ryan

Palmis squipedales, erecti, inferne foliis vaginati, compressi spiculi  
Folii angusta, linearia, ciliis brevioribus, glabra, margine sca-  
berrime, saepe hinc inde parum undulata, basi versus vaginam  
serata, ciliata.

Vagina glabra, serata, ore ciliata.

Spicula subsessilis, alternis, lineares, pollicares, superioribus  
suis minoribus, secundis: Flores conferti, sessiles. Rachis angula-  
ta: ~~serata~~ <sup>serata</sup> parvis ad basin spiculi glabris.

Calycis villosi.

(Floribus involucri a Pan: colono cui simillimis, distinguitur.

Languinale P. fucis dentatis basi interneae nodosi, flosculis geminis mult.  
 28, vaginae foliorum punctatis  
 fl. dan. tab. 300. Chrob. gram. 119. T. 16

an Paeonia folio subter in cano, flore albo vel pallido & haub  
 ma

folius <sup>bi</sup> ternatis folioli <sup>intermediis tri</sup> tripartiti laciniis lanceolato ellipticis  
 subtus pubescentibus lateralibus

foliolum terminale uti et latus laterale catendum  
 bifidam plerumque integra integerrima

et nonnullae aliae hujus generis, a reliquis nota signi  
 catione sunt, quod mature semina, decidua valde sunt, indurata  
 sunt, sunt, sunt a basi ad medium arde, praetera, a medio ad apicem  
 postquam patenti, reflexa, inde rursus post eorum florum a rubescunt  
 indurata, postquam persistenda, altera non tam contracta - punctata appa  
 ret.

183 Scirpus: Sloan herb. Tab. 75. fig. 2. potius pectorese videtur ad capitatum  
Tab. 81. fig. 3. Diversa est a Rothb. plantagineo nisi figura Sloani per se  
Cum capitulum oblongum est  
Secund. herb. Bancij mutatur a stipulat plantag: sed culmo triquetro  
non geniculato totis; geniculatus vero plantaginodes si recte  
recte recordor; certe maxime similibus vide descript

grandifolium  
macrophyllum

P. foliis ovatis septemnerviis glabris acuminatis reticulatis nitidis

Habitat in Insulis Americis

Pauli tenuis glaber, subulescens striatus folia magna spatulosa  
utrinque concinna. Pedunculus petiolo longior. Spicis spoli-  
catis

Figura tab 75. Plum. Amer. optime convenit sic secundum Lam. Pip.  
reticulatum est, Swartzii vero descriptio Pip. reticulati d. s. p. addit  
secundum. Ceterum enim reticulat. gaudet foliis cordatis rotundatisq.  
nerviis pedunculis foliis brevioribus quod nunquam in nostra vidi, sic  
vel divergant vel differentia Swartzii fuit.

Bryonia

Ciliari<sup>o</sup> panicula contracta, glumarum valvulis internodiis, pelosa  
Ciliatis Am. acad. 5, p. 372. Jacq. coll. 2. p. 330 Sw. obs. pag. \*

Gramen mederopotanicum spica interrupta totali & spica parvis  
valleis constructa Pluk. 8. 190. fig. 5.

Gramen proterae, panicula et foliis angustissimis, spica brevibus muti-  
cis, locustis minimis Sloan. bot. 1. p. 114. T. 73. fig. 1.

Habitat in Samarcia.

Rami genuculati glabri. Venae. Folia convoluta angustis  
fimo glabra. Panicula tripolliariis ramis alternis inferentibus  
vernobus. valvula corollae parva oblonga obtusa  
recurvato patula

6-8 flore



bulbosa P. panicula secunda patentiuscula, spiculis quodam floris  
L. t. V.

a Gramen hexamylum, imbricata protuberantia, ramis que sparsa pani-  
cula s. hexamylino congener arvense ostendit, gramen minutissi-  
mo semine Lobel. illust. 14. Scheuchz. gram. 185.

prolifera B. Gramen arvense panicula crispata Vaut. jun. 3. Barr. ii.  
703.

Gramen arvense angustifolium, panicula densa foliacea foliolis  
in panicula angustissimis Scheuchz. gram. 211.

V. Gramen vernum, radice apicalonia Vaill. pan. 91. t. 17. fig. P.

Habitat in Gallia, Hispania, Oriente Italia

gramen caespitosum. Culmus spithameus simplex folia 2-3 in  
culmo vaginis inferne compresso. folia angustissima glabra rami  
panicula inferne 4 capillares sulcula canaliculata moxine sub  
membranacea

4-5 floro

Commelina Panicum panicula sub simplicii ramis alternis patentibus, foliis  
lato-lanceolatis, vaginis ciliatis.

Habitat in Montserrat ad Rigan.

Culmi teretes, multi articulati, glabri, ramosi: articuli bipollicares ad  
dimidium tacti vaginis foliorum.

Folia fere Commelina, lato-lanceolata, quadripollicaria, attenuata, gla-  
bra, pollicem fere lata, margine scaberrima, basi altero latere parum  
angustiora.

Vagina pollicares, striata, margine pilis congestis ciliata.

Panicula terminalis, ramis alternis, bipollicaribus, pauciflora:  
pedicelli gemini, alter interdum biflorus.

Sulcula calycinis lanceolata, acuminata, glabra, substriata.

N<sup>o</sup> 216

Ozophila

moniliformis.

debile Pan. speciei digitatis interruptis subquavis fileformibus; flori-  
bus geminis adpressis altero pedicellato altero sessili defont  
pl. At. pag 59.

Habitat in Barbana

miki cydon

int. emyllum Panicum spica simplicis interrupta, spiculis vs floris interruptis  
L. Wed. spec. pl. pag. 341.

*Panicum caudatum* Thunbergii?

Habitat in India stagnis

Griffonum

P. panicula ramis simplicibus subserrillatis, flosculi lanceolati. Ternis pedicellatis, culmis repentibus

Habitat in India orientali Honig

Culmi teretes longi teretes glabri, vaginis foliorum tereti articuli bipollicinati, geniculi incurvati. folia l. s. tri<sup>gastro</sup> polliciana patentia margine scabra attenuata, plana, semurquam lata. Vagina striata longitudine internodiarum tuberculi minuto adpressi margine pilosuperculo.

Panicula spithamea. Rachis scabra, angulata, filiformis, <sup>remoti</sup> inferiori <sup>inax</sup> interced. saepe solitarii superiori <sup>inax</sup> subverticillato 4 pollicares. praeter

flosculi compressi longior biflori. <sup>major</sup> Pedicelli gemini alter uniflori brevior <sup>duo</sup> alter <sup>anthera</sup> ramum <sup>anthera</sup> opposita brevior oblonga.

nudum P. floribus solitariis remotis verticillatis, pedunculis longissimo calice  
erecto geniculato nudo Walt. fl. Car. pag 73.  
Habitata Carolina

non vid.

ramicula simplicis

Septemflora - <sup>capellan</sup> Panicula diffusa spiculis lineantibus septemfloris foliis involu-

tis.

Habitat

Banks

Culmibus tenuis squi-pedalis folia longa. spiculis tenues interdum  
5 floris interdum 8 floris, fusco viridante



*Speciosum* P. panicula elongata acuta genicula, racemis simplicibus verticillatis  
crebris, floribus solitariis subsessilibus Walt. fl. carol. pag. 573.  
Habitat in Carolina

non vidi

uniolorides Poa paniculata erecta in pila, spiculis subdecemfloris erectis  
calycibus inferioribus multivalvatis Retz. obs. 5. p. 19.  
Habitat in India orientali

agrostoid. forme P. racemis linearibus strictis glaberrimis glumis ovato-  
oblongis obtusis pilis loricatis La Mart. T. Can: pag 172  
Habitat in America meridionali

novi

Canis glaberrimus a. loricatis

~~Myurus~~ Pan. panicula linearis longissima, racemulis lateralibus  
brevissimis fructibus, glumis acutis La Mart P. Enc. pag 172  
Habitat in America meridionali

non vid.

anceps Pan panicula simplicis; ~~calycibus~~ <sup>unifloris</sup> valvulis nervosis; calamo inferne com-  
presso <sup>anceps</sup> ~~anceps~~

Habitat in India orientali. Kunig.

Bulmi basi tamquam adscendentes pedales inferne vix vaginis <sup>foliorum</sup> glabris  
marginibus villosis. Folia lanceolata glabra, nervosa remota, un-  
dulata bi. f. Tripolliciana panicula terminalis ramis cinctis  
septem bipollicares simplicibus <sup>terminalibus</sup> fasciis solitariis interdum geminis  
pedicellatis oblonge <sup>nervatis</sup> ~~acutis~~ <sup>marginibus</sup> subglobosis. Valvulae fuscae vix indurantes  
ne interdum orculo armato margine subvillosa. Semen glabrum altero  
latere convexo altero plano <sup>in raspo</sup> ~~in raspo~~ ope <sup>valvulae biflorae</sup> ~~calycis~~ transversum  
undulatum <sup>membrana tenui quidem inter</sup> ~~calycem~~ <sup>calycem</sup> vixi sed nunquam fasciis geminis

~~folia simplicia~~ ~~anceps~~ ~~anceps~~

~~anceps~~

Yacquina

Yacquina arborea, foliis canaliculatis, ramis inferioribus verticillato - quaternis,  
superioribus dichotomis.

Coomandlicarum Pan. panicula sub simpliciter flosculis fecundis, vaginis  
pilosis culmo ramoso

Habitat in India orientali

vagina punctata. folia unguem lata attenuata. panicula  
ramis bi-3 pollicibus flosculi fusi. Lemnae trans vaginam  
undulatae

Cartaginense *P. piceis* paniculatis, foliis brevioribus, spiculis secundis  
ovatis acutis, culmo prostrato geniculato ramosisimo, vaginis pube  
scentibus Sw. prodr. p. 22.

Habitat in America meridionali, Cartagina 4

Culmus ramosus teres. Vagina glabra longa fenestrata folia lanceolata  
vagina triplo longior. Pili nonnulli ad basin pedicellorum glumae fuscis  
similis panis fuscis ad folia ventris

~~ma~~ ~~grata~~



~~Panicum~~ <sup>Salsum</sup> P. Panicula simplicis ramis subverticillatis, flosculis subglobosis  
seminibus transversim undulatis

Habitat in Andra occidentali

Vagina ulcato culmi lesquipedalis. folia plana, glabra, marginata  
glabra. Rami paniculae approximate subsimplicis  
subfastigiat. flosculi gemini pedicellati. valvula nervosa  
superior, raris

~~an fufium Swartzii~~

Panicum Salsum panicula simplicis ramis erectis flosculis secundis  
geminis altero brevior pedicellato, culmo erecto subulso, foliis lato-  
lanceolatis Sw. prodr. pag. 23

Pluchin tab. (89) fig. 4 secundum Lib. Vahlent

Panicum fusco rubens La Martini et

Synonym. Sloan huius pertinet et non ad Paspalum paniculatum  
Richard

capitulatum P. spicis paniculatis alternis erectis, subglaberratis, spiculis sessua

dis subrotundis lvs. prodr. rug. 22

Habitat in Jamaica

similis fufio ut mihi videtur nisi varietas videtur. Lemna transvehi. fruct.

flosculi fufi ovati

~~notae hanc partem~~

ryzofum Panu: panicula terminali, flosculis gibbosis rugosis, culmo repente ramoso  
habitat in India orientali  
Culmi glabri tenues. Rami <sup>nudi</sup> determinate distantes palmari vaginis foliorum  
floriferi erecti vagina striata vel pubescenti uti folia. flosculi minuti  
folia linearis valvula altera calycis gibbosa altera recta ovatis ovata acuta  
canaliculata carinata. omnes nervoso pubescenti.  
plana vasa glumi villosi et glabri

ex Pan. mundatum Petrii

Arborea Taxquinia arborea, <sup>foliis cuneiformibus</sup> ramis inferioribus quaternis verticillatis, superioribus ~~trifloris~~ <sup>trifloris</sup>, geniculis aequalibus ad ramificationibus aequalibus.  
Habitat in montibus De Ryan.

Rami tetragonis, subrecticillati.

Folia cuneata, coriacea, bipolliciana, glaberrima, avenia, enervia, subtus pallida, emarginata.

Racemi ~~et~~ apice ramorum, plures. Bracteae flavescientes, apicem <sup>condemore consistuntur</sup> versus emissaes.

( Similis fere in omnibus Taxquinia armillari, ut ~~foliis admodum~~ <sup>condemore consistuntur</sup>;  
differt vero specie secundum De Ryan, qui tam hanc quam alteram  
centis vident, tuberculis nullis ad exitum ramorum, ~~et~~ <sup>vero</sup> ~~et~~  
caulis trunco vixit pedali; ~~in~~ <sup>4</sup> armillari <sup>vero</sup> semper arbu-  
scula et semper ~~nodosa~~ ad exitum ramorum nodosa  
si revere differt, nomen specificum Taxquinia armillari  
erit.

nigri P. panicula simpliciter nigra patente, Culmo ramoso decumbente, foliis  
horizontalibus scabris Sw prod p. 23:  
Habitat in Jamaica

michi ignotum

caudicatum Panicula simplicibus foliis brevioribus, ramis capellanibus diffu-  
sis, spiculis remotis obovatis, culmo decumbente gracilato ramofo,  
foliis lanceolato-fabulatis erectis vaginisque villosi Sw. prodr. pag.

23.

Habitat in Jamaica

non vidi

Depauperatum P. panicula simplicis depauperata, glumis bifloris

Habitat.

Culmus tenuis glaber. folia angusta plana supra pilosissima  
ca. Panicula ramis filiformibus erectis panicifloris florum  
ei vix ariet.

*Dichotomum Panicum paniculis simplicibus, culmo ramoso Dichotomo L. S. V.*

pag. 106 Gronov. Virg. 133\*

Habitat in Virginia

Statura refert abusiulam inferne simplicem, superne fasciculatam An



glauco phyllum P. panicula simplicis, pedunculo <sup>sub</sup> floribusque solitariis  
remotis

Habitat in India orientali.

Gramen bipedale ramosum articulis angulato tetragonis. Strati  
glabri supra medium vaginis tecti. folia graminea glabra glauco  
virescentia glabra margine scaberrima. <sup>vaginae collo villosae</sup> panicula terminalis  
simplicis et pedunculi circiter octo remoti laxi 3 pollucari  
superiores minores. rachides scabrae glauculae plerumque solitarii  
his filis interdum alter pedicellatis ovatis. valvula 3 villosula  
ore latis nervosa. flos flos gemini. semina ore latis undulata

an eadem cum remoto nostro videtur.

*Petigerum Pan. spicis remotis, flosculis secundis, rachis dentatis Petig. Retz.*

obf. 4. p. 15.

*Panicum repens* Burm. fl. Ind. p. 26. v. 11. p. 1.

Habitat in India orientali China

tenuellum P panicula terminalis simplicis <sup>capillari</sup> pauciflora <sup>calycibus paleis purpureis brevibus</sup> ~~pubescentibus~~, Calamo filiformi ~~reperitur~~ <sup>foliis lanceolatis</sup>  
~~Panicum lineare Burmanni ad Tab. 10. fig. 2~~

Habitatio India orientali

Calami ~~brevi~~ ~~reperitur~~ articulis pollicaribus. folia sesipha angustilana  
paleis adpressa prodestum margine. pedunculat. et panicula pollicari ramis  
inferius puberulis ses. capi. ramis flexuosis capillari calycis valvulae duae tantum  
vulo armato tuberculato tuberculo pilosissimo. ~~sepalis~~ corolla duae sesipha

in hujus generis cum valvula aequali deest

vellofolium P. panicula simplicis, <sup>capillari</sup> culmo repente foliis lanceolatis pubescentibus

Panicum lineare Burm. ind. tab 10. fig. 2.

Habitat in India orientali

Culmi filiformes ramosi. Solia frequentia unguiculata semipollicia  
na uti vagina striata pubescentes. Panicula pollicari. floris  
ei oblongi glabri pedicellati solitarii pedunculati villosi valvula  
nitida basi membranacea.

~~patens~~  
 trifidulum panicula brevibus capillaribus, glumis mucicatis hispida, foliis lanceolatis  
 villosis pilosis culmo  
 patens Panicula patens panicula oblonga flexuosa, capillari patente, calycibus bifloris, foliis  
 ciliatis lanceolatis Culmo, caudice Burm. Ind. tab. 10 fig. 2. non Burm. patet ad  
 Habitat in umbris O descriptione et synonymis  
 Culmus repens l. formis, f. bipedalis. Folia brevia lanceolata uti vaginis  
 Folia vaginis minutis punctis praef. cili. pilosa, pilis punctis mucicatis apiculis. Panicula  
 Congens terminalis ped. brevis pedunculis ped. ciliis que capillaribus. Floribus globosis  
 magnitudine fœmenis sinapis. Glumis calycibus bifloris oblongis punctis mucicatis pilosis  
 ut in foliis glumis. A. P. P. d. c. est idem que melissum

22%

Trigonum Pan. panicula erecta pedunculis bifloris, calycibus obtusis  
bispidis unifloris, seminibus Trigonis Petz. obs. 3. p. 9.

~~Panicum patens Barm. <sup>tab</sup> ad 10. p. 2.~~

Habitat in India orientali

prose patens Barm

indium P. spica simplicis nuda, pedunculis geminis, culmo adscendente  
basi

patens Panicum panicula oblonga flexuosa capillari patente, calycibus bifloris,  
foliis linear lanceolatis, culmo radicante Lin. t. v. pag. 107. Burm Ind. t. 10.

Fig. 3.

Pyrogrochis amboinensis Rumph. amb. 6. t. 5. fig. 3 (cubito)

P. siama-pulle Rheed. Mal. 12. p. 75. t. 41.

Habitat in India

michi laudatis notis



stypiflorum  
tenellum

Pan. glaberrimum, panicula parva patentior, glumis obtu-  
si curvatis, culmo ramoso felleiformi ha Mark # J. Enip. 173  
confes Pluk. 92. f. 4. D.

# P. tenellum

Habitat ad Serram Leonam

Capillae Parvum panicula oblonga patente ramis divaricatis  
vaginae hirsuta callosa ram

perifolium Pan. panícula parva rubra, glumis obtusis culmo feli-  
formi, foliis minimis villosis La Mart. T. Enc. pag. 173  
Habitat in India occidentali

non vid.

raddeani Pan-panicula composita ovata, rami conferti erecti, glumi  
ovati acuti, foliis ovato-lanceolatis

arborescens Panicum paniculatum ramosissimum, foliis ovato-lanceolatis <sup>oblongis</sup> acuminatis  
Linn. Spec. p. 874 L. V. p. 107

Panicum panicula laxa sparsa, foliorum vaginis glabris. Hort. Cl. p. 27.

Habitat in India

altitudine certatim cum altissimis arboribus. Culmus sex penna asperina  
latis, ~~culmus~~ ramosis, radicantibus, ~~superioribus~~ ~~ramis~~ ~~ramis~~

~~culmibus~~ articulis ramorum inferiorum pollicibus vaginis  
tacti. Folia lanceolata semiamplexantia sesqui pollicaria usque

subpanicula contracta, glabra margine scabra. Vagina margi-  
ne ciliata. pedunculis et axillis superioribus foliis parum longis  
res rami simpliciter, flosculi gemini pedicellati ovato oblongo parva  
acuta valvula extensa membranacea parva subtunda duo majores  
quales glabra nervosa

panicula axillari simplicissima, flosculi gemini pedicellati  
culmo ramosissimo radicante

Cattum P panícula simplici nutante, ramis capillanibus, spiculis approximatis ul  
ternis adpressis, culmo simplici filiformi glabro, foliis linearibus lanceolatis  
Sw prod. pag. 23.

Museum Sloan herb. 1149

Habitat in Jamaica

non vidi

reperens Panicum panicula virgata foliis divaricatis (Spec. pl. pag 87. \* LV  
pag 106. Caran. v. 2. pag 6. Tab. 110

Habitat in Hispania?

Culmi repentis pedales ascendentes. Folia inferiora latiora, undique cau-  
tem vaginis vestientia, patentissima et fere reflecto divaricata, mucrona-  
ta vaginis <sup>sub</sup> pubescentibus. Superiora folia angustiora, longiora erecta.

Panicula constans tribus quatuorve racemis erectis, vix ramosis,  
quibus flores alterni remotiusculi, ovati; valvula calycina exterior  
brevissima obtusa. Lx.

Culmi erecti in Caran. an igitur ~~ovifera~~ a his

facies Panicis colorati an varietas est illa celebratum lectum Tureti fide  
herb. Lus. et Desfont qui specim. in Anglia invenit et cum spec. herb. colla-  
to sunt. Folia superiora convoluta. Vaginae marginibus ciliatae  
coeruleum glabrae. Panicula spithamea et ultra composita. Pars superior  
culmi erectior. Valvula exterior ovata. Corolla acuta

~~in his igitur~~

remotum Pan. panicula ramis triquetris, glomerulis subgeminatis albis pedicellato, culmo ramoso tetragono - compresso. Ait. obs. 4. p. 17.  
Habitat Tranquebaris

Diversum non videtur a glaucophyllo



grosfanum Panicum panicula ramis simplicibus; floribus geminis: pedicello  
altero brevissimo, altero longitudine floris Lin. Am. Acad. S. p. 392 \* 1.

V. pag. 107

Habitat in Jamaica

Culmus bipedalis interdum ramosus, compressus, lavis. Folia lato-lanicola  
to, utriusque graminibus. Laticora - Panicula simplex. Racemi alter  
ni, erecti, indivisi. Flores gemini: altero subsessile; altero pedicello  
longitudine floris prioris. Calycis foliolum externum breviter; duo  
interiora obtuse mucronata Lin.

mibi cyndrum

Distans P. spica alternis elongatis floribusque oblongis geminatis remotis.  
glumis bifloris valvulis subaequalibus

Habitat in India occidentali

Quilmi vaginis foliorum terti vagina ciliata folia lanceolata  
ciliolata glabra 5-7 polliciana spica alternis inferiori  
sumo uno alterove basi superioris simplicis 3-4 polliciana  
flor alteris sespales medicinis valvula fimbriata glabra lanceolata  
to attenuata

flavescent P. panicula simpliciter erecta strata, ramis subsessilibus, infi-  
mis oppositis, spiculis approximatis secundis, pedicellis bifloris

Lw. prodr. p. 23.

Habitat in Jamaica

grasses miscellanea panicula vindi and non vid  
in sp. pl. Coen. 1. p. 115. t. 72. fig. 2. nec forte pertinet

*Dissipatum* P panicula simpliciflora capillari potenti, spiculis distan-  
tibus, Culmo decumbente simplici, foliis linearibus, collo piloso.

*Melua* Sw prodr p. 23.

*Melum jamaicense* angustifolium, panicula sparsa. Sloan

hist. 1. p. 114

Habitat in Jamaica Hispaniola.

maximum P.

*Panicum maximum* Jacq. coll. 1. p. 76.

Habitat in Guadeloupe 7

Caulis crispatus erect. simpliciter compressi 6-<sup>10</sup> pedales glabri inferne  
calami crassitie. Ligula striata basi aspera pilosa. Folia sesqui-  
pedalia, lineam lata basi barbata vix retrosum valde striata  
glabra. Panicula erecta longa racemi laterales patentis  
filiformes alii verticillati alii prostrati. Pedunculi capilla-  
res viximo adpressi 2-3-4 flori pedicelli breves. Glume uniflorae  
glabrae

Latifolium P panicula racemis lateralibus simplicibus, foliis ovato-lanceola  
ti collo piloso Lin. Spec. pl. pag. 864

Gramen virginianum lato brevique folio, panicula racemosa Moench  
hist. 3. p. 196. f. D. 8. 5. fig. 4.

Gramen miliaecum sylvaticum maximum, femine albo Sloan hist.  
1. p. 114. t. 7. fig. 3.

Habitat in America.

Folia latitudine Com melinae ad faucis amplexicaulis extus collo cinerum  
faucis villosa villosa, etiam basi margine pilosa. Panicula valde medio  
cui ex racemis lateralibus non subnatis, sed pedicellos proprios nec  
diversi proferentes. floes mutici manipuli ten

non vid. nisi esst Panicum oxyrodies Sw.

Oxyrodus P panicula subsimplici, ramis erectis, flosculis remotis? sculis  
ovatis acutis, Culmo erecto indiviso, foliis lato lanceolatis basi co  
tundatis, vaginis coriatis, W. prodr. pag. 23.  
Museum Jamaicae ex arundinis foliis Sloan herb. 1. p. 104

Habitat in Jamaica.

~~Culmum~~  
~~caulis~~ <sup>crassus</sup> perno columbae 7 usq glaber basi vaginis foliorum sectus  
Folia subspectolata ultra pollicem lata 5-6 pollicina glabra coria  
nervosa subtilissime striata, margine scabra basi altero latere latiora  
rotundata vagina striata ora ad marginem villosa. Rami panicula  
simplices, flexuosi pedicelli gemini alter longior superior folia  
ni. flosculi magni valvula accessoria ovata striata obliqua  
opaca villosa.

non vidi nisi eadem cum latifolio forte

*Divanicatum* P paniculis brevibus muticis, culmo ramosissimo divanicatis  
sumo, pedicellis bifloris: a ltero brevior. Lin Am. acad 5. pag. 39 et  
Habitat in America Jamaica.

Culmus altus rigidus filiformis teris. Pami divanicatis sumo hordor  
falis, subramosi. Folia linear-lanceolata. Panicula depauperata  
sa brevis subimpleta. Calycis valvula extenor et superor et lateror quam  
longa, ut reliqua mutica. Flores 4 plo majores, quam in Panicis divanicatis



ramosum Panicum panicula ramis simplicibus, floribus subternis: in ferocis sub  
sessile, Culmo ramoso Lin. Mant. 29. \* S. V. pag 106.

Habitat in Indis

rami Culmi pedales, erecti, ramosi, teres: Articulis basi crassisculis, geniculatis:  
venuei <sup>concoloratis, atque nudis, sicut in quibusdam locis dora margini h. ip. in usitate</sup>  
terci <sup>interdum ovato asperato vel glabro</sup>  
Tolca vaginis coribus, Anatis, margine fauceque ciliatis. Panicula ramis  
simplicibus; Inguetis hinc canaliculatis; ad singulos dentes flores 2-3.  
pedicellis uno alterove pilo. Calycis exterior valvula brevis, membrana  
caea, <sup>apice velut</sup> perforata, reliqua ovato lin

uliginosum P. sive panicula subsimplici glauculis gibbosis, foliis lanicollatis  
denticulato subiliatis, culmo repente

Habitat in uliginosis Malacca et alibi in India orientali Non  
est diversum credo a brevifolia variat culmis ad ramis digitalibus  
panicula parva sub simplici vel saepe foliis <sup>anvulgis ularis, rec</sup> ovatis nervosis vel  
globis lanicollatis ~~st. lanis~~ striatis vel lobis, sed demum culmo fistuloso  
foliis longioribus pollicaribus panicula parum magis ramosa glauculis  
ovatis ut in brevifolia

affine rugoso