

Pernilum?

Zappania

Cal. sub 4 dentata. Cor: tubulos, limbo inequali: 5 lobo. Stamina 2-4. Semina
duo nuda

propter semina duo a Verbena distinguit Scop. et La mark et hinc seroient
Verb. stoechadifolia, nodiflora, sarawia, curasf: Cappulacum, macuana
Centrodora prismatica, jamaicensis, india et onbia

pubescens Panicum

Habitat in Carolina herb. Mus.

Totum pubescens. Culmus ramiflorus. Solia 2-6 pollicaria, lanceolata, acuta, margi-
ne scabriuscula. Panicula terminalis, simplex, pauciflora. Flopuli globosi, villosi
Valvula ~~Valvula~~ ^{obtus} ~~obtus~~ ^{vel aquo nervata} ~~obtus~~ - Lemina nitida, villosa

nitidum Panicum

Habitat in Carolina herb. f. us.

Culmus ramosus. Vaginae margine villosae. Sola polliciana, lanceolata, acuta, glabra. Panicula proplex, patens, pauciflora. Slosculi oblongi, obtusi. Valvula nervosa, altera purpurea, aliespora ovata, acuta. Semen nitidum.

Scoparium Panicum

Habitat in Carolina herb. Guss.

Sagina culmum terenti ^{vel ultra} striata, villosa, uti folia. Folia bipollicaria, lanceolata,
Panicula terminalis, decomposita, patens. Pedunculi plures: pedicelli capillares.
Flores mediocres, villosi. Valvula nervosa. Semina nitida, villosa

Panicum prostratum L.

Habitat h.

herb Aust.

Culmi basi repentes, ascendentes, compressi. Vaginae margine ciliato, inferiores longitudine inter nodorum. Folia vix pollicaria, ovata, attenuata, acuta, margine scaberrima & denticulis copiosissimis minutis, ceterum glabra, tera. Pedunculus elongatus. Racemus ^{pollicaris} compositus. Partiales ^{subscissae,} ~~simpliciter~~ ^{pollicares,} glumis multiseriis, seta subtilissima ad basin floretularum. Flores geminati, alter perianthio an setigerum Pritz.

Panicum prostratum Lamour.

Habitat herb. frus.

Culmi repentes, ramosi, compressi. Folia impollicaria, ovato-lanceolata, margine
siaberrima, sive undulata. Vagina et folia basi ciliata. Racemus terminalis, compressus.
Flosculi basi pilis non nullis. Pedicelli 3 ad pagulum dentem, uniflori, duo brevissimi uni
seori, tertius biflorus.
Folte eadem ac marginatum.

fusco rubens Panicum

Habitat herb. Turf. ^{superior}

Culmus erectus. Vagina longa, striata, subpelosa, fauce villosa. Folia sempervirentia, unguem lato, margine scabra, glabra. Racemus decempropositus. Paniculus pilosus: spatulatus frequenter, sparsi, in racemo palmari, patentis; bipollicari & ultra: pedicelli alterni, 7-9 flori; flosculi geminati, alter pedicellatus ^{brevis} alter, ~~seta~~ ^{seta} rariore in pedicello. Flosculi fusci. Semina nigra an fuscum ^{trivata}

numidianum panicum

Habitat in Numidia herb. Pers.

Calami glabri, teretes, articuli vagina villosa, caulem terentia, inter nodos longiora
Folia gemina, plana, superiora convoluta, glabra. Vagina faucibus villosa. Racemi
Compositi, racemuli circiter quinque, remoti, bipollicares. Rachis flectuosa, Slopi-
li secunda, geminati pedicellati, distantes ovati. Valvula accessoria ovata, acuta,
purpurea, altera opposita majora mucosa. Leta nulla in rachide

pubescens Panicum.

Habitat herb. Turf. Ind. orient.?

Culmi erecti, vaginis recti. Vagina striata, puncta elevata in striis pilosis, etate nudiusculis. Solia 4 pollicaria, lanceolata, supra glabra, subtus villosa, lora. Panicula terminalis, erecta, patens, decomposita. Pediculi et pedicelli flexuosi, basi piloso barbati. Floresculi parvi, subglobosi, basi pilis nonnullis. Valvula calycina nervosa.

Tomentosum Panicum.

Habitat circa Peking Incarnille herb. Fus.

Palmis superne Tomentosus, incanus. Spica alterno, sespiles, simplicis, distanter, prolicuere. Flores duplici serie, secundi; dentes rachidis villosissimi. Valvula ovata, acuta, villosa, trinervis.

parviflorum Panicum

Habitat herb la Manhi
Culmi ramosi

Panicum

Habitat in antillis herb. Surinam. no 100. Exud Guypen

Folia sesquipedalia, pollicis duo lata, multi nervia, margine. et vixim scabra
glabra: vagina glabra, striata. Rachis villosa, sesquipedalis. Pedunculi plu-
res villosi, filiformes, basi subramosi: rami inaequales, 2 polliciaes. Panicula
etata, patens.

Flor de Junij

nodiflorum Panicum

Habitat in Carolina herb. Guss.

Culmi repentes, filiformes, ramosi, glabri, adgenicula nodosi. Folia semi-vel
pollicaria linearis lanceolata, basi utraque pilis nonnullis, elliptica. Vagi-
no glabro, ore villosa. Panicula ex apice ramorum, simpliciter, depauperata.
Semina laevia, nitida.

barbatum Panicum

Habitat herb. Musf.

vagina et folia pilosa. Folia prostrata sulcata, lanceolata, attenuata,
semipollicem lata. Panicula spicata. Setae annullo floribus longis
res ad eorum basin

Carex flexuosa Paniceum.

Habitat herb. musci.

culmi filiformes. Folia linearia - lanceolata, glabra; vagina pilosissima. Panicula subcomposita, patentissima. Spicula subglobosa, multinervis, villosa. Pennulae capillares.

Fabulorum Panicum

Habitat herb. Musci

Calmi ramosi. Folia lineari lanceolata, bipollicina: vixius marginat
lofo. Panicula composita. Floresculi oblongi, glabri, nervosi. Semina nitida

variflorum Panicum

Habitat herb. mus

Panicula diffusa, supra decomposita. Pedunculi ternato-verticillati, basi pilo-
si: paniculae alterni, ultimi capillares. Flosculi oblongi, nervosi, glabri.

Glossidium Panicum

Habitat herb. musci

Æcies bromodii La Martk. Stipuli geminati, distantes, Rachis subpulosa
sulcula exterior longe anstate

Panicum purpureum Jacq. Verat. in involucri 12 sp. inaequalibus. Flores
majoribus unifloris, culmo Verat. numeroso fl. Penus. 1. pag. 40.

Habitat in praeceptis Penusa

Culmus erectus, teres, glaber, nitidus. ^{foliis} quadripedalis. Folia lanceolata, sa-
cuta, 5que nervia. Spica longa, paleaceo virescens. Flores albi
breves pedicellati, uniflori. Gluma 3-valvis mutica. Semen oblongum, pla-
num fl. Penus.

macrocarum Panicum

Habitat J. D. & Richard

amethystina Panicea

Habitat ad Senegal D. D. J. Dupuis

menstruatum Paniceum

Habitat in Carolina Moph.

Radix copiosissimi, diffusis, ramosis

Labes

Spicilloperum panicum

Habitat ad Senegal - West Richard

habes

Seneca Anstida

Habitat in Carolina herb. Richardi.

habeo

Burmanni Pan. spicis subquaternis, remotis secundis simplicibus, florum glumis
binis exterioribus anistatis Retz off. 3. p. 10.

Panicum hirtellum Retz p. Burm fl. ind. 8. 12. fig. 1.

Habitat in India orientali

Culmi repente florum ascendente; semipedales tenues. folia frequentia
ovata oblonga attenuata acuta vel ~~obovata~~ unguiculata vel lanicolata polli-
cena utraque pilosa vaginas inferius longitudine foliorum tubercula
ita striata pilosa. pedunculi elongati glabri. spiculae vel unguiculae
vix 6. ovatas 10 florae. valvae flexuili pilis albis longis cincti
valvulae lineari lanicolatae inaequales omnes anistatae, acuta vel
vela minoribus reliquis longior, striata.

Similis hirtello at sp. omnes flores in spicula, spiculae a pilis albis
frequentibus et valvulis pallidis albedo nec opae vixit valvula
striata nec nervosa

bromoides Ca. Manthii fide herb. huf. et Ca. Manthii
glumis anistatis striatis. valvae vel vellosum; florum

Scabrum Pan. plicis alternis crispis subsecundis fimbriis glumis angustatis bipedis
rachis tuberculato La Mart. T. Enc. pag 171.
Habitat in Senegal

Colonum Panicum spiculis alternis secundis mediis ovatis scabris, rachis teretibus
scabris Lin. V. pag. 105. f. 1. ec. pl. pag. 244.
Panicum tetra spiculis alternis secundis, quadrifariam imbricatis,
glabris secundis hinc planis, inde gibbosis, villosis, muticis
Boiss. Desf. pag. 19. no 62

Gramen panicum minus, spica divulsa insula barbodensis
Plukh. alm. 174. t. 109. fig. 5.

Gramen panicum minus humistratum, spica divisa
mutica, foliis variegatis Sloan. hist. 1. p. 101. t. 64. fig. 3.

Gramen aciculatum Rumph. amb. 6. p. 13. t. 5. fig. 3.

Habitat in 4 India cultis & utriusque cultis O

Gramen Culmi, sive pedalis ramosis ramis culmo
sive altioribus compressis spiculis vagis glabris striatis
ad aperturam veli nonnulli. Tolia elongata striata
glabra sive purpureo maculata. Pedunculus
communis erectus superius in quibusdam flexus
sive ad singulam spicam villosus. Spica cernit
12. subsimplex oblonga unguiculari. rachis subrecta

seta ad papulum dentem sagittatis.
floscula terminato. flosculi quadrifariam imbricata, subsessili
oblongi altero lato laterale extensor ^{7 lobata} altero plani
valvula ovata acuta nervosa ope latis hispida ^{exterior}
squamula membranacea inter for valvulam calycis et florem
alternis seminibus nitidi. pmo larva
specis oblongi flosculis que secundis glumis quadrifariam imbricat^{is}
villosi

Cruogalli P. spica altioris conpugatisque, spiculis subdivisis, glumis anfractis hi
spicis, rachis quinquangulati Lin. *Spec. pl. Gray. 834*
Gramen panicum, spica divisa Bauh. pin. p. Mon. hist. 3. p. 189. f. 2. 24.
fig. 15. Scheuchz. gram. 49.

Dens caninus secundus Bauh. hist. 2. p. 434.

B. Gramen panicum, spica divisa, anfractis longis aronata Bauh. pin. p.

Habitat in Europa et Virginia cultis

Culm ^{diffusi} ~~retecti~~ glabri geniculis ^{simpliciter} lupis. Folia longa glabra margine
fiabra. Spica ^{secunda} bipollicaris pedunculi basi barbati
lobuli congesti ovato valvula ovata hinc profertur margine
acuminata ^{secunda} in anfractum longam depressam. Samina
lora

Stagninum Pan. specis secundis alternis, calycibus bifloris anfractis bipidis

Petr. obj. 5. p. 17.

Habitat in stagnis Indis orientalis

folia plana a denticulis minutis margine scaberrima collo villosa

specio specio unites 15 distantes floribus bipollicariis, floribus
secundis bifloris altero rariore altero facies omnia eius cori
ut specio non differre videtur nisi calycibus bifloris

calycibus bif

Enicocori P. specis alterius secundis, spiculis subdivisi, glumis an^{sub}stanti hispida,
rachis trigona. Gen. Spec. pl. pag. 844

Habitat in Indis O

Culmi erecti spiculi teretes striati glabri geniculis fuscis. folia
plana retro flexa striata pallida viridia. spicis superne alter
ni secundis similes ad rachis trigona glomerati basi valvula antra
to antra altera reliquis longior.
varietatem e Summano culmo crassitie digiti minimi vagum
punctata elevatis punctis relapsi marginis ciliati folia pollicem
lata panicula major antris longioribus

enzoides arduum Richard

oryzium P. *spica composita nutante, spiculis secundis unistachis rectis*
trigona ad. spec. 2. p. tab 5

cur corni. vana specii aristati et mutici Richard

~~sub exaltis~~

si a cur ^{corni} gatti D. ffel
D. ffecatio presone

Hippidulum P. fructu alternis secundis subdorsis, glumis subantratis
Hippiduli, rachis compresso-piulo. La Mart. T. Enc. pag 171
Habitat in India
an *Panicum* *crus* *corvi*

habatur Pan. fructu alternis subdorsis, glumis glabris striatis subanfractis
schi vagnusque foliorum barbati La Mark T. Enc. pag 171.
Habitat in syl. Francie

pyramedale Pan. fructis alternis numerosis pyramidatis, glumis multae sub
lobus, foliis glaucis La Mart. T. Cat. Voy. 177.
Habitu in Senegal.
variat glumis lobus et subpubescentibus

non vidi

plicatus Pan. fructu alternis remotis multioribus brevibus, corollis vulgaribus
foliis plicato-fimbriatis La Mart. J. Enc. pag 171.
Habitat in Gopulo Francia