

# Papaver

## \* Capulis hispidis

1. hybridum P. capulis globosi toroſi hispidis, caule folioso multifloro
2. argemone P. Capulis glavatis hispidis, caule folioso multifloro
3. alpinum P. capulo hispida, ſcapo unifloro nudo, foliis bipinnatis
4. nudicaule P. Capula hispida, ſcapo unifloro nudo, foliis simplicibus pinnatis

## \* Capulis glabris

5. rhoas P. capulis globosi, caule peloso multifloro, foliis pinnatis hispidis
6. dulcam P. Capulis oblongis glabris, caule multifloro setis ad profū, foliis pinnatis hispidis incipi
7. Cambriaeum P. capulis glabris oblongis, caule multifloro lori, foliis pinnatis hispidis incipi
8. orientale P. capulei caulebus unifloris ſtabris foliosi, foliis pinnatis feratis
9. somniferum P. Capulis oblongis calyculis capulisque globosis glabris, foliis amplecti caulebus incipi

*Latiflorum Papaver*

*Papaver orientale* Venetorum in eis sum ad caulem floridum Tournes. Cir  
Habitat in Oriente herb. Mus.

Ramis erecti, teretes, fatis longis exstantibus adspersi; ramosi: rami alterni; digitantes;  
simplices. Dolia pinnata: piniora hispida, pennis oblongis vel lanceolatis, unguicula  
ribus, exterioribus decurrentibus, integriformis, puluis rugosis adspersi uti petoli:  
ad alterum glabra pinnis lanceolatis, pinnatifidis: loculis lanceolatis integrer  
vitis, seta verminalis, glauco-viridia, spathandia, erecta & jugosa, in genova  
subpetiolata. Petiolas hispidas. Caulinae rotundatae, sessiles, laeviusseta  
vermalis. Flores est apice et attillis, radicantis, foliarie. Pedunculi breves:  
Calyx hispida. Cappula oblonga, glabra, loris, peso duplo major. Pedunculus  
spiculatus. Vi pollicans.

Cat eniflorum Papaver. foliis pinnatis: lacinias cuspidatis; caule multifloro  
Papaver orientale venetum in eum ad caulem floridum Tournef. Cor.  
Habitat in oriente herb. flos.

Caules erecti, feti rari patentibus ad persus. Dolca fructuosa bi-f. - 3 polluaria,  
Canceolata pinnata, glauco-viridia, subter feti albidis adpersa, coetemini  
glabra: panno Canceolata, subinciso, obtriangulo, feta albida femeum  
quieulari vermumata. Palys lani, feti rari albis adpersi. Corolla rubra,  
basi macula fufa. Capsula unguiculata, oblonga, glabra.

Hybridum R. capuli subglobosi glabri torojo hispidi, caule foliis multo  
flor. lir. h.v

Argemone capitulo hispido rotundo torulis canaliculatis Kobel c.

276. Mons. Hist. 2. p. 270. f. 3. t. 14. fo. 9.

Argemone capitulo breviori Baub. p. 172.

Habitat in Europa australiore C

Caule erectus pedalis inferne glaber superne hispidus. folia  
petiolata. per natigera laevis lanceolatis acutis exspic  
utique angis nonnullis adpresso. Pedunculus terminalis  
cic valde angustus

Argemone P. capitulo clavati hispidi, caule foliis multifloro tenui speci  
pl. 725 fig. Dan. tab. 867  
Argemone capitulo longiorae Bauh. pin. 172. Lobel. v. 276.  
Argemone capitulo Venerio longiore hispido Monf. hist. 2. p. 270. f. 3  
7. 14. fig. 10.

Habitat in Europa campis arenosis  
Caulis erectus subramosus pelis ad noscere proferim superne  
adspersus. Folia caulinis simplicia pennatifida laciniosanis  
latis unguiculatis latioribus quam in hybrido incipi  
et dorso per granum dilatatis margine et subtus ad costam  
pare pilosis. Pedunculus terminalis et apice ramulos  
elongatus. Calyx pelis aliquot capilla pollinari  
angustus ad noscere in primis superne

Folia supra  
tripartita

alpinum P. capsula hispida, scapo uno floro nudo hispido foliis bipennatis  
tago. fl. Auctr 1. 8. 03. Et. Dan.  
~~Papaver argemone fl. flavo per pufellam~~ Platia alm 179. t. 247.

~~Argemone minor~~ Bens Baluh. host. 1774 figura certe huc non  
pertinet Argemone alpina, foliis scandens lutea Baek. prodr. 93. pia.  
fig. 3

172. Argemone alpina, coriandrifolia Baek. pia 172.  
Papaver alpinum satatile, coriandrifolia Segu. ver. 1. p. 416.

174. fig. 4.  
Habitat in Helvetia, Sneeberg Austria, Pyrenaei 4  
Solia radice alba, petiolata sollevaria, hysta extrospem  
dilatata ter vel squam inciso puncta subpunctata fida laici  
nis creantur obtusifolies. Scapus erectus palmata  
pelosus profectus superne pelis patentibus. Corolla  
lutea

Caulis basi petiolis andis persistentibus sectus solle longe  
petiolata siccis glabra tria longiora tenuiora et plu-  
nes diversa quam in medicinale scapus superne pelis  
brunneobrunnea magis ad prespi albedonibus

11 nudicaula capitulo hispida, scapo ~~maxi~~ flor nudo hispido, foliis sim  
plicibus pennatis sinuatis l. v. p. 490x fl. Dan. ta 41.  
*Papaver erradicum*, luteo flore, capite oblongo hispido Ann.  
nuth. 61. n. 81.

*Papaver erradicum*, nudicaula flore flavo odorato Dell. Elth.  
302. t. 224. fig. 291.

Habita in Iberia et Norvegia Alpibus, Gronlandia 4

Solia radicibus petiolata, pollucana hysta ex trospum  
dilatata vel vel r. incis. pennatifida, caducis linearis  
oblongo obtusi. Scapus erectus, palmatus, pelosus  
prosternit pene, pilis patentibus. Corolla lutea

*Papaver argemone* flore flavo per pusillum Pleth. alm.  
179. t. 247. fig. 3.

<sup>rhoeas</sup> dubium P. capillis glabri globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatis fidae incisa  
foliis oblongis glabri, caule multifloro foliis adpresis, foliis  
pinnatis fidae incisa Lin. I. V. Sacch. austr. Tab. 25.

Papaver rhoeas pinnus Dalech. Hist. 439.

Papaver eraticum mayes Bauh. pin. 171.

✓ Papaver eraticum flore pleno Bauh. pin. 171.

✓ Papaver eraticum minus Bauh. pin. 171.

Habitat in Europa arvi agni O

Pauli erectus; fetis patentespini, propositum superne adspic  
fus uti foliis. Folio superiore tripartita latissimis  
lancicolatis utrinque dentata una vel altero terminali  
major et latior, summa saepe indurata. Palyst hispidus

Dubium. *P. capillis obtusis glabri*, caule multi-floro setis adpreso, foliis  
pennatipedatis incisis lvs. L.S. 88. Dan. Tab. 902. fe. austr  
p. 17. f. 25.

*Argemone capitulo longiore glabro Monf. Blesf. 233. hist. 2. p. 229.*

f. 3. v. 14. fe. 11.

*Papaver eratetum, capite longissimo glabro Tournf. G.R. 4. 230.*

Habita bunter segete Europa septentrionalis O

*Paeonia pedalis subramosa folia subpennatipeda pubes*

*pulosa. Balyt pulosus*

Rhocas. capillis glabris globos; caule piloso multiflor, foliis pennatis  
fidiis in eis.

? Cambicum P. capillis glabri oblongi, caule multi-floro lori, foliis pinnis  
foliolis glabris  
D. Scop. in Spec. pl. 727x

Papaver erradicum pyrenaicum, flore flavo Benth. prod. 92.  
p. 171.

Argemone cambrica-britannica latcea, capite conico glabro  
monsp. hot. 2. p. 279. f. 3. t. 14. fig. 12

Papaver erradicum Cambicum perenne, flore sulphureo  
Gill. Ethn. 300 t. 223. fig. 296

Habitat in Cambria & septentrionali nemorosis, Pyrenaeis &  
Pauli & natura pulchra aliquot raroibus ad spuma. Folia  
bipuga foliola oblonga perato cnicus mollieana sulphurea  
Calyx pilosus

8 orientale P; capsuli glabri, caulebus unifloris scabri foliosis, foliis pinnatis  
ferratis Lin. 1. V.

Papaver orientale hispida sumum, flore magno Tournes. cor. 17. et.  
2. p. 227. & 227. Common var. 34. & 34.

Habitat in oriente O

& aulis Regis petris ad piceis. Dolci feticis plurimi ad per-  
fer. Caeruleo lanceolato obtuso. Calyx e feticis ranuncu-  
lloides

9. Somniferum P. calycibus capsulisque glabri, foliis ampliis & subtilibus incrassatis.

Lvs. 1 V p.

Papaver hortense semine albo Baub. p. n. 170

β. Papaver hortense semine nigro Baub. p. n. 170.

γ. Papaver enstatum, floribus & semine album Baub. p. n. 171.

δ. Papaver crassatum, floribus rubris semine nigro Baub. p. n. 171.

ε. Papaver flore pleno, album Baub. p. n. 171.

Habitat in Europa australiori sed exenti.

Paulus triquetus bipedalis & ultra glaber. Siliq. oblonga

in deinceps serrato incrassa glabra atque calyx