

Parthenium

oppositifolium Parthenium foliis oppositis petiolatis ovatis

Habitat in Guadeloupe montserrat et von Rott

Caulis fruticosus, ramosus, rami teretibus, scabri superne pilis adpressis adpressis.

Folia petiolata, opposita patentissima ^{pubescentia} ovata, acuminata, basi acuta, venosa, triplicinerva, scabriuscula subtus pallidiora inaequaliter crenato serrata.

Petiole bipollicari scabri subtus convexi

Corymbus terminalis compositus, folia duo ad basin primo divisi in 3 pollicari, cetero lanceolata, ceterum structura eorum ramorum foliorum rameorum. Pedunculi et pedicelli illis adpressis cinerascetes. Bractea parvula bifida trifida pedicelli multiflori. Bractea floribus alternis confertis subsessilibus. Bractea subulata parva ad basin ramificationum

Calyx communis polyphyllum 12. ^{squalibus} foliolis extenibus ovatis, ciliatis, in venis lanceolatis

Flosculi feminei in radio quadridi. Stylus bifidus. Disci hermaphroditi
antheri ut videtur connati.

Tournefort Schum.

spidi

Parthenium

integri-folium Parthenium foliis alternis ovatis sessilibus ovatis crenatis
Parthenium integri-folium foliis ovatis crenatis Lin. L.V

Heterophones P. foliis composito-multifidis Lin. S. V.

Abies *Euphrasiifolia*; *Aethiopi* alpini quodam modo
accidens Pluk. alm. B. Tab. 45. fig. 3.

Partheniastum americanum, *ambrosiifolia* Nesf. Act. 1711. pag
423. tab. 13. fig. 2.

Habitat in *Tamaio* & *glareosi* O

Caulis terribus bipedalis villosus pilosus folia petiolata
remota bipinnatifida subtus canescentia lacinis lan-
ceolato obtusis pilis arenis corymbis terminalis dichoto-
misi pedicelli & calycis villosi flores albi

integrofolium^o foliis ovatis crenatis l. S. V.

Pharmica virginiana, scabroso diffusis foliis dissectis Pluck
alm. 300. t. 53. fig. 5. t. 219. fig. 1.

Parthenia stem helenii folio Dell. Eth. 302. t. 225. fig. 292

Habitat in Virginia 4

Caulis erectus sesquipedalis striatus subangulatus, pilis minutis
raris adpressis. Folia ovata ^{remota} simpliciter venosa
sesquipollicaria oculo armato pilis parvis adpressa profunde
inequaliter serrata inferna in petiolum acutius dilatata
folia cum amplexiculis acuminata superiora simplicia
complicata terminalis subdichotoma. Pediculi uti caly-
ci velosuli compressi subreserpti.